Banque PT, France

Session 2017, filière PT

Mathématiques A

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : une matrice 3 x 3 diagonalisable
- Partie II : matrices combinaisons de deux matrices
- Partie III : matrices aI + U tV
- Exercice de probabilités : loi géométrique

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/banque-pt/pt/2017/maths-a

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Epreuve de Mathématiques A

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction, la clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans **l'appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Tournez la page S.V.P.

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Problème d'Algèbre linéaire

Pour tous entiers strictement positifs n, p, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients réels. Pour tout entier $n \geq 1$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels. I_n désigne la matrice identité d'ordre n.

Pour une matrice A, ${}^tA$ désigne sa matrice transposée.

Partie I

Soit A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la matrice A est diagonalisable.
2. Déterminer les valeurs propres et les sous espaces propres de A.
3. Déterminer une relation entre A^2, A et I_3.
   En déduire une relation entre A^{n+1}, A^n et A^{n-1} pour tout entier $n \geq 1$.
4. Montrer par récurrence qu'il existe deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A^n = \begin{pmatrix} u_n & v_n & v_n \\ v_n & u_n & v_n \\ v_n & v_n & u_n \end{pmatrix}$$

   qui vérifient la relation de récurrence

$$\forall n \geq 1 \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2u_{n-1}, \\ v_{n+1} = v_n + 2v_{n-1}. \end{cases}$$

5. Déterminer, pour tout entier naturel n, l'expression de u_n et v_n en fonction de n.

Partie II

Dans toute cette partie, on se fixe un entier $n \geq 1$. Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe deux matrices U, V de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et deux réels λ et μ tels que $\lambda\mu \neq 0$ et $\lambda \neq \mu$, vérifiant :

$$A = \lambda U + \mu V \tag{1}$$
$$A^2 = \lambda^2 U + \mu^2 V \tag{2}$$
$$A^3 = \lambda^3 U + \mu^3 V. \tag{3}$$

1. Exprimer U et V en fonction de A et A^2.
   En déduire que
   $$A^3 = (\lambda + \mu)A^2 - \lambda\mu A.$$
2. Montrer que, pour tout entier $p \geq 1$,
   $$A^p = \lambda^p U + \mu^p V.$$

3. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont A est la matrice dans la base canonique. On note $f^p = f \circ \cdots \circ f$ la $p^{ième}$ composée de f. Soit $p \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Montrer que $\text{Ker}\, f \subset \text{Ker}\, f^p$.
   (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,
   $$\lambda\mu f^{p-1}(x) = (\lambda + \mu) f^p(x) - f^{p+1}(x).$$
   (c) En déduire que $\text{Ker}\, f^p \subset \text{Ker}\, f$.
   (d) Montrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^p)$.

Partie III

On se donne toujours un entier $n \geq 1$ fixé.

Soit U et V les matrices colonnes : $U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ $\quad V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$.

On suppose U et V non nulles. Soit a un réel et A la matrice définie par

$$A = aI_n + U\,{}^tV.$$

1. Montrer que ${}^tV\,U$ est un réel que l'on exprimera en fonction des coefficients u_i et v_i.
2. Montrer qu'il existe un réel k tel que $(U\,{}^tV)^2 = k(U\,{}^tV)$.
   En déduire qu'il existe deux réels α et β tels que $A^2 = \alpha A + \beta I_n$.
3. On note $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$. Donner l'expression de a_{ij} en fonction de a et des coefficients de U et V.
   En déduire que $\text{Tr}(A) = na + {}^tVU$.
4. Exprimer α et β en fonction de a et $\text{Tr}(A)$.
5. Soit λ une valeur propre de A. Montrer que λ^2 est une valeur propre de A^2.
   En déduire que λ vérifie l'équation
   $$\lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0.$$
6. Montrer que les seules valeurs propres possibles de A sont
   $$\lambda_1 = a \quad \text{et} \quad \lambda_2 = \text{Tr}(A) - (n-1)a.$$
7. On suppose que $\text{Tr}(U^tV) \neq 0$ et on considère les sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 définis par
   $$E_i = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ AX = \lambda_i X\}.$$
   (a) Montrer que $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.
   (b) Montrer par analyse-synthèse que, pour tout vecteur colonne X, il existe $X_1 \in E_1$ et $X_2 \in E_2$ tels que $X = X_1 + X_2$.
   (c) Montrer que la matrice A est diagonalisable.
8. Montrer que la matrice A de la première partie est de cette forme.

Tournez la page S.V.P.

Exercice de Probabilités

On rappelle qu'une variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ si

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = p(1-p)^{n-1}.$$

1. Soit X une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre p.
   (a) Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X > n)$.
   (b) Soit $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi de Bernoulli de paramètre p. On note T le rang du 1er succès obtenu : $T = \inf\{k \geq 1,\ X_k = 1\}$. Montrer que T a même loi que X.
2. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi géométrique de paramètre p.
   (a) Calculer la fonction génératrice de X puis de $X + Y$.
   (b) En déduire que pour tout $n \geq 2$, $\mathbb{P}(X + Y = n) = p^2(n-1)(1-p)^{n-2}$.
   (c) Déterminer, pour $n \geq 2$, la loi de X sachant $X + Y = n$.
3. On considère toujours X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi géométrique de paramètre p. On pose $T = \max(X, Y)$ et $Z = \min(X, Y)$. On pose $q = 1 - p$.
   (a) Exprimer $X + Y$ et $|X - Y|$ en fonction de Z et T.
   (b) Montrer que $\mathbb{P}(X = Y) = \dfrac{p}{1+q}$.
   (c) Montrer que Z suit une loi géométrique de paramètre $1 - q^2$. On pourra caractériser la loi de Z par sa fonction de répartition.
   (d) Déterminer la loi de T.

IN CHOISY - 17 1133 - D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PT chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Compléments d'algèbre linéaire
- Variables aléatoires discrètes
- Espaces probabilisés

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/banque-pt/pt