Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 1993, filière ECG

Mathématiques I ESSEC (ECS)

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : étude d'intégrales
- Partie II : suite de polynômes
- Partie III : valeurs approchées de pi

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/1993/maths-s-essec-1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

ESSEC

CONCOURS D'ADMISSION DE 1993

MATHEMATIQUES I

Option générale

Mercredi 19 mai 1993 de 14h à 18h

Sont autorisées :
- *Règles graduées.*
- *Calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, à fonctionnement autonome, sans imprimante, sans document d'accompagnement et de format maximum 21 cm de long x 15 cm de large.*

L'objet du problème, développé dans la partie III, est l'obtention de valeurs approchées du nombre π.
Dans toute la suite, on désigne par n un entier naturel et par a un nombre réel supérieur ou égal à 1. On notera aussi, pour simplifier les écritures: $b = a^2 + 1$.

Partie I: étude d'intégrales.

1°) On désigne par p, q des entiers naturels et l'on étudie l'intégrale:

$$I(p,q) = \int_0^1 t^{2p}(1-t^2)^q\,dt.$$

a) On suppose que $q \geq 1$. Former une relation de récurrence entre I(p, q) et I(p+1, q-1).
b) En déduire l'expression à l'aide de factorielles de l'intégrale I(p, q), et en particulier celle de l'intégrale I(p, p) que l'on notera J(p) dans la suite du problème.
c) En étudiant le maximum sur [0, 1] de $t \to t^2(1-t^2)$, établir que l'on a $0 \leq J(p) \leq 1/4^p$.

2°) On étudie dans cette question l'intégrale:

$$f(a) = \int_0^{1/a} \frac{dt}{1+t^2}.$$

a) Calculer f(1) à l'aide du changement de variable $t = \tan(\theta)$.
b) Etablir pour $a \neq 1$ l'égalité suivante:

$$(1) \qquad f(a) + f\left(\frac{a+1}{a-1}\right) = f(1).$$

(on pourra utiliser dans l'intégrale donnant $f((a+1)/(a-1))$ le changement de variable défini par $t = (ax - 1)/(x + a)$).

c) Etablir que:

$$f(a) = a\int_0^1 \frac{dt}{a^2+t^2}.$$

Partie II: étude d'une suite de polynômes.

1°) On considère les fonctions-polynômes définies par: $P_n(x) = 1 + \lambda_n x^n(1-x)^n$.
Déterminer le nombre réel λ_n pour que $-a^2$ soit racine de P_n.

On supposera λ_n ainsi choisi dans toute la suite du problème.
On désignera alors par Q_n la fonction polynôme définie par: $P_n(x) = (x + a^2)Q_n(x)$.

2°) a) Expliciter Q_0 et Q_1.
b) En considérant $P_{n+1}(x) - P_n(x)$, établir pour tout nombre réel x la formule suivante:

$$(2) \qquad Q_{n+1}(x) - Q_n(x) = \left[-\frac{x(1-x)}{a^2 b}\right]^n Q_1(x).$$

En déduire l'expression de $Q_2(x)$.

Partie III: détermination de valeurs approchées de π.

1°) <u>Une première approximation de π.</u>
On pose:

$$u_n(a) = a\int_0^1 Q_n(t^2)dt.$$

a) Calculer $u_1(a)$ et $u_2(a)$.
b) Vérifier que:

$$u_2(a) = a\int_0^1 \frac{P_2(t^2)dt}{a^2+t^2}.$$

En déduire la double inégalité suivante:

$$u_2(a) + \frac{J(2)}{a^3 b^3} \le f(a) \le u_2(a) + \frac{J(2)}{a^5 b^2}.$$

c) Donner un encadrement décimal de f(2) et f(3) (avec les 6 premières décimales).
d) A l'aide de la relation (1), en déduire une valeur décimale approchée du nombre π (avec les 6 premières décimales, et une indication sur la précision obtenue).

2°) <u>Généralisation.</u>
a) Etablir l'inégalité suivante:

$$(3) \qquad |u_n(a) - f(a)| \le \frac{1}{(4a^2 b)^n a}.$$

b) Etablir à l'aide de l'égalité (2) que:

$$u_{n+1}(a) - u_n(a) = \frac{(-1)^n a J(n)}{(a^2 b)^{n+1}} \frac{2(2b-1)n + 3b - 1}{4n+3}.$$

c) On pose: $v_n(a) = u_{n+1}(a) - u_n(a)$.
Exprimer pour $n \ge 1$ le rapport $v_{n+1}(a) / v_n(a)$ en fonction de n et de a.
d) On donne un entier naturel n et un nombre réel a supérieur à 1. Rédiger en PASCAL:
- une procédure de calcul de $u_k(a)$ pour $0 \le k \le n$ (on utilisera la suite $(v_k(a))$).
- une procédure de calcul d'une valeur approchée de π (on utilisera la relation (1).

e) On choisit n = 5 et a = 2. Quelle valeur approchée de π obtient-on ainsi? Indiquer à l'aide de l'inégalité (3) la précision de cette approximation.

3°) Recherche d'un choix optimal pour a.

On suppose dans cette question que a > 1 et l'on pose:

$$w_n(a) = 4\left[u_n(a) + u_n\left(\frac{a+1}{a-1}\right)\right].$$

a) Soit c le plus petit des deux nombres a et (a+1) / (a-1). Montrer que:

$$|w_n(a) - \pi| \leq \frac{8}{c\left[4c^2(1+c^2)\right]^n}.$$

b) Tracer la courbe représentative de la fonction définie pour a > 1 par:

$$a \rightarrow \min\left(a, \frac{a+1}{a-1}\right).$$

En déduire pour quelle valeur a_0 de a le nombre c défini ci-dessus est maximal.

c) On choisit a = 5/2. Donner un majorant de $|w_n(a) - \pi|$. Qu'obtient-on alors pour n = 5?

*****

**

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Fonctions réelles : limites et continuité
- Polynômes
- Suites réelles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg