Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 1994, filière ECG

Mathématiques I ESSEC (ECS)

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : intégrale Gamma
- Partie II : série g_p(x)
- Partie III : calcul de I(a,b)

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Copie scannée de l'original ; la marge gauche des pages 2 à 4 est légèrement rognée, ce qui coupe quelques premiers caractères de lignes.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/1994/maths-s-essec-1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

E S S E C

CONCOURS D'ADMISSION DE 1994

Option générale

MATHEMATIQUES 1

Jeudi 19 mai 1994 de 14h à 18h

Les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, à fonctionnement autonome, sans imprimante, sans document d'accompagnement et de format maximum 21cm de long x 15cm de large sont autorisées.

On désigne par a et b deux nombres réels strictement positifs, et l'on considère l'intégrale I(a, b) définie par:

$$I(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}\,(1-x)^{b-1}\,dx.$$

Le problème a pour objet d'exprimer cette intégrale I(a, b) à l'aide de la fonction Γ définie pour tout nombre réel strictement positif p par:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,t^{p-1}dt.$$

PARTIE I

On étudie dans cette partie préliminaire l'intégrale impropre $\Gamma(p)$, avec $p > 0$.

1°) Convergence de l'intégrale $\Gamma(p)$ avec $p > 0$.

a) Déterminer la limite quand t tend vers $+\infty$ de la fonction $t \to e^{-t}\,t^{p+1}$.
En déduire la convergence de l'intégrale de la fonction $t \to e^{-t}\,t^{p-1}$ sur $[1, +\infty[$.

b) Etablir pour tout nombre réel x appartenant à]0, 1] la double inégalité:

$$0 \leq \int_x^1 e^{-t}\,t^{p-1}dt \leq \frac{1}{p}.$$

En déduire la convergence de l'intégrale de la fonction $t \to e^{-t}\,t^{p-1}$ sur]0, 1].

c) En déduire la convergence de l'intégrale $\Gamma(p)$ pour tout nombre réel $p > 0$.

) Expression de $\Gamma(p+1)$ pour p entier naturel.

A l'aide d'une intégration par parties que l'on justifiera, exprimer $\Gamma(p+1)$ en fonction $\Gamma(p)$.

Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire $\Gamma(p+1)$ lorsque p est un entier naturel.

ARTIE II

ı désigne dans cette partie par p un nombre réel strictement positif, par x un nombre el tel que $0 \leq x < 1$, et l'on considère la série:

$$g_p(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{p-1}x^n.$$

) Convergence de la série définissant $g_p(x)$.

Déterminer la limite quand n tend vers $+\infty$ de $n \to n^{p+1}x^n$ lorsque x est fixé dans ıtervalle [0, 1[.

En déduire la convergence de la série définissant $g_p(x)$ lorsque $0 \leq x < 1$.

ue vaut $g_p(0)$? Peut-on définir $g_p(x)$ pour $x = 1$?

) Etude des cas particuliers p = 1 et 2.

Donner l'expression (sans signe Σ) de $g_1(x)$ et $g_2(x)$ pour $0 \leq x < 1$.

Donner le sens de variation, la limite et un équivalent de $g_1(x)$ et $g_2(x)$ lorsque x nd vers 1 ($x < 1$).

) Etude de la variation de g_p sur [0, 1[.

Comparer $g_p(x)$ et $g_p(y)$ lorsque $0 \leq x \leq y < 1$.

ı déduire le sens de variation de la fonction g_p sur [0, 1[, et l'existence d'une limite L, 'entuellement égale à $+\infty$, de $g_p(x)$ lorsque x tend vers 1 ($x < 1$).

En considérant les sommes partielles de la série définissant $g_p(x)$, établir l'inégalité ıivante pour tout x de [0, 1[et tout entier $N \geq 1$:

$$g_p(x) \geq \sum_{n=1}^{N} \frac{x^n}{n}.$$

ı déduire la limite L de $g_p(x)$ lorsque x tend vers 1 ($x < 1$).

On détermine maintenant un équivalent de $g_p(x)$ quand x tend vers 1.

') Etude du cas $0 < p \leq 1$.

Etudier le sens de variation sur $]0, +\infty[$ de la fonction $t \to t^{p-1}x^t = t^{p-1}e^{t.\ln(x)}$ lorsque le ɔmbre réel x est fixé dans l'intervalle]0, 1[(et $0 < p \leq 1$).

ı déduire l'inégalité suivante pour tout entier naturel non nul n:

$$(n+1)^{p-1}x^{n+1} \leq \int_n^{n+1} t^{p-1}x^t\,dt \leq n^{p-1}x^n.$$

En sommant ces inégalités pour $n \geq 1$, puis en effectuant le changement de variable = - t.ln(x) dans l'intégrale obtenue, en déduire que, pour $0 < x < 1$:

$$\int_{-\ln(x)}^{+\infty} u^{p-1}e^{-u}\,du \leq |\ln(x)|^p g_p(x) \leq \int_{-\ln(x)}^{+\infty} u^{p-1}e^{-u}\,du + x|\ln(x)|^p.$$

En déduire la limite de $|\ln(x)|^p g_p(x)$ quand x tend vers 1 (et $0 < p \leq 1$).

ontrer que ln(x) équivaut à x-1 lorsque x tend vers 1 et en déduire que $g_p(x)$ équivaut $\Gamma(p)/(1-x)^p$ quand x tend vers 1 (et $0 < p \leq 1$).

3°) Etude du cas général.

a) Etablir la relation suivante pour tout nombre réel x appartenant à [0, 1[:

$$(1-x)g_{p+1}(x) \;=\; x+\sum_{n=1}^{+\infty}[(n+1)^p-n^p]x^{n+1}.$$

b) Etablir à l'aide de l'inégalité des accroissements finis l'inégalité suivante pour tout entier n ≥ 1 lorsque 0 < p ≤ 1:

$$p(n+1)^{p-1} \;\le\; (n+1)^p-n^p \;\le\; pn^{p-1}.$$

Comment celle-ci doit-elle être modifiée lorsque p > 1?

c) En déduire l'inégalité suivante pour 0 ≤ x < 1 lorsque 0 < p ≤ 1:

$$pg_p(x)+(1-p)x \;\le\; (1-x)g_{p+1}(x) \;\le\; pxg_p(x)+x.$$

Comment celle-ci doit-elle être modifiée lorsque p > 1?

d) On suppose à nouveau que p est un nombre réel strictement positif quelconque. Montrer que $g_p(x)$ équivaut encore à $\Gamma(p)/(1-x)^p$ quand x tend vers 1.

PARTIE III

On se propose enfin, dans cette partie, d'appliquer les résultats précédents au calcul de l'intégrale I(a, b) où a et b désignent deux réels strictement positifs.

1°) Calcul de I(a, b) pour a ≥ 2 et b ≥ 2.

a) On considère une application h: [α, β] → ℝ, de classe C^1, et on désigne par M_1 le maximum de |h'(x)| lorsque x décrit [α, β].
En appliquant l'inégalité de Taylor-Lagrange à la primitive de h s'annulant en α, établir:

$$\left|\int_\alpha^\beta h(x)dx-(\beta-\alpha)h(\alpha)\right| \;\le\; \frac{M_1(\beta-\alpha)^2}{2}.$$

b) On rappelle que, dans cette question, les réels a et b sont supérieurs ou égaux à 2. Etablir que la fonction $x \to x^{a-1}(1-x)^{b-1}$ est de classe C^1 sur [0, 1].
En lui appliquant le résultat précédent sur chacun des segments $[x_k, x_{k+1}]$ où $x_k = k/n$ avec 0 ≤ k < n, et en notant encore M_1 le maximum de la valeur absolue de sa dérivée lorsque x décrit [0, 1], montrer que:

$$\left|I(a,b)-u_n\right| \;\le\; \frac{M_1}{2n} \qquad avec \qquad u_n \;=\; \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^{a-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)^{b-1}.$$

c) On admet le résultat suivant:
"Etant données deux séries convergentes à termes réels positifs Σa_n et Σb_n (définis pour n ≥ 1) et de sommes respectives A et B, la série Σc_n où c_n est défini pour n ≥ 2 par $c_n = a_1b_{n-1} + a_2b_{n-2} + \ldots + a_{n-1}b_1$, est convergente et sa somme est AB".
En déduire le résultat suivant pour 0 ≤ x < 1:

$$g_a(x)g_b(x) \;=\; \sum_{n=2}^{+\infty}u_n n^{a+b-1}x^n.$$

d) A l'aide des résultats précédents, montrer enfin que:

$$\left|g_a(x)g_b(x)-I(a,b)g_{a+b}(x)\right| \;\le\; \frac{M_1}{2}\,g_{a+b-1}(x).$$

e) Multiplier l'inégalité précédente par $(1-x)^{a+b}$, faire tendre x vers 1 et montrer, en utilisant l'équivalent en 1 de $g_p(x)$ obtenu dans la partie II, que:

$$I(a,b) \;=\; \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

') Calcul de I(a, b) dans le cas général.

n étend ce résultat au cas où a > 0 et b > 0 (on ne demande pas de vérifier la)nvergence dans ce cas de l'intégrale I(a, b)).

Etablir à l'aide d'un changement de variable simple que I(a, b) = I(b, a).

Prouver que I(a+1, b) + I(a, b+1) = I(a, b).

ar intégration par parties, exprimer I(a, b+1) en fonction de I(a+1, b)

ı déduire I(a+1, b) en fonction de I(a, b).

En déduire que la formule obtenue précédemment pour I(a, b) reste valable lorsque > 0 et b > 0.

***

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Fonctions réelles : limites et continuité
- Suites réelles
- Dérivation (et convexité en ECT1)

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg