Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 1997, filière ECG

Mathématiques I ESSEC (ECS)

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : produit scalaire sur R_2p[x] et ajustement affine
- Partie II : ajustement polynomial d'une famille de points
- Partie III : relation de récurrence entre les polynômes orthogonaux

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/1997/maths-s-essec-1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

ESSEC

CONCOURS D'ADMISSION DE 1997

OPTION SCIENTIFIQUE

Mathématiques I

Vendredi 25 Avril 1997 de 8h à 12h

Dans tout le problème, on considère un nombre entier $p \geq 1$ et, pour tout nombre entier k tel que $0 \leq k \leq 2p$, on note $\mathbf{R}_k[x]$ l'espace vectoriel des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à k.
Dans la partie I, on munit $\mathbf{R}_{2p}[x]$ d'un produit scalaire permettant d'obtenir un ajustement affine d'une famille de points du plan à l'aide de la méthode des moindres carrés, puis, dans les parties II et III, on utilise ce produit scalaire pour étudier un ajustement polynomial de cette famille de points.

Les parties II et III du problème sont indépendantes de la partie I.

PARTIE I

1°) Définition d'un produit scalaire sur $\mathbf{R}_{2p}[x]$.
On pose pour tout couple (A, B) de polynômes de $\mathbf{R}_{2p}[x]$:

$$< A, B > \quad = \quad \frac{1}{2p+1} \sum_{i=-p}^{i=+p} A(i)B(i).$$

(Dans cette formule, l'indice i prend les valeurs -p, -(p-1), ... , -1, 0, 1, ... , p-1, p).
Prouver que l'application (A, B) $\rightarrow$ <A, B> définit un produit scalaire sur $\mathbf{R}_{2p}[x]$.

Dans toute la suite du problème, $\mathbf{R}_{2p}[x]$ est muni de ce produit scalaire $< . , . >$, et l'on pose pour tout polynôme A de $\mathbf{R}_{2p}[x]$:

$$\| A \| = \sqrt{< A, A >}, \quad m(A) = < A, 1>, \quad V(A) = \| A - m(A) \|^2, \quad \sigma(A) = \sqrt{V(A)}.$$

Pour tout couple (A, B) de polynômes de $\mathbf{R}_{2p}[x]$, on définit de plus:

$$Cov(A, B) = <A-m(A), B-m(B)>.$$

Une calculatrice de poche pouvant être programmable et /ou alphanumérique, à fonctionnement autonome, sans imprimante, sans document d'accompagnement et de surface de base maximum de 21 cm de long sur 15 cm de large est autorisée.

2°) Propriétés du produit scalaire $< . , . >$.

a) Que vaut $||1||$ (norme du polynôme constant égal à 1)?

b) Etablir pour tout couple (A, B) de polynômes de $\mathbf{R}_{2p}[x]$ les quatre propriétés:

(1) $V(A) = ||A||^2 - [m(A)]^2$.

(2) $Cov(A, B) = <A, B> - m(A).m(B)$.

(3) $<A, B> = 0$ lorsque A est pair et B impair.

(4) $<xA, B> = <A, xB>$ lorsque A et B sont de degré au plus 2p-1.

(xA, xB désignent ici les fonctions polynômes $x \to xA(x)$, $x \to xB(x)$).

3°) Détermination des normes des polynômes x et x^2.

a) Développer $(i+1)^3$ par la formule du binôme et, en sommant les égalités obtenues pour les entiers i tels que $-p \leq i \leq +p$, déterminer $||x||^2$.

b) Développer $(i+1)^5$ par la formule du binôme et, en procédant de même, montrer que:

$$\left\| x^2 \right\|^2 = \frac{p\,(p+1)\,(3p^2+3p-1)}{15}.$$

4°) Meilleure approximation d'un polynôme A par une constante.

a) Prouver, pour tout polynôme A de $\mathbf{R}_{2p}[x]$, que m(A) est le projeté orthogonal de A sur $\mathbf{R}_o[x] = \mathbf{R}$.

b) En déduire pour toute constante b l'égalité $||A-b||^2 = V(A) + (m(A)-b)^2$, et montrer que le minimum de $||A-b||^2$ lorsque b décrit $\mathbf{R}$ est atteint si et seulement si b = m(A), et que celui-ci est égal à V(A).

c) A quelle condition nécessaire et suffisante sur le degré du polynôme A a-t-on $V(A) \neq 0$?

Montrer qu'alors $(1, (A-m(A))/\sigma(A))$ est une base orthonormale du sous-espace vectoriel Vect(1, A) engendré par les polynômes 1 et A.

5°) Meilleure approximation d'un polynôme B par un polynôme de Vect(1, A).

On donne des polynômes A, B de $\mathbf{R}_{2p}[x]$, A étant de degré supérieur ou égal à 1, et on cherche des nombres réels a et b minimisant l'expression $||B - aA - b||^2$.

a) On fixe dans cette question le nombre réel a. Montrer que le nombre réel b minimisant l'expression $||B - aA - b||^2$ est $b = m(B) - a\,m(A)$.

b) Pour tout nombre réel a, on note alors $f(a) = ||(B - m(B)) - a(A - m(A))||^2$.

Exprimer f(a) en fonction de a, de V(A), V(B) et Cov(A, B) et, en étudiant les variations de la fonction f, déterminer en fonction de V(A), V(B), Cov(A, B) le minimum μ de f sur $\mathbf{R}$ ainsi que la valeur a_o de a qui le réalise.

Prouver que μ est le minimum de l'expression $||B - aA - b||^2$ pour $(a, b) \in \mathbf{R}^2$.

c) Déduire de ces résultats l'inégalité $|Cov(A, B)| \leq \sigma(A)\sigma(B)$.

Dans quel cas y-a-t-il égalité dans cette inégalité?

d) *Application:* déterminer en fonction du nombre entier p le minimum de l'expression $||x^2 - ax - b||^2$ ainsi que les valeurs de a et b qui le réalisent.

PARTIE II

On donne une famille de 2p+1 points (i, y_i) du plan, où le nombre entier i prend les 2p+1 valeurs -p, -(p-1), ... , -1, 0, 1, ... , p-1, p.

On désigne par k un nombre entier tel que $0 \leq k \leq 2p$ et, à tout polynôme P de $\mathbf{R}_k[x]$, on associe l'expression:

$$\Delta_k(P) = \frac{1}{2p+1} \sum_{i=-p}^{i=+p} (y_i - P(i))^2.$$

On se propose d'établir que $\Delta_k(P)$ admet un minimum noté δ_k et un seul lorsque P décrit $\mathbf{R}_k[x]$, et l'on note alors P_k le polynôme P réalisant ce minimum.

1°) Calcul du minimum δ_{2p}.

a) Etablir que l'application F définie de $\mathbf{R}_{2p}[x]$ dans $\mathbf{R}^{2p+1}$ par:

$$F(P) = (P(-p), P(-(p-1)), \dots, P(-1), P(0), P(1), \dots, P(p-1), P(p))$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
En déduire qu'il existe un et un seul polynôme de $\mathbf{R}_{2p}[x]$, noté Y dans la suite du problème, tel que $Y(i) = y_i$ pour tout nombre entier i tel que $-p \leq i \leq p$.

b) En déduire la valeur de δ_{2p}.

2°) Existence et unicité de P_k et δ_k.

a) Etablir, pour tout polynôme P de $\mathbf{R}_k[x]$, que $\Delta_k(P) = ||P - Y||^2$.

b) En déduire l'existence et l'unicité du polynôme P_k de $\mathbf{R}_k[x]$ minimisant l'expression $\Delta_k(P)$ lorsque P décrit $\mathbf{R}_k[x]$, autrement dit tel que $\delta_k = ||P_k - Y||^2$, et interpréter géométriquement P_k à l'aide de Y et du sous-espace vectoriel $\mathbf{R}_k[x]$ de l'espace $\mathbf{R}_{2p}[x]$.

c) Déterminer P_o et δ_o, puis P_1 et δ_1 en fonction de p, m(Y), V(Y) et cov(x, Y).

3°) Détermination de P_k et δ_k à l'aide d'une base orthogonale de $\mathbf{R}_{2p}[x]$.

On pose $B_o(x) = 1$ et, pour tout nombre entier k tel que $1 \leq k \leq 2p$, on note B_k le projeté orthogonal du polynôme x^k sur la droite de $\mathbf{R}_k[x]$ orthogonale à $\mathbf{R}_{k-1}[x]$.

a) Déterminer le polynôme B_1.

b) Prouver, pour tout nombre entier k tel que $0 \leq k \leq 2p$, que le polynôme B_k est de degré k et unitaire (autrement dit, le coefficient de x^k dans B_k est 1). Etablir ensuite, pour tout nombre entier k tel que $0 \leq k \leq 2p$, que la famille $(B_o, B_1, \dots, B_k)$ est une base orthogonale de $\mathbf{R}_k[x]$.
En particulier, la famille $(B_o, B_1, \dots, B_{2p})$ est une base orthogonale de $\mathbf{R}_{2p}[x]$.

c) En exprimant le polynôme Y dans cette base $(B_o, B_1, \dots, B_{2p})$ et en formant les produits scalaires $<B_i, Y>$, établir que:

$$Y = \sum_{i=0}^{2p} \frac{< B_i, Y >}{|| B_i ||^2} B_i.$$

d) En déduire, pour tout nombre entier k tel que $0 \leq k \leq 2p$:

$$P_k = \sum_{i=0}^{k} \frac{< B_i, Y >}{|| B_i ||^2} B_i.$$

e) En déduire, pour $1 \leq k \leq 2p$, l'expression de P_k en fonction de P_{k-1}, B_k et Y, puis celle de δ_k en fonction de δ_{k-1}, B_k et Y.

PARTIE III

Dans cette partie, on se propose de déterminer par récurrence la suite des polynômes B_k définis dans la partie II.

1°) Parité de B_k.

On pose, pour $1 \leq k \leq 2p$: $A_k(x) = (-1)^k B_k(-x)$.

a) Vérifier que A_k est orthogonal à $\mathbf{R}_{k-1}[x]$.

b) En déduire que $A_k = B_k$, et que B_k est de même parité que l'entier k.

2°) Expression de xB_k dans la base $(B_o, B_1, \dots, B_{2p})$.

a) Etablir à l'aide de (3) que $<xB_k, B_k> = 0$ pour $0 \leq k < 2p$.

b) Etablir à l'aide de (4) que $<xB_k, B_i> = 0$ pour $2 \leq k \leq 2p-1$ et $0 \leq i \leq k-2$.

c) En déduire qu'il existe pour tout nombre entier k tel que $1 \leq k \leq 2p-1$ deux nombres réels α_k, β_k tels que $xB_k = \alpha_k B_{k+1} + \beta_k B_{k-1}$. Que vaut α_k?

d) En remarquant que $xB_{k-1} - B_k$ appartient à $\mathbf{R}_{k-1}[x]$, montrer que:

$$\langle xB_{k-1}, B_k \rangle = \langle B_k, B_k \rangle .$$

En déduire que $\beta_k = ||B_k||^2 / ||B_{k-1}||^2$, donc que:

$$B_{k+1} = xB_k - \frac{|| B_k ||^2}{|| B_{k-1} ||^2} B_{k-1}.$$

e) A l'aide de ce résultat, expliciter en fonction de l'entier p, supposé supérieur ou égal à 2, les polynômes B_2 et B_3 dans la base canonique de $\mathbf{R}_3[x]$.

***

Prepa Help

prepahelp.com · classes préparatoires, Maroc et France

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Algèbre bilinéaire
- Statistiques bivariées et régression
- Polynômes
- Compléments d'algèbre linéaire

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg