Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2001, filière ECG

Mathématiques appliquées EDHEC

Ce que traite le sujet

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3
- Problème

Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.

Copie ressaisie (LaTeX) du sujet officiel, sans retouche de son contenu ; la mise en page diffère de l'original.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2001/maths-appli-edhec

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

EDHEC

School of management

ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD

Concours d'admission sur classes préparatoires

MATHEMATIQUES

Option économique

Année 2001

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d'aucun document : seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Exercice 1

E désigne un espace vectoriel réel sur $\mathbb{R}$, rapporté à sa base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.
On désigne par a un réel non nul et on considère l'endomorphisme f_a de E, défini par :

$$f_a(e_2) = 0 \quad f_a(e_1) = f_a(e_3) = ae_1 + e_2 - ae_3$$

1. (a) Ecrire la matrice A_a de f_a relativement à la base B et calculer A_a^2.
   (b) Montrer que 0 est la seule valeur propre de A_a.
   (c) A_a est-elle diagonalisable ? Est-elle inversible ?

2. On pose $u_1 = ae_1 + e_2 - ae_3$.

   (a) Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, e_2, e_3)$ est une base de E

   (b) Vérifier que la matrice de f_a relativement à la base $\mathcal{B}'$ est $K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   Dans la suite, on cherche à caractériser les endomorphismes g de E tels que $g \circ g = f_a$.

3. On suppose qu'un tel endomorphisme g existe et on note M sa matrice dans $\mathcal{B}'$.

   (a) Expliquer pourquoi $M^2 = K$ puis montrer que $MK = KM$.

(b) Déduire de ces deux relations que $M = \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ 0 & 0 & z \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, x, y et z étant 3 réels tels que $xz = 1$.

4. Réciproquement, vérifier que tout endomorphisme g dont la matrice dans $\mathcal{B}'$ est du type ci-dessus est solution de $g \circ g = f_a$.

Exercice 2

On désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 2.
On considère une épreuve aléatoire pouvant aboutir à 3 résultats différents R_1, R_2 et R_3 de probabilités respectives P_1, P_2 et P_3. On a donc $P_1 + P_2 + P_3 = 1$ et on admet que, pour tout i de $\{1, 2, 3\}$, $0 < P_i < 1$.
On effectue n épreuves indépendantes du type de celle décrite ci-dessus.
Pour tout i de $\{1, 2, 3\}$, on note X_i la variable aléatoire qui vaut 1 si le résultat numéro i n'est pas obtenu à l'issue des n épreuves et 0 sinon.
On désigne par X la variable égale au nombre de résultats qui n'ont pas été obtenus à l'issue des n épreuves.

1. (a) Justifier soigneusement que $X = X_1 + X_2 + X_3$.
   (b) Donner la loi de X_i, pour tout i de $\{1, 2, 3\}$.
   (c) En déduire l'espérance de X, notée $E(X)$.

   La suite de cet exercice consiste à rechercher les valeurs des réels P_i en lesquelles $E(X)$ admet un minimum local. Pour ce faire, on note f la fonction définie sur l'ouvert $]0, 1[\times]0, 1[$ de $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = (1 - x)^n + (1 - y)^n + (x + y)^n$.

2. (a) On pose $P_1 = x$ et $P_2 = y$. Vérifier que $E(X) = f(x, y)$.
   (b) Montrer que f est une fonction de classe C^2 sur $]0, 1[\times]0, 1[$.
   (c) Déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 de f.
   (d) En déduire que le seul point en lesquelles les dérivées partielles d'ordre 1 de f s'annulent simultanément est le point $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.
   (e) Démontrer que f présente un minimum local en ce point.
   (f) Donner la valeur de $E(X)$ correspondant à ce minimum.

Exercice 3

Soit f la fonction définie par : $\begin{cases} f(x) = 0 \text{ si } x < 0 \\ f(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}} \text{ si } x \geqslant 0 \end{cases}$

1. Vérifier que f est une densité de probabilité.
   La durée de vie d'un certain composant électronique est une variable aléatoire X dont une densité est f.

2. (a) Déterminer la fonction de répartition F de X.
   (b) Calculer la médiane de X c'est-à-dire le réel μ tel que $p(X \leqslant \mu) = \frac{1}{2}$.

3. On appelle mode de la variable X tout réel x en lequel f atteint son maximum. Montrer que X a un seul mode, noté M_o, et le déterminer.

4. (a) En utilisant un résultat connu concernant la loi normale, établir que X a une espérance et montrer que $E(X) = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$.
   (b) Calculer, à l'aide d'une intégration par parties, la variance de X.

Problème

Partie 1

On pose, pour tout entier $n$supérieur ou égal à 1, $v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k+1} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{dt}{t}$.

2. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n \leqslant \ln(n) + 1$.

Partie 2

On considère une suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 1$ et par la relation suivante, valable pour tout entier n : $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

1. (a) Montrer par récurrence que chaque terme de cette suite est parfaitement défini et strictement positif.
   (b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

2. (a) Pour tout entier k, exprimer $u_{k+1}^2 - u_k^2$ en fonction de u_k^2.
   (b) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n^2 = 2n + 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_k^2}$.
   (c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n^2 \geqslant 2n + 1$. En déduire la limite de la suite (u_n).

3. (a) A l'aide du résultat précédent, montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 2 : $u_n \leqslant 2n + 2 + \frac{1}{2} v_{n-1}$.
   (b) En utilisant la partie 1., établir que, pour tout entier n supérieur ou égal à 2 : $u_n^2 \leqslant 2n + \frac{5}{2} + \frac{\ln(n-1)}{2}$.
   (c) En déduire finalement que $u_n \sim \sqrt{2n}$ quand $n \to +\infty$.

Partie 3

1. Ecrire un programme en Turbo Pascal permettant de calculer et d'afficher u_n lorsque l'utilisateur entre la valeur de n au clavier.

2. (a) Ecrire un deuxième programme, toujours en Turbo Pascal, qui permette de déterminer et d'afficher le plus petit entier naturel n pour lequel $u_n \geqslant 100$.
   (b) On donne $ln2 < 0,70$ et $ln5 < 1,61$. En déduire un majorant de $\ln 5000$.
   (c) Montrer que l'entier n trouvé en 2a) est compris entre 4995 et 5000.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Éléments propres et réduction
- Compléments d'algèbre linéaire
- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Variables aléatoires finies et lois usuelles
- Fonctions de n variables : continuité et calcul différentiel
- Variables aléatoires à densité
- Compléments sur les variables aléatoires réelles
- Suites réelles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg