Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2011, filière ECG

Mathématiques III ESSEC (ECE)

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1 - Évolution des intentions de vote
- Problème 2 - Une propriété limite des lois de Pareto

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

La page 6 reproduit l'erratum officiel qui modifie la question 7 c) du problème 1.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2011/maths-e-essec-3

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Code épreuve :

290

BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

CONCOURS D'ADMISSION DE 2011

Concepteur : ESSEC

OPTION ÉCONOMIQUE

MATHEMATIQUES

Mardi 10 mai de 14h à 18h

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à ***encadrer*** *dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.*
Ils ne doivent faire usage d'aucun document. l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.
Si au cours de l'épreuve un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants.

PROBLÈME 1 - Évolution des intentions de vote

Dans une élection à venir, deux candidats A et B se présentent.
Un groupe d'électeurs est composé de m individus, avec $m \geqslant 2$.
Initialement, au jour appelé « jour 0 », le nombre d'individus préférant le candidat A vaut a (il y en a donc $m - a$ préférant le candidat B). Ensuite, chaque jour, un des individus au hasard dans le groupe en rencontre un autre, au hasard également, et il lui parle des élections. Si leurs intentions de vote diffèrent, il le convainc de voter comme lui.

Pour tout entier naturel n, on note X_n le nombre d'individus du groupe ayant l'intention de voter pour le candidat A le soir du n-ième jour. Ainsi, X_n est une variable aléatoire à valeurs dans $[\![0, m]\!]$.
On remarque que X_0 est une variable aléatoire certaine : $P(X_0 = a) = 1$.

Partie I - Un cas particulier : $m = 4$

Dans cette partie, on étudie le cas d'un groupe formé de quatre électeurs.


1) Soit i et j deux entiers dans $[\![0, 4]\!]$. On note $p_{i,j}$ la probabilité pour qu'il y ait exactement j personnes dans le groupe ayant l'intention de voter pour A un jour donné, sachant qu'il y en avait i la veille.

   (a) Justifier : $p_{0,0} = p_{4,4} = 1$.

   (b) Justifier : si i et j dans $[\![0, 4]\!]$ sont tels que $|i - j| \geqslant 2$, alors $p_{i,j} = 0$.

   (c) Établir : $p_{1,0} = p_{1,2} = \dfrac{1}{4}$ et $p_{1,1} = \dfrac{1}{2}$.

   (d) De la même façon, donner pour tout $(i, j) \in [\![0, 4]\!]^2$ la probabilité $p_{i,j}$.
   On présentera les résultats sur le diagramme suivant, à reproduire et à compléter, et on justifiera quelques cas.



2) On définit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 0 \\ 1/4 & 1/3 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 1/2 \end{pmatrix}$, et pour tout entier naturel n, la matrice colonne $U_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) \\ P(X_n = 2) \\ P(X_n = 3) \end{pmatrix}$.

   (a) Pour tout entier naturel n, établir la relation : $U_{n+1} = MU_n$.
   En déduire pour tout entier naturel n, l'égalité $U_n = M^n U_0$.

   (b) Montrer que M admet trois valeurs propres distinctes α, β et γ, vérifiant $0 \leqslant \alpha < \beta < \gamma < 1$.

   Justifier qu'il existe une matrice carrée P d'ordre 3 inversible, que l'on ne demande pas de préciser, et D une matrice diagonale d'ordre 3, à préciser, telles que $P^{-1}MP = D$.

   (c) En déduire que pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$, la suite $\left(P(X_n = k)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est une combinaison linéaire des trois suites $\left(\alpha^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$, $\left(\beta^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ et $\left(\gamma^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

   (d) Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} P(X_n = k) = 0$.

3) Établir : $\lim\limits_{n\to+\infty} \left[P(X_n = 0) + P(X_n = 4)\right] = 1$. Comment interpréter ce résultat ?

Partie II - Le cas général

On revient dans cette partie au cas général d'un groupe de m électeurs.
On note $\pi_{n,k} = P(X_n = k)$, la probabilité pour qu'il y ait exactement k électeurs envisageant de voter pour A à l'issue du n-ième jour.

4) Soit n un entier naturel.

(a) Établir les trois relations :

$$\forall k \in [\![0, m-1]\!], \quad P_{(X_n=k)}(X_{n+1} = k+1) = \frac{k(m-k)}{m(m-1)} ;$$

$$\forall k \in [\![1, m]\!], \quad P_{(X_n=k)}(X_{n+1} = k-1) = \frac{k(m-k)}{m(m-1)} ;$$

$$\forall k \in [\![1, m-1]\!], \quad P_{(X_n=k)}(X_{n+1} = k) = 1 - \frac{2k(m-k)}{m(m-1)} .$$

(b) En déduire la relation, si $k \in [\![1, m-1]\!]$:

$$\pi_{n+1,k} = \frac{(k-1)(m+1-k)\pi_{n,k-1} + [m(m-1) - 2k(m-k)]\pi_{n,k} + (k+1)(m-1-k)\pi_{n,k+1}}{m(m-1)}.$$

5) (a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n et pour tout $k \in [\![1, m-1]\!]$,

$$\pi_{n,k} \leqslant \left(\frac{m(m-1)-2}{m(m-1)}\right)^n .$$

(b) En déduire, pour tout $k \in [\![1, m-1]\!]$, la limite de $\pi_{n,k}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

6) On définit l'événement V_A (respectivement V_B) suivant : « au bout d'un certain nombre de jours, tous les individus du groupe ont l'intention de voter pour A (respectivement pour B) ».

(a) Montrer que $P(V_A) = \lim\limits_{n\to+\infty} P(X_n = m)$ et $P(V_B) = \lim\limits_{n\to+\infty} P(X_n = 0)$.

(b) Montrer que $P(V_A) + P(V_B) = 1$.
Que signifie ce résultat ?

7) Pour tout entier naturel n, on pose $Z_n = X_{n+1} - X_n$.

(a) Justifier : $Z_n(\Omega) = \{-1, 0, 1\}$.

(b) Exprimer $P(Z_n = 1)$ en fonction des probabilités $\pi_{n,k}$ avec $k \in [\![1, m-1]\!]$.

(c) Comparer $P(Z_n = -1)$ et $P(Z_n = -1)$.

(d) En déduire que $E(Z_n) = 0$.

(e) Montrer que la suite $\Big(E(X_n)\Big)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante et déterminer cette constante en fonction de a.

8) Montrer que $P(V_A) = \dfrac{a}{m}$ et interpréter ce résultat.

PROBLÈME 2 - Une propriété limite des lois de Pareto

Question préliminaire

Soit g une fonction continue sur un intervalle I, à valeurs réelles.

9) (a) Montrer que pour tout α et β dans I tels que $\alpha < \beta$,

$$\frac{1}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta g(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 g\big(\alpha + (\beta-\alpha)x\big)\,\mathrm{d}x.$$

(b) Soit a, b, c, d dans I tels que $a < c < d < b$.
On suppose g décroissante sur I, établir l'encadrement :

$$\frac{1}{b-c}\int_c^b g(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{d-c}\int_c^d g(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{d-a}\int_a^d g(t)\,\mathrm{d}t.$$

Partie I - Partie fractionnaire d'une variable à densité

Pour tout réel x positif ou nul :
- on note $[x]$ la *partie entière* de x. On rappelle qu'il s'agit de l'unique entier naturel n qui vérifie l'encadrement : $n \leqslant x < n+1$.
- on note $\{x\} = x - [x]$, que l'on appelle la *partie fractionnaire* de x.

Par exemple, si $x = 12,34$ alors $[x] = 12$ et $\{x\} = 0,34$.

Dans cette partie, X désigne une variable aléatoire à valeurs réelles admettant une densité f qui vérifie les propriétés :
- f est nulle sur $]-\infty, 0[$;
- la restriction de f à $[0, +\infty[$ est continue et décroissante.

On pose $M = f(0)$, c'est le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

Soit $Y = \{X\} = X - [X]$, la variable aléatoire égale à la partie fractionnaire de X.
On note F_Y la fonction de répartition de Y.

10) Que vaut $F_Y(y)$ lorsque $y < 0$? Que vaut $F_Y(y)$ lorsque $y \geqslant 1$?
On justifiera les réponses.

11) Justifier l'égalité entre événements : $(Y = 0) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P(X = n)$.

En déduire : $F_Y(0) = 0$.

12) Soit y un réel de l'intervalle $]0, 1[$.

(a) Montrer l'égalité : $F_Y(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_n^{n+y} f(t)\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer, en utilisant la question préliminaire, les inégalités :
- Pour tout n entier naturel, $\int_n^{n+y} f(t)\,\mathrm{d}t \geqslant y \int_n^{n+1} f(t)\,\mathrm{d}t$;
- Pour tout n entier naturel non nul, $\int_n^{n+y} f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant y \int_{n-1+y}^{n+y} f(t)\,\mathrm{d}t$.

(c) En déduire : $y \int_0^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant F_Y(y) \leqslant \int_0^y f(t)\,\mathrm{d}t + y \int_y^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$, puis l'encadrement

$$y \leqslant F_Y(y) \leqslant y + M.$$

Partie II - Premier chiffre significatif d'une variable de Pareto

Pour tout réel λ strictement positif, on définit la fonction g_λ sur $\mathbb{R}$ par $g_\lambda : x \mapsto \begin{cases} \dfrac{\lambda}{x^{\lambda+1}} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

13) Montrer que pour tout réel λ strictement positif, g_λ est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$ (loi dite *de Pareto*).

Dans toute la suite, on note Z_λ une variable aléatoire admettant g_λ pour densité.

14) Déterminer la fonction de répartition G_λ de Z_λ.

15) On note ln la fonction *logarithme népérien*, et log la fonction *logarithme décimal.*

Cette fonction est définie sur $]0,+\infty[$ par : $\log(x) = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ pour tout réel x strictement positif.

On pose $X_\lambda = \log\left(Z_\lambda\right)$, et on note F_λ la fonction de répartition de X_λ.

(a) Établir, pour tout réel x, l'égalité : $F_\lambda(x) = G_\lambda\left(10^x\right)$.

(b) En déduire que X_λ suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre en fonction de λ.

16) On pose $Y_\lambda = \left\{X_\lambda\right\}$, la partie fractionnaire de X_λ.

Montrer, en utilisant les résultats de la partie I, que pour tout réel y de l'intervalle $]0,1[$:

$$\lim_{\lambda \to 0^+} P\left(Y_\lambda \leqslant y\right) = y.$$

En déduire que, lorsque λ tend vers 0, Y_λ converge en loi vers une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'intervalle $[0,1]$.

17) Pour tout réel x supérieur ou égal à 1, on note $\alpha(x)$ le premier chiffre dans l'écriture décimale de x. C'est un entier de l'intervalle $[\![1,9]\!]$.

Par exemple, $\alpha(50) = 5$ et $\alpha(213,43) = 2$.

(a) Pour tout $k \in [\![1,9]\!]$, montrer l'équivalence :

$$\alpha(x) = k \quad \Leftrightarrow \quad \left\{\log(x)\right\} \in \left[\log k, \log(k+1)\right[.$$

(b) On note $C_\lambda = \alpha\left(Z_\lambda\right)$ la variable aléatoire prenant comme valeur le premier chiffre de Z_λ.

Montrer, pour tout $k \in [\![1,9]\!]$: $\lim\limits_{\lambda \to 0^+} P(C_\lambda = k) = \log\left(1 + \dfrac{1}{k}\right)$.

Cette loi limite obtenue pour le premier chiffre de Z_λ est appelée *loi de Benford.*

MATH E ESSEC

Modification à faire

Problème 1
Question 7 (c)
Il était écrit : comparer $P(Z_n = -1)$ et $P(Z_n = -1)$

REMPLACER PAR : comparer $P(Z_n = -1)$ et $P(Z_n = 1)$

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Éléments propres et réduction
- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Variables aléatoires finies et lois usuelles
- Suites réelles
- Variables aléatoires à densité
- Compléments sur les variables aléatoires réelles
- Fonctions réelles : limites et continuité

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg