Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2013, filière ECG

Mathématiques approfondies emlyon

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1, partie I : étude d'une fonction définie par une intégrale
- Problème 1, parties II et III : autre expression intégrale de f et étude d'une densité
- Problème 2, parties I à III : exemple, trace et matrices de rang 1
- Problème 2, parties IV à VI : application en probabilités, diagonalisabilité et produit scalaire

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2013/maths-appro-emlyon

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Code épreuve : 295

BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

Concepteur : EMLYON Business School

1ère épreuve (option scientifique)

MATHÉMATIQUES

Lundi 29 avril 2013 de 8 heures à 12 heures

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d'aucun document : l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

PROBLÈME 1

Partie I : Étude d'une fonction f définie par une intégrale

1. Montrer que, pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$ converge.

On note $f :]0\,;+\infty[\longrightarrow \mathbf{R}$ l'application définie, pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, par : $\displaystyle f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$.

2. Montrer : $\forall x \in]0\,;+\infty[,\ \displaystyle f(x) \geqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-1}}{x+t}\,\mathrm{d}t$. En déduire : $f(x) \underset{x \longrightarrow 0^+}{\longrightarrow} +\infty$.

3. Montrer : $\forall x \in]0\,;+\infty[,\ 0 < f(x) \leqslant \dfrac{1}{x}$. En déduire : $f(x) \underset{x \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$.

4. Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} t\,\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge et que :

$$\forall x \in]0\,;+\infty[,\ \left|f(x) - \frac{1}{x}\right| \leqslant \frac{1}{x^2}\int_0^{+\infty} t\,\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

En déduire : $f(x) \underset{x \longrightarrow +\infty}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

Tournez la page S.V.P.

Partie II : Une autre expression intégrale de f

A - Dérivabilité et expression de la dérivée de f sous forme d'une intégrale

5. Soit $(x,h) \in]0;+\infty[\times\mathbb{R}^*$ tel que $h > -\dfrac{x}{2}$.

a. Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(x+t)^2}\,\mathrm{d}t$ converge.

b. Établir : $\forall t \in [0;+\infty[,\ \left|\dfrac{1}{h}\left(\dfrac{1}{x+h+t} - \dfrac{1}{x+t}\right) + \dfrac{1}{(x+t)^2}\right| \leqslant \dfrac{2|h|}{x^3}$.

c. En déduire : $\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} + \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(x+t)^2}\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \dfrac{2|h|}{x^3}$.

6. En déduire que f est dérivable sur $]0;+\infty[$ et que : $\forall x \in]0;+\infty[,\ f'(x) = -\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(x+t)^2}\,\mathrm{d}t$.

7. Montrer, pour tout $x \in]0;+\infty[$ et tout $(\varepsilon, A) \in]0;1] \times [1;+\infty[$:

$$\int_\varepsilon^A \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(x+t)^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{e}^{-A}}{x+A} + \frac{\mathrm{e}^{-\varepsilon}}{x+\varepsilon} - \int_\varepsilon^A \frac{\mathrm{e}^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t.$$

8. En déduire : $\forall x \in]0;+\infty[,\ f'(x) = -\dfrac{1}{x} + f(x)$.

9. Montrer que f est de classe C^2 sur $]0;+\infty[$ et que : $\forall x \in]0;+\infty[,\ f''(x) = \dfrac{1}{x^2} + f'(x)$.

B - Intervention d'une fonction auxiliaire g

On note $g :]0;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ l'application définie, pour tout $x \in]0;+\infty[$, par : $g(x) = \mathrm{e}^{-x} f(x)$.

10. Démontrer que g est dérivable sur $]0;+\infty[$ et que : $\forall x \in]0;+\infty[,\ g'(x) = -\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$.

11. Montrer que, pour tout $x \in]0;+\infty[$, l'intégrale $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$ converge et que :

$$\forall x \in]0;+\infty[,\ g(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u,$$

puis : $\forall x \in]0;+\infty[,\ f(x) = \mathrm{e}^x \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$.

12. Montrer : $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u \underset{x \longrightarrow +\infty}{\sim} \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$.

13. Quelle est la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n^2 \int_n^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$?

Partie III : Étude d'une densité

On note $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ l'application définie, pour tout $t \in \mathbb{R}$, par : $h(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{f(1)} \dfrac{\mathrm{e}^{-t}}{1+t} & \text{si } t \geqslant 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$

14. Montrer que h est une densité.

15. Soit X une variable aléatoire réelle admettant h pour densité. Montrer que X admet une espérance et calculer $\mathrm{E}(X)$ à l'aide de $f(1)$.

PROBLÈME 2

Dans tout le problème, n est un entier tel que $n \geqslant 2$.
On note $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées réelles d'ordre n et $\mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles à une colonne et n lignes, nommées « matrices colonnes » dans la suite du problème.

Si $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tA$ désigne la matrice transposée de A.

Si $V \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, alors ${}^tV$ désigne la matrice transposée de V.
Si $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ et si $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$, alors le coefficient de la ligne numéro i et de la colonne numéro j de A est noté $a_{i,j}$, la matrice A est notée $A = \left(a_{i,j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Si $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, alors la matrice colonne V est notée $V = (v_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$.

Si $A = \left(a_{i,j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, alors pour tout $j \in [\![1;n]\!]$, on note $C_j(A)$ la matrice colonne de $\mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ constituée des coefficients de la colonne numéro j de A. Ainsi : $C_j(A) = (a_{i,j})_{1 \leqslant i \leqslant n}$.

Partie I : Un exemple

Soient $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $A_0 = U_0\,{}^tV_0$.

1. Vérifier que 0 est valeur propre de A_0 et déterminer une base du sous-espace propre associé.

2. a. Calculer A_0U_0.

b. Montrer que A_0 est diagonalisable dans $\mathbf{M}_4(\mathbb{R})$.

c. Déterminer une matrice diagonale D de $\mathbf{M}_4(\mathbb{R})$ et une matrice inversible P de $\mathbf{M}_4(\mathbb{R})$ telles que $A_0 = PDP^{-1}$.

Partie II : Trace d'une matrice carrée

Pour toute matrice carrée $A = \left(a_{i,j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, on appelle trace de A et on note $\mathrm{Tr}(A)$ la somme des coefficients diagonaux de A, c'est à dire $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

3. Montrer que l'application $\mathrm{Tr} : \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \mathrm{Tr}(A)$, est linéaire.

4. Montrer : $\forall (A,B) \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})^2, \quad \mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

5. Vérifier : $\forall\, A = \left(a_{i,j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \quad \mathrm{Tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{j,i}^2$.

Partie III : Une caractérisation des matrices de rang 1

6. Soient $U = (u_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ et $V = (v_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ deux matrices colonnes non nulles de $\mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

a. Justifier : $U\,{}^tV \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer les coefficients de $U\,{}^tV$ l'aide des coefficients de U et de V.

b. Exprimer $\mathrm{Tr}(U\,{}^tV)$ à l'aide des coefficients de U et de V.

c. Quel est le rang de $U\,{}^tV$?

Tournez la page S.V.P.

7. Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice de rang 1.

a. Montrer qu'il existe $j_0 \in [\![1;n]\!]$ tel que, pour tout $j \in [\![1;n]\!]$, il existe $\alpha_j \in \mathbb{R}$ vérifiant :
$$C_j(A) = \alpha_j C_{j_0}(A).$$

b. En déduire qu'il existe deux matrices colonnes non nulles U et V de $\mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telles que $A = U\,{}^tV$.

8. Énoncer une caractérisation des matrices de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1.

Partie IV : Une application en probabilités

On considère deux variables aléatoires X et Y définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathrm{P})$.
On suppose de plus : $X(\Omega) = Y(\Omega) = [\![1;n]\!]$.

On note, pour tout $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$, $m_{i,j} = \mathrm{P}\big((X=i) \cap (Y=j)\big)$, puis
$M = (m_{i,j})_{i,j} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, $U_X = \big(\mathrm{P}(X=i)\big)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $U_Y = \big(\mathrm{P}(Y=i)\big)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

9. On suppose, dans cette question, que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.
Calculer $U_X\,{}^tU_Y$. En déduire que la matrice M est de rang 1.

10. On suppose, dans cette question, que la matrice M est de rang 1.

a. Montrer : $C_1(M) + \cdots + C_n(M) = U_X$.

b. En déduire que, pour tout $j \in [\![1;n]\!]$, il existe $\beta_j \in \mathbb{R}$ tel que $C_j(M) = \beta_j U_X$.

c. Montrer : $\forall j \in [\![1;n]\!]$, $\mathrm{P}(Y=j) = \beta_j$.

d. En déduire que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

Partie V : Une caractérisation des matrices de rang 1 diagonalisables

Soit $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice de rang 1. On note U et V deux matrices colonnes non nulles de $\mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telles que $A = U\,{}^tV$ et on note $a = \mathrm{Tr}(A)$.

11. Montrer que 0 est valeur propre de A et déterminer la dimension du sous-espace propre associé.

12. Montrer : ${}^tVU = (a)$, puis : $A^2 = aA$.

13. Montrer que si $a = 0$, alors A n'est pas diagonalisable dans $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$.

14. On suppose $a \neq 0$. Calculer AU. Déduire des questions précédentes que A est diagonalisable.

15. Énoncer une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1 soit diagonalisable.

Partie VI : Construction d'un produit scalaire et d'un endomorphisme symétrique

16. Montrer que l'application : $(M,N) \mapsto \langle M,N \rangle = \mathrm{Tr}({}^tMN)$ est un produit scalaire sur $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$.

On munit dorénavant $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ de ce produit scalaire.
On considère une matrice colonne $V = (v_i)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \mathbf{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telle que $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} v_j^2 = 1$. On note $S = V\,{}^tV$.

17. Montrer que S est une matrice symétrique de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ et que $S^2 = S$.

18. **a.** Montrer que l'application $\Phi : M \longmapsto SM$ est un endomorphisme symétrique de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$.

b. Vérifier $\Phi^2 = \Phi$. Que peut-on dire des valeurs propres de Φ ?

c. On note e l'application identité de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les sous-espaces vectoriels $\mathrm{Ker}(\Phi)$ et $\mathrm{Ker}(\Phi - \mathrm{e})$ sont supplémentaires orthogonaux dans $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$.

IMPRIMERIE NATIONALE – 13 1244 – D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Fonctions réelles : limites et continuité
- Suites réelles
- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Variables aléatoires à densité
- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Éléments propres et réduction
- Compléments d'algèbre linéaire
- Couples de variables aléatoires discrètes finies

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg