Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2013, filière ECG

Mathématiques I ESSEC (ECS)

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I. Construction de la fonction arctan
- Partie II. Premières propriétés de Phi(f) et de Phi
- Partie III. Étude d'un exemple
- Partie IV. Retour à l'étude de Phi

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2013/maths-s-essec-1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Code épreuve : 281

BANQUE COMMUNE D'EPREUVES

CONCOURS D'ADMISSION DE 2013

Concepteur : ESSEC

OPTION SCIENTIFIQUE

MATHEMATIQUES

Vendredi 10 mai de 14h à 18h

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
*Les candidats sont invités à **encadrer** dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.*
Ils ne doivent faire usage d'aucun document. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

Le problème comporte quatre parties.
On pose : $E_0 = \left\{ f \in C^0(\mathbb{R},\mathbb{R}), \text{ bornée sur } \mathbb{R} \right\}$; si $f \in E_0$, on notera $N_0(f) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|$.

Partie I – Construction de la fonction arctan.

On définit, sous réserve d'existence, la fonction arctan : $x \in \mathbb{R} \mapsto \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$.

1) Vérifier que la fonction arctan est bien définie sur $\mathbb{R}$, impaire, de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et préciser une expression de $\frac{d}{dx}(\arctan)$.

Tournez la page S.V.P.

2) Montrer que arctan admet une limite finie, notée provisoirement L, en $+\infty$ et justifier que arctan est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-L,L[$.

3) Pour tout $x\in\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, calculer $\arctan\left[\tan(x)\right]$, en déduire la valeur de L.

4) Justifier que, pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, $|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$.

5) Montrer que, pour tout $x\in\mathbb{R}_+^*$, $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$.

Si $f\in E_0$, on définit, sous réserve d'existence, $\Phi(f):x\in\mathbb{R}\mapsto\int_0^{+\infty}\arctan(tx)\frac{f(t)}{1+t^2}dt$.

L'objectif du problème est d'obtenir quelques propriétés de $\Phi(f)$ et de Φ.

Partie II – Premières propriétés de $\Phi(f)$ et de Φ.

6) Vérifier que E_0 est un sous-espace vectoriel de $C^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

7) Soit $f\in E_0$, montrer que, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty}\arctan(tx)\frac{f(t)}{1+t^2}dt$ est absolument convergente.

8) Soit $f\in E_0$, montrer que $\Phi(f)$ est bornée et $N_0\left[\Phi(f)\right]\le\frac{\pi^2}{4}N_0(f)$.

9) Continuité de $\Phi(f)$ pour $f\in E_0$.

Dans cette question, f désigne un élément de E_0 et x un réel.

a- Soit A un réel strictement positif et $h\in\mathbb{R}^*$, vérifier que :

$$\left|\left[\Phi(f)\right](x+h)-\left[\Phi(f)\right](x)\right|\le N_0(f)\left(\int_0^A\frac{\left|\arctan\left(t(x+h)\right)-\arctan(tx)\right|}{1+t^2}dt+\int_A^{+\infty}\frac{\left|\arctan\left(t(x+h)\right)-\arctan(tx)\right|}{1+t^2}dt\right)$$

b- En déduire que, pour tout $h\in\mathbb{R}^*$, pour tout $A>0$,

$$\left|\left[\Phi(f)\right](x+h)-\left[\Phi(f)\right](x)\right|\le N_0(f)\left(|h|\int_0^A\frac{t}{1+t^2}dt+\pi\int_A^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2}\right).$$

c- Soit $h\in\mathbb{R}^*$, en choisissant $A=\frac{1}{|h|}$, établir que :

$$\left|\left[\Phi(f)\right](x+h)-\left[\Phi(f)\right](x)\right|\le|h|\frac{N_0(f)}{2}\ln\left(1+\frac{1}{h^2}\right)+\pi N_0(f)\arctan|h|.$$

d- Montrer alors que $\Phi(f)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

e- En déduire que $\Phi:f\in E_0\mapsto\Phi(f)$ est un endomorphisme de E_0.

Partie III – Etude d'un exemple.

Dans cette partie, on s'intéresse à l'application $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, x\mapsto g(x)=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(tx)}{1+t^2}dt$.

g est l'image par Φ de l'application constante égale à 1 : $x\in\mathbb{R}\mapsto 1$.

10) Vérifier que g est impaire.

11) Dérivabilité de g sur $]0,+\infty[$. Soit x un réel strictement positif.

a- Vérifier que, pour tout $u\in\mathbb{R}$, $|\arctan''(u)|\le\frac{1}{1+u^2}$.

b- Soit a et b deux réels distincts et I le segment d'extrémités a et b. Montrer que :

$$\left|\arctan b-\arctan a-\frac{b-a}{1+a^2}\right|\le\frac{(b-a)^2}{2}\max_{u\in I}\left(\frac{1}{1+u^2}\right).$$

c- Soit $h\in\left]-\frac{x}{2},\frac{x}{2}\right[$ et t un réel positif, établir :

$$\left|\arctan\left[t(x+h)\right]-\arctan(tx)-\frac{th}{1+t^2x^2}\right|\le\frac{t^2h^2}{2}\frac{1}{1+\frac{t^2x^2}{4}}.$$

d- Montrer alors que, pour tout $h\in\left]-\frac{x}{2},\frac{x}{2}\right[$,

$$\left|g(x+h)-g(x)-h\int_0^{+\infty}\frac{t}{(1+t^2x^2)(1+t^2)}dt\right|\le 2h^2\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{(4+t^2x^2)(1+t^2)}dt.$$

e- En déduire que g est dérivable sur $]0,+\infty[$ et justifier que, pour tout $x>0$,

$$g'(x)=\int_0^{+\infty}\frac{t}{(1+t^2x^2)(1+t^2)}dt.$$

f- g est-elle dérivable sur $]-\infty,0[$? Si oui, que vaut $g'(x)$ pour $x<0$?

12) Calcul de $g'(x)$ pour $x>0$.

a- Déterminer $g'(1)$.

b- Pour tout $x\in]0,1[\cup]1,+\infty[$, chercher des expressions $A(x)$ et $B(x)$, indépendantes de t, telles que, pour tout $t\in\mathbb{R}$, $\frac{t}{(1+t^2x^2)(1+t^2)}=A(x)\frac{t}{1+t^2x^2}+B(x)\frac{t}{1+t^2}$.

c- En déduire que, pour tout $x\in]0,1[\cup]1,+\infty[$, $g'(x)=\frac{\ln x}{x^2-1}$.

d- g est-elle de classe C^1 sur $]0,+\infty[$?

13) Une nouvelle expression de $g(x)$ pour $x>0$.

a- Justifier, pour tout $x>0$, la convergence de l'intégrale $\int_0^x\frac{\ln t}{t^2-1}dt$.

Tournez la page S.V.P.

b- Montrer que, pour tout $x>0$, que $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(tx)}{1+t^2}dt=\int_0^x\frac{\ln t}{t^2-1}dt$.

14) Etude de la limite de g en $+\infty$.

a- Démontrer que, pour tout $x>0$, $g(x)=\frac{\pi^2}{4}-\int_0^{+\infty}\arctan\left(\frac{1}{tx}\right)\frac{1}{1+t^2}dt$.

b- Ecrire, pour tout $x>0$,

$\int_0^{+\infty}\arctan\left(\frac{1}{tx}\right)\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{x}}}\arctan\left(\frac{1}{tx}\right)\frac{1}{1+t^2}dt+\int_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^{+\infty}\arctan\left(\frac{1}{tx}\right)\frac{1}{1+t^2}dt$ et montrer alors que : $\left|\int_0^{+\infty}\arctan\left(\frac{1}{tx}\right)\frac{1}{1+t^2}dt\right|\le\frac{\pi}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}\int_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^{+\infty}\frac{1}{t}\frac{1}{1+t^2}dt\le\frac{\pi}{\sqrt{x}}$.

c- Déterminer alors $\lim_{x\to+\infty}g(x)$.

15) Application au calcul de $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$.

a- Montrer que $\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1-t^2}dt$ converge et calculer sa valeur à l'aide des questions précédentes.

b- Vérifier que $\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{1-t^2}dt=2\int_0^1\frac{\ln t}{1-t^2}dt$.

c- Soit $n\in\mathbb{N}$, démontrer que $\int_0^1\frac{\ln t}{1-t^2}dt=\sum_{k=0}^{n}\int_0^1 t^{2k}\ln t\,dt+\int_0^1\frac{\ln t}{1-t^2}t^{2n+2}dt$ (on justifiera l'existence des intégrales introduites).

d- Pour tout $n\in\mathbb{N}$, calculer $\int_0^1 t^{2n}\ln t\,dt$.

e- Montrer que $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{\ln t}{1-t^2}t^{2n+2}dt=0$.

f- Donner alors la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$. En déduire celle de $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$.

Partie IV – Retour à l'étude de Φ.

16) Montrer que $\sup_{f\in E_0\setminus\{0\}}\frac{N_0[\Phi(f)]}{N_0(f)}=\frac{\pi^2}{4}$.

Dans toute la suite du problème, on considère :

- $\lambda\in\mathbb{R}$ tel que $|\lambda|<\frac{4}{\pi^2}$, on pourra poser $\gamma=\frac{\pi^2}{4}|\lambda|$.
- pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\Phi^n=\underbrace{\Phi o\cdots o\Phi}_{n\text{ fois}}$, autrement dit $\Phi^0=id_{E_0}$ et, pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\Phi^{n+1}=\Phi o\Phi^n$.

- $f \in E_0 \setminus \{0\}$, on posera $M = N_0(f)$.
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n = \lambda^n \Phi^n(f)$.

17) Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_{n+1} = \lambda\Phi(\varphi_n)$ et $N_0(\varphi_{n+1}) \leq \gamma N_0(\varphi_n)$.

18) Peut-on avoir $\lambda\Phi(f) = f$? Que peut-on alors dire de $id_{E_0} - \lambda\Phi$?

19) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $N_0(\varphi_n) \leq \gamma^n M$ et que la série $\sum_{n\geq 0} N_0(\varphi_n)$ converge.

20) Montrer alors que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{n\geq 0} \varphi_n(x)$ converge.

On note alors $\varphi : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(x)$.

21) Montrer que φ est bornée sur $\mathbb{R}$.

22) Continuité de φ.

a- Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $h \in \mathbb{R}^*$,
$$|\varphi_{n+1}(x+h) - \varphi_{n+1}(x)| \leq |\lambda| N_0(\varphi_n)\left[\frac{|h|}{2}\ln\left(1+\frac{1}{h^2}\right) + \pi \arctan|h|\right].$$

b- En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $h \in \mathbb{R}^*$,
$$|\varphi(x+h) - \varphi(x)| \leq |\lambda|\left(\sum_{n=0}^{+\infty} N_0(\varphi_n)\right)\left[\frac{|h|}{2}\ln\left(1+\frac{1}{h^2}\right) + \pi \arctan|h|\right] + |f(x+h) - f(x)|.$$

c- Justifier que φ est continue sur $\mathbb{R}$.

23) Application aux valeurs spectrales de Φ.

a- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\left(id_{E_0} - \lambda\Phi\right)\left(\sum_{k=0}^{n+1} \varphi_k\right)$ et montrer que
$$\lim_{n\to+\infty} N_0\left[\left(id_{E_0} - \lambda\Phi\right)\left(\sum_{k=0}^{n+1} \varphi_k\right) - f\right] = 0.$$

b- Montrer alors que $\left(id_{E_0} - \lambda\Phi\right)(\varphi) = f$. Que peut-on dire de $id_{E_0} - \lambda\Phi$?

c- Soit $\mu \in \mathbb{R}^*$ tel que $\Phi - \mu id_{E_0}$ ne soit pas bijective, montrer que $|\mu| \leq \frac{\pi^2}{4}$.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Fonctions réelles : limites et continuité
- Compléments d'algèbre linéaire
- Suites réelles
- Réels, sommes et produits
- Éléments propres et réduction

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg