Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2018, filière ECG

Mathématiques appliquées emlyon

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2018/maths-appli-emlyon

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

BCE

BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

Code sujet : 296

Conception : Emlyon business school

(1ère épreuve) OPTION ÉCONOMIQUE

MATHÉMATIQUES

Vendredi 27 avril 2018, de 14h. à 18 h.

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à ***encadrer*** *dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.*
Aucun document n'est autorisé. ***L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.*** *Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.*
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

EXERCICE 1

On note $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base $\mathscr{B}$ est la matrice A donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -5 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On considère également l'endomorphisme g de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad g(x, y, z) = (\, x + y - z \,,\, 2y \,,\, -x + y + z \,).$$

Enfin, on pose :

$$u = e_1 - e_2 = (1, -1, 0) \quad \text{et} \quad v = f(e_1) + e_1.$$

1. **a.** Calculer v.

b. Montrer que la famille $\mathscr{C} = (u, v, e_1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

c. On note P la matrice de passage de la base $\mathscr{B}$ à la base $\mathscr{C}$.
Expliciter la matrice P et calculer P^{-1}.

2. **a.** Déterminer la matrice A' de f dans la base $\mathscr{C}$.

b. En déduire les valeurs propres de f. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ?

c. L'endomorphisme f est-il bijectif ?

d. Expliciter, sans justification, le lien entre les matrices A, A', P et P^{-1}.

3. **a.** Déterminer la matrice B de g dans la base $\mathscr{B}$.

b. Montrer : $B^2 = 2\,B$.

c. En déduire les valeurs propres de g, ainsi qu'une base de chaque sous-espace propre.

d. L'endomorphisme g est-il diagonalisable ?

On pose : $\mathscr{E} = \{ M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \ / \ BM = MA \}$.

4. **a.** Montrer que $\mathscr{E}$ est un espace vectoriel.

b. Soit M une matrice appartenant à $\mathscr{E}$.
Montrer que M n'est pas inversible. *(On pourra raisonner par l'absurde).*

5. On cherche à montrer que $\mathscr{E}$ n'est pas réduit à l'ensemble $\{0\}$.

a. Justifier que, pour tout réel λ, les matrices $A - \lambda I_3$ et $({}^tA) - \lambda I_3$ ont même rang, la matrice I_3 désignant la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

b. En déduire que les matrices B et ${}^tA$ admettent une valeur propre en commun, notée α.

c. Soient X un vecteur propre de B associé à la valeur propre α, et Y un vecteur propre de ${}^tA$ associé à la valeur propre α. On note : $N = X\ {}^tY$.
Montrer que la matrice N est non nulle et que N appartient à $\mathscr{E}$.

d. En déduire : $\dim(\mathscr{E}) \geqslant 2$.

Tournez la page S.V.P.

EXERCICE 2

Dans tout cet exercice, f désigne la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$\forall x \in]0\,;+\infty[, \quad f(x) = x - \ln(x).$$

PARTIE I : Étude de la fonction f

1. Dresser le tableau de variations de f en précisant ses limites en 0 et en $+\infty$.

2. Montrer que l'équation $f(x) = 2$, d'inconnue $x \in]0\,;+\infty[$, admet exactement deux solutions, que l'on note a et b, telles que $0 < a < 1 < b$.

3. Montrer : $b \in [2\,;4]$. On donne $\ln(2) \simeq 0,7$.

PARTIE II : Étude d'une suite

On pose : $u_0 = 4$ et $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \ln(u_n) + 2$.

4. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie et que l'on a : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in [b\,;+\infty[$.

5. Déterminer la monotonie de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. En déduire qu'elle converge et préciser sa limite.

6. **a.** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - b \leqslant \dfrac{1}{2}(u_n - b)$.

b. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leqslant u_n - b \leqslant \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

7. **a.** Écrire une fonction Scilab d'en-tête `function u = suite(n)` qui, prenant en argument un entier n de $\mathbb{N}$, renvoie la valeur de u_n.

b. Recopier et compléter la ligne 3 de la fonction Scilab suivante afin que, prenant en argument un réel `epsilon` strictement positif, elle renvoie une valeur approchée de b à `epsilon` près.

```
1 function b = valeur_approchee(epsilon)
2     n = 0
3     while .........
4         n = n+1
5     end
6     b = suite(n)
7 endfunction
```

PARTIE III : Étude d'une fonction définie par une intégrale

On note Φ la fonction donnée par :

$$\Phi(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{f(t)}\,\mathrm{d}t.$$

8. Montrer que Φ est bien définie et dérivable sur $]0\,;+\infty[$, et que l'on a :

$$\forall x \in]0\,;+\infty[, \quad \Phi'(x) = \frac{\ln(2) - \ln(x)}{\big(x - \ln(x)\big)\big(2x - \ln(2x)\big)}.$$

9. En déduire les variations de Φ sur $]0\,;+\infty[$.

10. Montrer : $\forall x \in]0\,;+\infty[,\quad 0 \leqslant \Phi(x) \leqslant x$.

11. a. Montrer que Φ est prolongeable par continuité en 0.

On note encore Φ la fonction ainsi prolongée. Préciser alors $\Phi(0)$.

b. Montrer : $\lim\limits_{x\to 0} \Phi'(x) = 0$.

On admet que la fonction Φ est alors dérivable en 0 et que $\Phi'(0) = 0$.

12. On donne $\Phi(2) \simeq 1,1$ et on admet que $\lim\limits_{x\to+\infty} \Phi(x) = \ln(2) \simeq 0,7$.

Tracer l'allure de la courbe représentative de Φ ainsi que la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

PARTIE IV : Étude d'une fonction de deux variables

On considère la fonction H de classe C^2 sur l'ouvert $U =]0\,;+\infty[^2$ définie par :

$$\forall (x,y) \in]0\,;+\infty[^2,\quad H(x,y) = \frac{x^2}{2} - xy - 2x + \mathrm{e}^y.$$

13. a. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de H en tout (x,y) de U.

b. Montrer que la fonction H admet exactement deux points critiques : $\big(a, \ln(a)\big)$ et $\big(b, \ln(b)\big)$, où les réels a et b sont ceux introduits dans la question **2.**

14. a. Écrire la matrice hessienne, notée M_a, de H au point $\big(a, \ln(a)\big)$.

b. Montrer que M_a admet deux valeurs propres distinctes, notées λ_1 et λ_2, vérifiant

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 &= a+1 \\ \lambda_1\,\lambda_2 &= a-1 \end{cases}.$$

c. La fonction H présente-t-elle un extremum local au point $\big(a, \ln(a)\big)$?

15. La fonction H présente-t-elle un extremum local au point $\big(b, \ln(b)\big)$?

Tournez la page S.V.P.

EXERCICE 3

On dispose d'une pièce de monnaie amenant Pile avec la probabilité $\frac{2}{3}$ et Face avec la probabilité $\frac{1}{3}$.

PARTIE I : Étude d'une première variable aléatoire

On effectue une succession de lancers avec cette pièce et on définit la variable aléatoire X prenant la valeur du nombre de Face obtenus avant l'obtention du deuxième Pile.

1. a. Décrire les événements $[X = 0], [X = 1], [X = 2]$ puis calculer leurs probabilités.

b. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbf{P}([X = n]) = (n+1)\frac{4}{3^{n+2}}$.

PARTIE II : Étude d'une expérience en deux étapes

On effectue une succession de lancers avec la pièce précédente jusqu'à l'obtention du deuxième Pile ; puis en fonction du nombre n de Face obtenus, on place $n+1$ boules dans une urne, les boules étant numérotées de 0 à n et indiscernables au toucher, et enfin on pioche au hasard une boule de cette urne.

On note toujours X la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face obtenus, et on note U la variable aléatoire prenant la valeur du numéro de la boule obtenue. On pose : $V = X - U$.

2. a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable U.

b. Déterminer, pour tout n de $\mathbb{N}$, la loi conditionnelle de U sachant $[X = n]$.

c. En déduire, pour tout k de $\mathbb{N}$:

$$\mathbf{P}([U = k]) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{n+1}\mathbf{P}([X = n]) \qquad \text{puis} \qquad \mathbf{P}([U = k]) = \frac{2}{3^{k+1}}.$$

d. Montrer que U admet une espérance et une variance et les calculer.

3. a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable V.

b. Déterminer, pour tout n de $\mathbb{N}$, la loi conditionnelle de V sachant $[X = n]$.

c. En déduire la loi de V.

4. Montrer que les variables aléatoires U et V sont indépendantes.

5. Que vaut $\mathbf{Cov}(U, V)$? En déduire $\mathbf{Cov}(X, U)$.

PARTIE III : Étude d'un jeu

Dans cette partie, p désigne un réel de $]0\,;1[$.

Deux individus A et B s'affrontent dans un jeu de Pile ou Face dont les règles sont les suivantes :

- le joueur A dispose de la pièce amenant Pile avec la probabilité $\frac{2}{3}$ et lance cette pièce jusqu'à l'obtention du deuxième Pile ; on note X la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face alors obtenus ;
- le joueur B dispose d'une autre pièce amenant Pile avec la probabilité p et lance cette pièce jusqu'à l'obtention d'un Pile ; on note Y la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de Face alors obtenus ;

- le joueur A gagne si son nombre de Face obtenus est inférieur ou égal à celui de B ; sinon c'est le joueur B qui gagne.

On dit que le jeu est équilibré lorsque les joueurs A et B ont la même probabilité de gagner.


6. Simulation informatique

a. Écrire une fonction Scilab d'en-tête `function x = simule_X()` qui simule la variable aléatoire X.

b. On suppose que l'on dispose d'une fonction `simule_Y` qui, prenant en argument un réel p de $]0\,;1[$, simule la variable aléatoire Y. Expliquer ce que renvoie la fonction suivante :

```
1  function r = mystere(p)
2      r = 0
3      N = 10^4
4      for k = 1:N
5          x = simule_X()
6          y = simule_Y(p)
7          if x <= y then
8              r = r + 1/N
9          end
10     end
11 endfunction
```

c. On trace, en fonction de p, une estimation de la probabilité que A gagne et on obtient le graphe suivant :



À la vue de ce graphe, conjecturer une valeur de p pour lequel le jeu serait équilibré.

7. Étude de la variable aléatoire Y

On note Z la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de lancers effectués par le joueur B.

a. Reconnaître la loi de Z et préciser son(ses) paramètre(s), son espérance et sa variance.

b. Exprimer Y à l'aide de Z et en déduire l'existence de l'espérance et de la variance de Y et préciser leurs valeurs.

c. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbf{P}([Y \geqslant n]) = (1-p)^n$.

8. a. Montrer : $\mathbf{P}([X \leqslant Y]) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{P}([X = n])\,\mathbf{P}([Y \geqslant n])$.

b. Déduire des résultats précédents : $\mathbf{P}([X \leqslant Y]) = \dfrac{4}{(2+p)^2}$.

c. Déterminer la valeur de p pour lequel le jeu est équilibré.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Éléments propres et réduction
- Compléments d'algèbre linéaire
- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Suites réelles
- Fonctions de n variables : continuité et calcul différentiel
- Compléments sur les variables aléatoires réelles
- Couples de variables aléatoires discrètes finies

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg