Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2018, filière ECG

Mathématiques approfondies emlyon

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1
- Problème 2

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2018/maths-appro-emlyon

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

BCE
BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

Code sujet : 295

Conception : Emlyon business school

(1ère épreuve) OPTION SCIENTIFIQUE

MATHÉMATIQUES

Vendredi 27 avril 2018, de 14h. à 18 h.

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à ***encadrer*** *dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.*
Aucun document n'est autorisé. ***L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.*** *Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.*
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

PROBLÈME 1

On définit la fonction I d'une variable réelle x par : $\quad I(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{xt} + \mathrm{e}^{-xt}}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t.$

PARTIE I : Étude d'une suite d'intégrales

On pose, pour tout k de $\mathbb{N}$, $\quad W_k = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \big(\sin(u)\big)^k\,\mathrm{d}u.$

1. Calculer les intégrales W_0 et W_1.

2. **a.** Soit $k \in \mathbb{N}$. À l'aide d'une intégration par parties, montrer : $\quad W_k - W_{k+2} = \dfrac{1}{k+1}\,W_{k+2}.$

b. En déduire : $\quad \forall k \in \mathbb{N},\ W_{2k} = \dfrac{(2k)!}{2^{2k}\,(k\,!)^2}\,\dfrac{\pi}{2}.$

PARTIE II : Une autre expression de $I(x)$

3. Montrer que, pour tout k de $\mathbb{N}$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^k}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$ converge et que $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^k}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = W_k.$

Pour cela, on pourra utiliser le changement de variable $t = \sin(u)$ après avoir justifié sa validité.

4. **a.** Montrer que la fonction I est définie sur $\mathbb{R}$ et préciser sa parité.

b. Donner la valeur de $I(0)$.

5. Soit $x \in \mathbb{R}^+$.

a. Soient $t \in [0\,;1]$ et $n \in \mathbb{N}$. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre $2n$ appliquée à la fonction $u \longmapsto \mathrm{e}^u + \mathrm{e}^{-u}$ entre 0 et xt, montrer :

$$\left|\mathrm{e}^{xt} + \mathrm{e}^{-xt} - \sum_{k=0}^{n} \frac{2(xt)^{2k}}{(2k)!}\right| \leqslant \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\,\mathrm{e}^x.$$

b. En déduire, pour tout n de $\mathbb{N}$: $\quad \left|I(x) - \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{2\,x^{2k}}{(2k)!}\,W_{2k}\right| \leqslant \frac{x^{2n+1}\,\pi}{2\,(2n+1)!}\,\mathrm{e}^x.$

c. En déduire que la série $\displaystyle\sum_{k\geqslant 0} \frac{x^{2k}}{2^{2k}\,(k\,!)^2}$ converge et que l'on a : $\quad \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{2^{2k}\,(k\,!)^2} = \frac{1}{\pi}\,I(x).$

PARTIE III : Équivalent de $I(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$

6. Montrer, pour tout x de $\mathbb{R}^+$: $\quad 0 \leqslant \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-xt}}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\pi}{2}.$

7. **a.** Montrer, pour tout v de $\left[0\,;\dfrac{1}{2}\right]$: $\quad 1 \leqslant \dfrac{1}{1-v} \leqslant (1+v)^2.$

b. Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Montrer, à l'aide du changement de variable $u = 1 - t$:

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{xt}}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-xu}}{\sqrt{u}\,\sqrt{1-\dfrac{u}{2}}}\,\mathrm{d}u.$$

Tournez la page S.V.P.

c. En déduire, pour tout x de $\mathbb{R}^+$:

$$\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-xu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u \leqslant \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{xt}}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-xu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u + \frac{\mathrm{e}^x}{2\sqrt{2}}\int_0^1 \mathrm{e}^{-xu}\sqrt{u}\,\mathrm{d}u.$$

8. a. Rappeler l'expression d'une densité de la loi normale d'espérance nulle et de variance $\frac{1}{2}$.

En déduire les convergences et les valeurs des intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} t^2\,\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

b. Soit $x \in \mathbb{R}^{+*}$. À l'aide du changement de variable $t = \sqrt{xu}$, montrer :

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-xu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{x}} \quad \text{et} \quad \int_0^1 \mathrm{e}^{-xu}\sqrt{u}\,\mathrm{d}u \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2x\sqrt{x}}.$$

9. En déduire : $I(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{\mathrm{e}^x\sqrt{\pi}}{\sqrt{2x}}$.

PARTIE IV : Une application en probabilités

Dans cette partie, λ désigne un réel strictement positif.


On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, suivant toutes les deux la loi de Poisson de paramètre λ.

On s'intéresse à la probabilité de l'événement $[X = Y]$.

10. a. Écrire une fonction Scilab d'en-tête `function r = estime(lambda)` qui, prenant en argument un réel `lambda` strictement positif, simule un grand nombre de fois les variables aléatoires X et Y, et renvoie une estimation de $\mathbf{P}([X = Y])$.

On rappelle que l'instruction `grand(1,1,'poi',lambda)` simule la loi de Poisson de paramètre `lambda`.

b. Grâce à la fonction précédente, on trace, en fonction de λ, une estimation de $\sqrt{\pi\lambda}\,\mathbf{P}([X = Y])$ pour $\lambda \in]0\,;20]$ et on obtient le graphe suivant :



À la vue de ce graphe, proposer un équivalent de $\mathbf{P}([X = Y])$ lorsque λ tend vers $+\infty$.

11. Montrer : $\mathbf{P}([X = Y]) = \mathrm{e}^{-2\lambda}\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(k\,!)^2}$.

12. a. Exprimer $\mathbf{P}([X = Y])$ en fonction de λ et de la fonction I.

b. En déduire un équivalent de $\mathbf{P}([X = Y])$ lorsque λ tend vers $+\infty$.

PROBLÈME 2

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On note $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n, et $\mathscr{B} = (1, X, \ldots, X^n)$ la base canonique de E.

On note, pour tout polynôme P de E :

$$\varphi(P) = \frac{1}{n}X(1-X)P' + XP.$$

PARTIE I : Étude d'un endomorphisme de polynômes

1. **a.** Montrer que φ est une application linéaire.

b. Calculer $\varphi(X^n)$.

c. Montrer que φ est un endomorphisme de E.

2. Déterminer la matrice A de φ dans la base $\mathscr{B}$. Préciser le rang de cette matrice.

3. **a.** L'endomorphisme φ est-il injectif ? Justifier votre réponse.

b. Soit P un polynôme non nul de $\mathrm{Ker}(\varphi)$.
Montrer que P admet 1 comme unique racine (dans $\mathbb{C}$), et que P est de degré n.

c. En déduire une base de $\mathrm{Ker}(\varphi)$.

4. Montrer que φ est diagonalisable.

5. On pose, pour tout k de $[\![0\,;n]\!]$: $P_k = X^k(1-X)^{n-k}$.

a. Pour tout k de $[\![0\,;n]\!]$, calculer $\varphi(P_k)$.

b. Montrer que la famille $(P_0, P_1, \ldots, P_n)$ est une base de E et expliciter la matrice de φ dans cette base.

c. Déterminer les sous-espaces propres de φ.

PARTIE II : Étude d'une suite de variables aléatoires

On considère une urne contenant n boules numérotées de 1 à n, indiscernables au toucher. On effectue dans cette urne une suite de tirages avec remise, et on suppose que l'expérience est modélisée par un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$.

On note alors, pour tout k de $\mathbb{N}^*$, Y_k la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de numéros distincts qui ont été tirés lors des k premiers tirages.

Par convention, on pose : $Y_0 = 0$.

6. On note, pour tout k de $\mathbb{N}^*$, Z_k la variable aléatoire prenant la valeur 1 si le k-ième tirage amène un numéro qui n'a pas été tiré lors des tirages précédents, et prenant la valeur 0 sinon.

On pourra remarquer que, en particulier, $Z_1 = 1$.

a. Déterminer la loi de Z_2.

b. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Calculer, pour tout j de $[\![1\,;k]\!]$, la valeur de $\mathbf{P}_{[Y_k=j]}([Z_{k+1}=1])$.

En déduire : $\mathbf{P}([Z_{k+1}=1]) = 1 - \frac{1}{n}\mathbf{E}(Y_k)$.

Tournez la page S.V.P.

c. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. En remarquant que $Y_k = \sum_{j=1}^{k} Z_j$, montrer :

$$\mathbf{P}([Z_{k+1} = 1]) = 1 - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{k} \mathbf{P}([Z_j = 1]).$$

d. En déduire, pour tout k de $\mathbb{N}^*$: $\mathbf{P}([Z_k = 1]) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1}$.

e. Déterminer alors, pour tout k de $\mathbb{N}$, l'espérance de Y_k.

7. On note, pour tout k de $\mathbb{N}$, G_k le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$G_k = \sum_{i=0}^{n} \mathbf{P}([Y_k = i])\, X^i.$$

a. Déterminer les polynômes G_0, G_1 et G_2.

b. Montrer, pour tout k de $\mathbb{N}$ et tout i de $[\![0\,;n]\!]$:

$$\mathbf{P}([Y_{k+1} = i]) = \frac{i}{n} \mathbf{P}([Y_k = i]) + \left(1 - \frac{i-1}{n}\right) \mathbf{P}([Y_k = i-1]).$$

c. Montrer, pour tout k de $\mathbb{N}$:

$$G_{k+1} = \frac{1}{n} X(1-X)\, G_k' + X\, G_k.$$

d. En déduire, pour tout k de $\mathbb{N}$:

$$G_k = \varphi^k(G_0).$$

8. **a.** Pour tout k de $\mathbb{N}$, calculer $G_k(1)$ et $G_k'(1)$.

b. En déduire, pour tout k de $\mathbb{N}$:

$$\mathbf{E}(Y_{k+1}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \mathbf{E}(Y_k) + 1.$$

c. Retrouver alors, pour tout k de $\mathbb{N}$, l'expression de $\mathbf{E}(Y_k)$ obtenue en question **6.e**.

9. On rappelle que les polynômes $P_0, \ldots, P_n$ sont définis à la question **5.** par :

pour tout j de $[\![0\,;n]\!]$, $P_j = X^j (1-X)^{n-j}$.

a. Calculer $\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} P_j$.

b. Montrer, pour tout j de $[\![0\,;n]\!]$:

$$P_j = \sum_{i=j}^{n} \binom{n-j}{i-j} (-1)^{i-j} X^i.$$

c. En déduire, pour tout k de $\mathbb{N}$:

$$\varphi^k(G_0) = \sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{i} \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j} \left(\frac{j}{n}\right)^k (-1)^{i-j} \right) X^i.$$

d. Montrer finalement, pour tout k de $\mathbb{N}$ et pour tout i de $[\![0\,;n]\!]$:

$$\mathbf{P}([Y_k = i]) = \binom{n}{i} \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} (-1)^{i-j} \left(\frac{j}{n}\right)^k.$$

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Suites réelles
- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Variables aléatoires à densité
- Compléments sur les variables aléatoires réelles
- Éléments propres et réduction
- Polynômes
- Compléments d'algèbre linéaire
- Variables aléatoires finies et lois usuelles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg