Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2026, filière ECG

Mathématiques appliquées ESSEC-HEC

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Préliminaire informatique
- Le lemme de Johnson-Lindenstrauss
- ε-isométries pour les ensembles sporadiques de Mn,1(R)
- L'acquisition comprimée

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2026/maths-appli-essec-hec

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Code sujet : 288

BANQUE COMMUNE D'ÉPREUVES

Conception : ESSEC BS – HEC Paris

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

FILIÈRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

VOIE GÉNÉRALE

Jeudi 23 avril 2026 de 14h à 18h

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
Les candidats sont invités à ***encadrer*** *dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.*
Aucun document n'est autorisé. ***L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.*** *Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.*
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.

Le sujet se situe dans le cadre de la théorie de l'acquisition comprimée (compressed sensing) qui s'est développée depuis 2005.

Soit n, m des entiers tels que $n > m \geqslant 1$, m bien plus petit que n.

Dans le sujet on s'intéresse au problème qui consiste à, étant donnés AY et $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ étant inconnu mais ayant peu de composantes non nulles, être en mesure de déterminer Y lorsque A vérifie une hypothèse que l'on précisera.

Pour tout d entier naturel non nul et $X \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, de coefficients $x_1, ..., x_d$ on pose

$$\|X\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{d} x_k^2}.$$

On admet que l'on a défini une norme sur $\mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, ce qui sous-entend en particulier que :

- Pour tout $X \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, si $\|X\| = 0$ alors $X = 0$.
- Pour tous $X \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, $Y \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, $\|X\| - \|Y\| \leqslant \|X + Y\| \leqslant \|X\| + \|Y\|$.
- Pour tous $X \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda X\| = |\lambda| \|X\|$.

Si $\mathcal{X}$ est un ensemble d'éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\varepsilon \in]0, 1[$ et $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, on dit que A est une $(\varepsilon, \mathcal{X})$-isométrie si pour tout $X \in \mathcal{X}$:

$$(1 - \varepsilon) \|X\|^2 \leqslant \|AX\|^2 \leqslant (1 + \varepsilon) \|X\|^2$$

Pour les scripts et fonctions Python, on supposera que les instructions suivantes ont été exécutées :

```
import numpy as np,numpy.random as rd
```

Un aide-mémoire Python se trouve à la fin de l'énoncé.

Le mot "Fin" marque la fin de l'énoncé.

Préliminaire informatique

1. a) Ecrire une fonction `Norme(X)` qui renvoie $\|X\|$ si le vecteur numpy `X` représente le vecteur colonne X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

   b) On exécute les instructions suivantes :

   ```
   X=np.array([1,0,1,1,1])
   print(Norme(X));print(Norme((1/Norme(X))*X))
   ```

   Quel affichage obtient-on dans la console ?

2. On exécute le script suivant :

   ```
   A = np.array([[2,1],[0,1],[1,0]]); X = np.array([1,-1])
   eps = 0.6
   print(Norme(np.dot(A,X))**2)
   print(1-eps <= Norme(np.dot(A,X))**2/Norme(X)**2 <= 1+eps)
   ```

   et on obtient l'affichage :

```
3.0
True
```

Expliquer ces résultats.

3. On suppose que $\mathcal{X}$, un ensemble d'éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, est représenté par la liste finie `LX` de vecteurs numpy, la matrice A par le tableau numpy `A` et ε par `eps`. Ecrire une fonction `EstIsom(A,LX,eps)` qui renvoie `True` si A est une $(\varepsilon, \mathcal{X})$-isométrie et `False` sinon.
En exécutant le script,

```
LX=[np.array([-1,3]),np.array([1,-2])];
print(EstIsom(np.array([[2,1],[0,1],[1,0]]),LX,0.2))
```

quel affichage obtient-on dans la console ? On justifiera sa réponse.

Le lemme de Johnson-Lindenstrauss

On considère $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé sur lequel sont définies les variables aléatoires $G_{i,j}$ pour $(i,j) \in [\![1,m]\!] \times [\![1,n]\!]$.

Ces variables sont indépendantes et toutes de loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. On définit les matrices aléatoires $M(\omega)$, pour tout $\omega \in \Omega$ par :

$$M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{pmatrix} G_{1,1}(\omega) & ... & G_{1,n}(\omega) \\ G_{2,1}(\omega) & ... & G_{2,n}(\omega) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ G_{m,1}(\omega) & ... & G_{m,n}(\omega) \end{pmatrix}$$

4. Ecrire une expression Python qui réalise une simulation d'une telle matrice M si m et n sont donnés et représentés par les variables `m` et `n`.

▶ Soit X un élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de composantes $x_1, ..., x_n$ tel que $\|X\| = 1$.

Pour tout $i \in [\![1,m]\!]$, on définit les variables aléatoires $Y_i = \sum_{j=1}^{n} x_j G_{i,j}$ et Z la variable aléatoire $\|MX\|^2$.

5. Soit $i \in [\![1,m]\!]$.
   a) Soit $j \in [\![1,n]\!]$ tel que $x_j \neq 0$. Quelle est la loi de $x_j G_{i,j}$?
   b) En déduire la loi de Y_i et que $\mathbb{E}(Y_i^2) = \|X\|^2 = 1$.
   c) Montrer que $Z = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} Y_i^2$.

▶ Soit $\varepsilon \in]0,1[$ et $t \in]0, \frac{1}{4}]$.

6. a) Montrer que pour tout $i \in [\![1,m]\!]$, $\mathbb{E}(\mathrm{e}^{tY_i^2})$ existe et vaut $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-(1-2t)\frac{x^2}{2}}\, dx$.
   b) En conclure que pour tout $i \in [\![1,m]\!]$, $\mathbb{E}(\mathrm{e}^{tY_i^2}) = \frac{1}{\sqrt{1-2t}}$.

7. On rappelle l'inégalité de Markov :
si U est une variable aléatoire à valeurs positives admettant une espérance et $a > 0$ un réel alors

$$\mathbb{P}(U \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}(U)}{a}$$

a) Montrer que $\mathbb{E}(\mathrm{e}^{tmZ})$ existe et que $\mathbb{P}(Z > (1+\varepsilon)) \leqslant \mathbb{P}(Z \geqslant (1+\varepsilon)) \leqslant \mathbb{E}(\mathrm{e}^{tmZ})\,\mathrm{e}^{-tm(1+\varepsilon)}$.

b) En déduire que $\mathbb{P}(Z > (1+\varepsilon)) \leqslant \left(\dfrac{\mathrm{e}^{-t}}{\sqrt{1-2t}}\right)^m \mathrm{e}^{-tm\varepsilon}$.

c) Établir que $-t - \dfrac{1}{2}\ln(1-2t) \leqslant 2t^2$ et en déduire que $\mathbb{P}(Z > (1+\varepsilon)) \leqslant \mathrm{e}^{m(2t^2-t\varepsilon)}$.

d) En conclure que $\mathbb{P}(Z > (1+\varepsilon)) \leqslant \mathrm{e}^{-m\frac{\varepsilon^2}{8}}$.

8. On montrerait de même que $\mathbb{P}(Z < (1-\varepsilon)) \leqslant \mathrm{e}^{-m\frac{\varepsilon^2}{8}}$.
En déduire que $\mathbb{P}([Z < (1-\varepsilon)] \cup [Z > (1+\varepsilon)]) \leqslant 2\,\mathrm{e}^{-m\frac{\varepsilon^2}{8}}$.

▶ Soit $\mathcal{X} = \{X_1, ..., X_r\}$, un ensemble d'éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on note pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, B_i l'événement

$$\left[(1-\varepsilon)\,\|X_i\|^2 \leqslant \|MX_i\|^2 \leqslant (1+\varepsilon)\,\|X_i\|^2\right]$$

9. a) Pour tout $i \in [\![1, r]\!]$ tel que $X_i \neq 0$, on pose $U_i = \dfrac{1}{\|X_i\|}X_i$.
Montrer que $\|U_i\| = 1$ et que $B_i = \left[(1-\varepsilon) \leqslant \|MU_i\|^2 \leqslant (1+\varepsilon)\right]$.

b) On admet que la probabilité d'une réunion finie d'événements est inférieure à la somme des probabilités de ces événements.
En déduire que la probabilité de l'événement, M n'est pas une $(\varepsilon, \mathcal{X})$-isométrie, est inférieure à $2r\,\mathrm{e}^{-m\frac{\varepsilon^2}{8}}$.

c) On suppose que $m > \dfrac{8\ln(2r)}{\varepsilon^2}$. En conclure qu'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ qui est une $(\varepsilon, \mathcal{X})$-isométrie.

10. On suppose que $\mathcal{X}$, un ensemble d'éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, est représenté par la liste finie `LX` de vecteurs colonnes numpy. Écrire une fonction `Isom(LX,m,eps)` qui renvoie une matrice à m lignes et n colonnes qui est une $(\varepsilon, \mathcal{X})$-isométrie.

ε-isométries pour les ensembles sporadiques de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$

On conserve les notations de la partie précédente.

On rappelle que si E est un ensemble comportant un nombre fini d'éléments, son nombre d'éléments s'appelle son cardinal et se note $\#E$.

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, de composantes $x_1, ..., x_n$, on note :

- $S(X)$ l'ensemble des indices i tels que $x_i \neq 0$, appelé support de X.
- $\langle X \rangle$ le nombre de composantes non nulles de X donc le cardinal de $S(X)$.
- Pour $k \in [\![0, n]\!]$, $\mathcal{C}_k$ l'ensemble des $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tels que $\langle X \rangle \leqslant k$.
- Pour $k \in [\![0, n]\!]$, $\mathcal{T}_k$ l'ensemble des parties de $[\![1, n]\!]$ de cardinal k et pour tout T élément de $\mathcal{T}_k$, $\mathcal{Q}(T)$ l'ensemble des éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dont le support est inclus dans T.

11. Donner le cardinal de $\mathcal{T}_k$ pour tout entier $k \in [\![0, n]\!]$.

12. a) Déterminer $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}_n$.

▶ Soit $k \in [\![1, n-1]\!]$.

b) Soit $T \in \mathcal{T}_k$, on pose $T = \{i_1, \cdots, i_k\}$.
Montrer que $\mathcal{Q}(T)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de dimension k.

c) Montrer que $\mathcal{C}_k = \bigcup_{T \in \mathcal{T}_k} \mathcal{Q}(T)$.
$\mathcal{C}_k$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$? Justifier la réponse.

13. **Inégalité de Cauchy-Schwarz** - Soit X et Y deux éléments non nuls de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de coefficients $x_1, ..., x_n$ et $y_1, ..., y_n$.

a) Montrer que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $2|x_i||y_i| \leqslant x_i^2 + y_i^2$.

b) En supposant que $\|X\| = \|Y\| = 1$, en déduire que $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right| \leqslant 1$.

c) En conclure dans le cas général que $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right| \leqslant \|X\|\|Y\|$ puis que

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right)$$

L'inégalité reste-t-elle vraie si l'un des deux vecteurs X ou Y est nul ?

► Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

14. a) Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de composantes $x_1, .., x_n$. Montrer que $\|AX\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} x_j\right)^2$.

b) En déduire que, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\|AX\|^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2\right)\|X\|^2$.

► On pose $\alpha = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2}$.

15. Montrer que pour tout $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2$:

$$\|AY\| - \|A(X-Y)\| \leqslant \|AX\| \leqslant \|AY\| + \|A(X-Y)\|$$

► On admet que pour tous $k \in [\![0, n]\!]$, $T \in \mathcal{T}_k$ et $\delta \in]0, 1[$, il existe un sous-ensemble fini $\mathcal{X}_{T,\delta}$ de $\mathcal{Q}(T)$ tel que $\#\mathcal{X}_{T,\delta} \leqslant \left(\frac{12}{\delta}\right)^k$ et pour tout $X \in \mathcal{Q}(T)$ de norme 1, il existe $Y \in \mathcal{X}_{T,\delta}$ de norme 1 tel que $\|X - Y\| \leqslant \frac{\delta}{4}$.

16. Soit $\delta \in]0, 1[$. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par, $u_0 = \alpha - 1$ et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{\delta}{4}(3 + u_n)$.
Montrer que $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{3\delta}{4-\delta}$ et que $\frac{3\delta}{4-\delta} \leqslant \delta$.

► Soit $k \in [\![0, n]\!]$, $T \in \mathcal{T}_k$, $\varepsilon \in]0, 1[$ et $\delta \in]0, 1[$ tel que $\varepsilon = 2\delta + \delta^2$.

17. On suppose que A est une $\left(\frac{\delta}{2}, \mathcal{X}_{T,\delta}\right)$-isométrie .

a) Montrer que pour tout $Y \in \mathcal{X}_{T,\delta}$ de norme 1,

$$1 - \frac{\delta}{2} \leqslant \sqrt{1 - \frac{\delta}{2}} \leqslant \|AY\| \leqslant \sqrt{1 + \frac{\delta}{2}} \leqslant 1 + \frac{\delta}{2}$$

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $X \in \mathcal{Q}(T)$ de norme 1, en considérant $Y \in \mathcal{X}_{T,\delta}$ de norme 1 tel que $\|X - Y\| \leqslant \dfrac{\delta}{4}$ et en utilisant la question 13, que :

$$1 - u_n \leqslant \|AX\| \leqslant 1 + u_n$$

c) En conclure que pour tout $X \in \mathcal{Q}(T)$ de norme 1 :

$$1 - \delta \leqslant \|AX\| \leqslant 1 + \delta$$

puis que $\sqrt{1-\varepsilon} \leqslant \|AX\| \leqslant \sqrt{1+\varepsilon}$.

d) En déduire que A est une $(\varepsilon, \mathcal{Q}(T))$-isométrie.

► On suppose que $k \in [\![1, n]\!]$.

18. En déduire que,

la probabilité que M ne soit pas une $(\varepsilon, \mathcal{Q}(T))$-isométrie est inférieure à $2\left(\dfrac{12}{\delta}\right)^k \mathrm{e}^{-m\frac{\delta^2}{32}}$,

puis que la probabilité que M ne soit pas une $(\varepsilon, \mathcal{C}_k)$-isométrie est inférieure à $2\binom{n}{k}\left(\dfrac{12}{\delta}\right)^k \mathrm{e}^{-m\frac{\delta^2}{32}}$.

19. a) Montrer que $\binom{n}{k} \leqslant \dfrac{n^k}{k!}$.

b) En utilisant la somme d'une série, établir que $e^k \geqslant 2\dfrac{k^k}{k!}$.

En déduire que $2\binom{n}{k} \leqslant \left(\dfrac{\mathrm{e}\, n}{k}\right)^k$.

c) On pose $a = \dfrac{m}{k}$ et $b = \dfrac{n}{k}$ et on suppose que $a > 32\dfrac{\ln\left(\frac{12b\,\mathrm{e}}{\delta}\right)}{\delta^2}$. Montrer qu'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ qui est une $(\varepsilon, \mathcal{C}_k)$-isométrie.

L'acquisition comprimée

On conserve les notations de la partie précédente.

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, de composantes $x_1, ..., x_n$, on note $|X|$ la somme $\sum_{i=1}^{n} |x_i| = \sum_{i \in S(X)} |x_i|$.

Soit $k \in [\![1, n]\!]$. Dans cette partie on montre qu'étant donné AY où $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est donnée et $Y \in \mathcal{C}_k$ inconnu, on peut caractériser Y par une propriété vérifiée par $\langle Y \rangle$ ou $|Y|$ dans la mesure où A est une $(\varepsilon, \mathcal{C}_{2k})$-isométrie ou une $(\varepsilon, \mathcal{C}_{3k})$-isométrie.

20. *Quelques propriétés utiles pour la suite* - Soit $r \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que pour tout $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^2$, $|X + Y| \leqslant |X| + |Y|$. En déduire que si X_1,...,X_r sont des éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\left|\sum_{i=1}^{r} X_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^{r} |X_i|$.

b) Montrer que si X_1,...,X_r, éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, sont à supports deux à deux disjoints alors $\left|\sum_{i=1}^{r} X_i\right| = \sum_{i=1}^{r} |X_i|$.

c) En utilisant l'inégalité de la question 13, montrer que si $X \in \mathcal{C}_k$,

$$\|X\| \leqslant |X| \leqslant \sqrt{k}\|X\|$$

21. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ une $(\varepsilon, \mathcal{C}_k)$-isométrie avec $\varepsilon \in]0,1[$.
    a) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{C}_k$, si $AX = 0$ alors $X = 0$.
    b) En déduire que $\mathrm{rg}(A) \geqslant k$.

▶ **Première caractérisation**

22. On suppose dans cette question que $k \leqslant \frac{n}{2}$ et que $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est une $(\varepsilon, \mathcal{C}_{2k})$-isométrie.
    a) Soit $(X, Y) \in \mathcal{C}_k^2$ tels que $AX = AY$.
    Justifier que $X - Y \in \mathcal{C}_{2k}$ et en déduire que $X = Y$.
    b) Soit $Y \in \mathcal{C}_k$, on pose $B = AY$. Montrer que Y est l'unique solution de l'équation $AX = B$ qui minimise $\langle X \rangle$.

▶ **Deuxième caractérisation**

On suppose désormais que $k \leqslant \frac{n}{3}$ et que $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est une $(\varepsilon, \mathcal{C}_{3k})$-isométrie avec $\varepsilon < \dfrac{1}{3}$.

On considère $Y \in \mathcal{C}_k$, on pose $AY = B$. Soit X appartenant à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $AX = B$ et $|X| \leqslant |Y|$. On pose $Z = Y - X$.

On note S le support de Y et $\overline{S}$ l'ensemble des indices des composantes de Y qui sont nulles.

Si I est un sous-ensemble non vide de $[\![1, n]\!]$, on note Z_I l'élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ obtenu à partir de Z en donnant la valeur 0 aux composantes dont l'indice n'appartient pas à I.

Par exemple si $n = 5$, $I = \{1, 3, 4\}$ et $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ alors $Z_I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

23. On suppose dans cette question que $\langle Z \rangle \leqslant 3k$. Montrer que $Z = 0$.

▶ **On suppose dans la suite de cette partie que** $3k + 1 \leqslant \langle Z \rangle$.

24. a) Montrer que $Y - Z_{\overline{S}} = X + Z_S$ et que $|Y - Z_{\overline{S}}| = |Y| + |Z_{\overline{S}}|$.
    b) En déduire que $|Z_S| \geqslant |Z_{\overline{S}}|$.
    c) Montrer que $\|Z_S\| \geqslant \dfrac{1}{\sqrt{k}} |Z_S| \geqslant \dfrac{1}{\sqrt{k}} |Z_{\overline{S}}|$.

▶ On pose $r = \left\lfloor \dfrac{\langle Z_{\overline{S}} \rangle}{2k} \right\rfloor$.

On écrit $\overline{S}$ sous la forme de la réunion disjointe $T_1 \cup \ldots \cup T_{r+1}$, avec pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, les valeurs absolues des composantes non nulles de Z_{T_i} qui sont supérieures à toutes celles de $Z_{T_{i+1}}$ et $\langle Z_{T_i} \rangle = 2k$.

On a donc en particulier $Z_{\overline{S}} = \sum_{i=1}^{r+1} Z_{T_i}$ et $\langle Z_{T_{r+1}} \rangle < 2k$.

Pour $i \in [\![1, r]\!]$, on note α_i la plus petite valeur absolue obtenue à partir des composantes non nulle de Z_{T_i}.

25. a) Soit $i \in [\![1, r]\!]$. Montrer que $|Z_{T_i}| \geqslant \sqrt{2k}\sqrt{2k\alpha_i^2} \geqslant \sqrt{2k}\|Z_{T_{i+1}}\|$.
    b) En déduire que $\|Z_S\| \geqslant \sqrt{2} \sum_{i=2}^{r+1} \|Z_{T_i}\|$.

26. a) Montrer que :

$$\|AZ\| \geqslant \|AZ_{S \cup T_1}\| - \left\| \sum_{i=2}^{r+1} AZ_{T_i} \right\| \geqslant \sqrt{1-\varepsilon}\|Z_{S \cup T_1}\| - \sqrt{1+\varepsilon} \sum_{i=2}^{r+1} \|Z_{T_i}\|$$

b) En déduire que $\|AZ\| \geqslant \left(\sqrt{1-\varepsilon} - \dfrac{\sqrt{1+\varepsilon}}{\sqrt{2}}\right) \|Z_S\|$.

c) En conclure que $Z_S = 0$ puis que $X = Y$.

27. En déduire que Y est l'unique solution de l'équation $AX = B$ qui minimise $|X|$.

Aide-mémoire

Toutes les fonctions et instructions présentées ne sont pas utiles et il est possible d'utiliser d'autres fonctions ou instructions absentes de cet aide-mémoire.

Listes

`[]`	Créer une liste vide
`L.append(a)`	Ajoute l'élément `a` à la fin de la liste `L`
`len(L)`	Renvoie le nombre d'éléments de la liste `L`

Module mathématique `numpy` de Python

```
import numpy as np
```

`np.array(L)`	Transforme la liste `L` en vecteur ou matrice `numpy`
`np.zeros([n,m])`	Crée la matrice nulle de taille $n \times m$
`np.zeros(n)`	Crée le vecteur nul de taille n
`np.ones([n,m])`	Crée la matrice de taille $n \times m$ dont tous les coefficients valent 1
`np.ones(n)`	Crée le vecteur de taille n dont tous les coefficients valent 1
`np.sum(M)`	Renvoie la somme de tous les éléments de M, matrice ou vecteur
`np.dot(M,X)`	Renvoie le produit matriciel de la matrice M par le vecteur X
`np.shape(M)`	Renvoie dans un couple le format de la matrice M
`np.sqrt(x)`	Renvoie $\sqrt{x}$ si $x \geq 0$
`np.log(x)`	Renvoie $\ln(x)$ si $x > 0$

Sous module `random` de `numpy` pour la simulation probabiliste

```
import numpy.random as rd
```

`rd.normal(m,d,[r,s])`	Simule une réalisation d'une matrice (r, s) dont les coefficients sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi normale $\mathcal{N}(m, d^2)$

Si le paramètre `[r,s]` est remplacé par `r`, cette fonction renvoie une réalisation d'un vecteur de longueur `r` correspondant à la loi en question, et si ce paramètre est omis, elles renvoient un seul coefficient suivant les mêmes contraintes.

Fin

IMPRIMERIE NATIONALE – 26 1220 – D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Variables aléatoires à densité
- Compléments sur les variables aléatoires réelles
- Compléments d'algèbre linéaire
- Algèbre bilinéaire
- Suites réelles
- Réels, sommes et produits

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg