Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2001, filière MP

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : projection sur un convexe fermé de R^n
- Partie II.A : théorème de Brouwer pour une application de classe C^2
- Partie II.B : forme générale du théorème de Brouwer
- Partie III : conséquences du théorème de Brouwer

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mp/2001/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MP

MATHÉMATIQUES 1

DURÉE : 4 heures

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Après une première partie consacrée à l'étude de la projection sur les convexes fermés de $\mathbb{R}^n$ on établira (dans $\mathbb{R}^2$) le théorème du point fixe de Brouwer et quelques unes de ses conséquences.

On suppose que $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme associée, notés $(\,|\,)$ et $\|\ \|$, donc si $x=(x_1,\ldots,x_n)$ et $y=(y_1,\ldots,y_n)$ sont des éléments de $\mathbb{R}^n$ on a : $(x|y)=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ et $\|x\|=(x|x)^{1/2}$. Si X est une partie de $\mathbb{R}^n$ on notera $\overset{\circ}{X}$ son intérieur, soit $f:X\to\mathbb{R}^n$ on dira que $u\in X$ est un point fixe de f si $f(u)=u$; si $i\in\{1,\ldots,n\}$, f_i désigne la composante de rang i de f, donc : $f(x)=(f_1(x),\ldots,f_i(x),\ldots,f_n(x))$.

I. Projection sur un convexe fermé de $\mathbb{R}^n$

1. Démontrer que si $(x,y)\in(\mathbb{R}^n)^2$, on a : $|(x|y)|\le\|x\|\,\|y\|$ (inégalité de Schwarz). Montrer que $|(x|y)|=\|x\|\,\|y\|$ si et seulement si x et y sont colinéaires. Montrer que si $\{a,b,c\}\subset\mathbb{R}^n$ vérifie : $b\neq c$ et $\|a-b\|=\|a-c\|$, on a alors : $\left\|a-\frac{b+c}{2}\right\|<\|a-b\|$.

2. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$, soit $x\in\mathbb{R}^n$, montrer qu'il existe $u\in F$ tel que : $\|x-u\|\le\|x-y\|$ pour tout $y\in F$ (on supposera d'abord que F est borné avant d'étudier le cas général).

3. Soit A un convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^n$, montrer, en utilisant les questions précédentes, que pour tout $x\in\mathbb{R}^n$, il existe un unique $u\in A$ tel que $\|x-u\|\le\|x-y\|$ pour tout $y\in A$.

Ceci établit le théorème de la projection sur les convexes de $\mathbb{R}^n$: soit A un convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^n$, il existe une unique application, notée P, de $\mathbb{R}^n$ dans A qui vérifie : $\|x - P(x)\| = \min\{\|x - y\| : y \in A\}$, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. $P(x)$ s'appelle la projection de x sur A.

4. Montrer que s'il existe $\alpha \in A$ tel que : $(x - \alpha | y - \alpha) \leq 0$ pour tout $y \in A$, on a : $\alpha = P(x)$.

5. Supposons qu'il existe $y \in A$ tel que : $(x - P(x) | y - P(x)) > 0$. Soit alors $\mathcal{S} : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par : $\mathcal{S}(t) = \|(x - P(x)) - t(y - P(x))\|^2$. Montrer qu'il existe $t \in]0,1[$ tel que : $\mathcal{S}(t) < \|x - P(x)\|^2$.

6. Déduire de **4.** et **5.** que $u = P(x)$ si et seulement si : $u \in A$ et $(x - u | y - u) \leq 0$ pour tout $y \in A$.

7. Soit $\{x, y\} \subset \mathbb{R}^n$ montrer que : $(x - y | P(x) - P(y)) \geq \|P(x) - P(y)\|^2$. En déduire que P vérifie les propriétés suivantes : P est continue, $P(\mathbb{R}^n) = A$, $P(x) = x$ si $x \in A$.

8. Montrer que si $x \notin A$, alors $P(x) \notin \overset{\circ}{A}$ (raisonner par l'absurde en supposant qu'il existe une boule de centre $P(x)$, de rayon strictement positif, incluse dans A).

II. Théorème de Brouwer dans $\mathbb{R}^2$

Pour toute la suite du problème, on se place dans $\mathbb{R}^2$; si $r > 0$, $\overline{B}(O,r)$ désigne le disque fermé de centre O et de rayon r et $S(O,r)$ le cercle correspondant, on note $B = \overline{B}(O,1)$ et $S = S(O,1)$. On entend par application dérivable (ou C^1 ou C^2) de B (ou de $B \times \mathbb{R}$) dans $\mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}$), la restriction à B (ou à $B \times \mathbb{R}$) d'une application dérivable (ou C^1 ou C^2) définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$), contenant B (ou $B \times \mathbb{R}$), à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}$).

A. Cas particulier d'une application de classe C^2

Soit $f : B \to \mathbb{R}^2$, on suppose que f est de classe C^2 et que $f(B) \subset B$ et on se propose de montrer que f possède au moins un point fixe. On va raisonner par l'absurde et supposer que : $f(x) \neq x$ pour tout $x \in B$.

9. Montrer qu'il existe $\rho : B \to \mathbb{R}_+$, unique, telle que : $x + \rho(x)\big(x - f(x)\big) \in S$ pour tout $x \in B$. Expliciter ρ, montrer qu'elle est de classe C^2 et que $\rho(x) = 0$ si et seulement si $x \in S$. On pose : $\alpha(x) = \rho(x)\big(x - f(x)\big)$ et $\alpha_{ij}(x) = \dfrac{\partial \alpha_j}{\partial x_i}(x)$ pour tout $(i,j) \in \{1,2\}^2$ et $\varphi(x) = x + \alpha(x)$.

10. Montrer que, pour tout $x \in B$, la matrice $\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(x) & \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}(x) \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x_1}(x) & \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial x_2}(x) \end{pmatrix}$ est singulière (on pourra, à cet effet, caractériser géométriquement l'image de l'application linéaire correspondante).

11. Soit $\psi : B \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $\psi(x,t) = \begin{vmatrix} 1 + t\,\alpha_{11}(x) & t\,\alpha_{21}(x) \\ t\,\alpha_{12}(x) & 1 + t\,\alpha_{22}(x) \end{vmatrix}$.

a) Montrer que : $\psi(x,t) = 1 + t\beta(x) + t^2\gamma(x)$ où β et γ sont des applications continues de B dans $\mathbb{R}$ que l'on explicitera à l'aide des applications $(\alpha_{ij})_{(i,j)\in\{1,2\}^2}$. Vérifier que $\psi(x,1) = 0$ pour tout $x \in B$.

b) Soit $J : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par : $J(t) = \iint_B \psi(x,t)\,dx_1 dx_2$. Justifier l'existence de J et calculer $J(0)$ et $J(1)$.

c) Montrer, grâce au théorème de Fubini que $\iint_B \beta(x)\,dx_1 dx_2 = 0$.

d) Soit $g : B \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2,

soient $I_1(g) = \iint_B \dfrac{\partial g_1}{\partial x_1}(x)\dfrac{\partial g_2}{\partial x_2}(x)\,dx_1 dx_2$, $I_2(g) = \iint_B \dfrac{\partial g_1}{\partial x_2}(x)\dfrac{\partial g_2}{\partial x_1}(x)\,dx_1 dx_2$.

Montrer que :

$$I_1(g) = \int_{-1}^{+1}\left[g_1\left(\sqrt{1-s^2}, s\right)\frac{\partial g_2}{\partial x_2}\left(\sqrt{1-s^2}, s\right) - g_1\left(-\sqrt{1-s^2}, s\right)\frac{\partial g_2}{\partial x_2}\left(-\sqrt{1-s^2}, s\right)\right] ds - \iint_B g_1(x)\frac{\partial^2 g_2}{\partial x_1 \partial x_2}(x)\,dx_1 dx_2$$

On obtient alors, de façon analogue :

$$I_2(g) = \int_{-1}^{+1}\left[g_1\left(s, \sqrt{1-s^2}\right)\frac{\partial g_2}{\partial x_1}\left(s, \sqrt{1-s^2}\right) - g_1\left(s, -\sqrt{1-s^2}\right)\frac{\partial g_2}{\partial x_1}\left(s, -\sqrt{1-s^2}\right)\right] ds - \iint_B g_1(x)\frac{\partial^2 g_2}{\partial x_2 \partial x_1}(x)\,dx_1 dx_2$$

Montrer que : $\iint_B \gamma(x)\,dx_1 dx_2 = 0$ et donc, que J est constante ; montrer que ceci est impossible.

On a ainsi démontré le théorème de Brouwer particulier : toute application de classe C^2, de B dans B, a au moins un point fixe.

Tournez la page S.V.P.

B. Forme générale du théorème de Brouwer

On admettra la généralisation suivante du théorème de Weierstrass : soit F un fermé borné non vide de $\mathbb{R}^2$, soit $g:F\to\mathbb{R}$. Si g est continue, il existe, pour tout $\varepsilon>0$, une application $g_{(\varepsilon)}$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^2, telle que : $\sup\left\{\left|g_{(\varepsilon)}(x)-g(x)\right|:x\in F\right\}\le\varepsilon$.

12. Montrer que si F est un fermé borné non vide de $\mathbb{R}^2$, et si $g:F\to\mathbb{R}^2$ est continue, il existe, pour tout $\varepsilon>0$ une application $g_{(\varepsilon)}$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, de classe C^2, telle que : $\sup\left\{\left\|g_{(\varepsilon)}(x)-g(x)\right\|:x\in F\right\}\le\varepsilon$.

13. Soit $f:B\to B$, f continue. Soit $\varepsilon>0$, il existe, d'après 12. une application $f_{(\varepsilon)}$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, de classe C^2, telle que : $\sup\left\{\left\|f_{(\varepsilon)}(x)-f(x)\right\|:x\in B\right\}\le\varepsilon$.

Soit $h_{(\varepsilon)}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $h_{(\varepsilon)}(x)=\dfrac{f_{(\varepsilon)}(x)}{1+\varepsilon}$. Montrer que $h_{(\varepsilon)}(B)\subset B$ et que : $\sup\left\{\left\|h_{(\varepsilon)}(x)-f(x)\right\|:x\in B\right\}\le 2\varepsilon$.

14. Montrer que si $f:B\to B$ est continue, elle possède au moins un point fixe.

15. Soit $r>0$, soit $f:\overline{B}(O,r)\to\overline{B}(O,r)$, montrer que si f est continue elle possède au moins un point fixe (considérer $g:B\to\mathbb{R}^2$, $g(x)=\dfrac{1}{r}f(rx)$).

16. Soit A un convexe fermé borné non vide de $\mathbb{R}^2$, soit $f:A\to\mathbb{R}^2$, f continue telle que : $f\left(A\setminus\overset{\circ}{A}\right)\subset A$.

a) Montrer qu'il existe $r>0$ tel que : $A\cup f(A)\subset\overline{B}(O,r)$.

b) On associe au convexe fermé non vide A la projection P, comme cela a été défini en question 3. Soit alors $h:\overline{B}(O,r)\to\mathbb{R}^2$ définie par $h(x)=f(P(x))$. Déduire de l'étude de h que f possède au moins un point fixe dans A. On a donc le théorème de Brouwer général : si A est un convexe fermé borné non vide de $\mathbb{R}^2$, et si $f:A\to\mathbb{R}^2$ est continue et vérifie : $f\left(A\setminus\overset{\circ}{A}\right)\subset A$, alors f possède au moins un point fixe dans A.

III. Quelques conséquences du théorème de Brouwer

17. Soit $f:B \to S$, telle que : $f(x)=x$ pour tout $x \in S$. Montrer, en étudiant $(-f)$, que f ne peut être continue (ceci constitue le théorème de non rétraction).

18. Soit $f:B \to \mathbb{R}^2$ telle que : f continue et $f(x)=x$ pour tout $x \in S$. Soit alors $y \notin f(B)$, montrer, en étudiant $g:B \to \mathbb{R}^2$ définie par : $g(x)=\dfrac{y-f(x)}{\|y-f(x)\|}$, que $y \notin B$. En déduire que : $B \subset f(B)$.

19. Soit $h:S\times[0,1] \to S$ telle que : h continue et $h(x,0)=x$ pour tout $x \in S$. Supposons qu'il existe $y \in S$ tel que : $h(x,1)=y$ pour tout $x \in S$; soit alors f, de B dans S, définie par :

$$f(x)=\begin{cases} h\left(\dfrac{x}{\|x\|},1-\|x\|\right) & \text{si } x \neq O. \\ y \text{ si } x=O \end{cases}$$

Montrer que f est continue et que cela contredit le théorème de non rétraction ; en déduire que $(x \to h(x,1))$ ne peut être constante (on dit que S n'est pas contractile).

20. Soit $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que : f continue, $(f(x)\,|\,x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, $\|f(x)\| \xrightarrow[\|x\| \to +\infty]{} +\infty$. Soit $y \in \mathbb{R}^2$, soit $r>0$, on définit, si $y \notin f(\overline{B}(O,r))$, l'application $g_{(r)}:\overline{B}(O,r) \to \mathbb{R}^2$ par : $g_{(r)}(x)=r\dfrac{y-f(x)}{\|y-f(x)\|}$.

a) Montrer qu'il existe $u_{(r)} \in S(O,r)$ tel que l'on ait :

$$\left(f\left(u_{(r)}\right)\,\middle|\,u_{(r)}\right)=\left(y\,|\,u_{(r)}\right)-r\left\|y-f\left(u_{(r)}\right)\right\|.$$

b) Montrer que $f(\mathbb{R}^2)=\mathbb{R}^2$.

Fin de l'énoncé.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Topologie des espaces vectoriels normés
- Intégrales dépendant d'un paramètre
- Suites et séries de fonctions
- Limites et continuité

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mp