Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2003, filière MP

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : polynômes de Tchebychev
- Partie II : orthogonalité et approximation quadratique
- Partie III : meilleure approximation au sens de Tchebychev

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mp/2003/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

SESSION 2003

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE – FILIERE MP

MATHEMATIQUES 1

Durée : 4 heures

---

*Les calculatrices **sont interdites**.*

* * *

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

UTILISATION DES POLYNOMES DE TCHEBYCHEV EN ANALYSE

Notations :

On note E l'espace vectoriel des applications continues de [-1,1] dans $\mathbb{R}$.
On désigne par E_n l'espace vectoriel des fonctions polynomiales de [-1,1] dans $\mathbb{R}$ de degré inférieur ou égal à n où n est un entier naturel.
On pourra confondre les expressions : polynôme et fonction polynomiale.
Si f est un élément de E, on pose $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |f(x)|$.

Les parties II., III. sont indépendantes et utilisent les résultats de la partie I.

I. Polynômes de Tchebychev

Dans toute cette partie, n désigne un entier naturel.

1. Existence et unicité

a) Déterminer un polynôme T à coefficients réels de degré n vérifiant la propriété (*):

$$(*) : \ \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

(on pourra remarquer que $\cos(n\theta)$ est la partie réelle de $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$).

b) Montrer qu'un polynôme vérifiant (*) est unique.
On l'appelle le polynôme de Tchebychev d'indice n, on le note T_n.

On définit alors une fonction polynomiale sur [-1,1] par :

$\forall x \in [-1,1], \quad T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

Tournez la page S.V.P.

2. **a)** Montrer que $\forall x \in [-1,1],\ T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$
(on pourra calculer $T_{n+2}(x) + T_n(x)$).
b) Calculer T_0, T_1, T_2, T_3.
c) Donner le coefficient du terme de plus haut degré de T_n .

3. Racines et extrema
a) Montrer que $\forall x \in$ [-1,1], $T_n(x) = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}(x - \cos\theta_k)$ où $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$.
b) On pose pour *k* dans {0, 1,…,*n*}, $c_k = \cos(\frac{k\pi}{n})$.
Calculer $\|T_n\|_\infty$ puis montrer que :
$\forall k \in \{0,1,...,n\},\ |T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty$ et que : $\forall k \in \{0,1,...,n-1\},\ T_n(c_{k+1}) = -T_n(c_k)$.
Les $n+1$ réels $c_0, c_1,..., c_n$ sont appelés points de Tchebychev.
c) Dessiner le graphe de T_3, préciser sur le graphe les réels c_0, c_1, c_2, c_3.

II. <u>Polynômes de Tchebychev et orthogonalité</u>

Orthogonalité des T_n

4. Montrer que pour toute fonction *h* de *E*, l'application $t \mapsto \frac{h(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur]-1,1[.

Pour *f* et *g* éléments de *E*, on pose $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{f(t)\ g(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$.

5. **a)** Soit *h* une fonction positive de *E*, montrer que si $\int_{-1}^{1} \frac{h(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = 0$ alors *h* est la fonction nulle.
b) Montrer que $\langle\ ,\ \rangle$ définit un produit scalaire sur *E*.

Ceci nous permet de définir une norme euclidienne sur *E* : pour tout élément *h* de *E*, on pose $\|h\|_2 = \sqrt{\langle h, h\rangle}$.

6. Calculer $\langle T_n, T_m\rangle$ selon les valeurs des entiers naturels *m* et *n*. En déduire pour tout entier naturel *n* que la famille $(T_0, T_1,..., T_n)$ est une base orthogonale (pour $\langle\ ,\ \rangle$) de E_n.

Polynôme de meilleure approximation quadratique

Dans toute la suite de la partie II., *f* désignera un élément de *E* et *n* un entier naturel.
On pose $d_2(f, E_n) = \inf\left\{\|f - Q\|_2, Q \in E_n\right\}$.

Le but de la suite de la partie II. est d'exprimer $\|f\|_2$ en fonction des $\dfrac{\langle f, T_k \rangle}{\|T_k\|_2}$.

7. **a)** Enoncer un théorème justifiant l'existence et l'unicité d'un vecteur $t_n(f)$ dans E_n tel que $\|f - t_n(f)\|_2 = d_2(f, E_n)$.

b) Exprimer $t_n(f)$ à l'aide des polynômes de Tchebychev.

On dit que $t_n(f)$ est le polynôme de meilleure approximation quadratique de *f* sur E_n.

8. Montrer que $d_2(f, E_n) = \sqrt{\|f\|_2^{\,2} - \sum_{k=0}^{n} \dfrac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^{\,2}}}$.

9. **a)** En déduire que la série $\sum_{k\geq 0} \dfrac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^{\,2}}$ est convergente.

b) Que pensez-vous de la limite de $\int_{-1}^{1} \dfrac{f(t)T_n(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$ lorsque *n* tend vers $+\infty$?

Convergence en norme quadratique

10. **a)** Soit *h* un élément de *E*, montrer que $\|h\|_2 \leq \sqrt{\pi}\,\|h\|_\infty$.

b) Montrer en utilisant un théorème de Weierstrass que : $\lim_{n\to+\infty} \|f - t_n(f)\|_2 = 0$.

11. **a)** En déduire que $\|f\|_2 = \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} \dfrac{\langle f, T_k \rangle^2}{\|T_k\|_2^{\,2}}}$.

b) Application : un théorème des moments.

Que peut-on dire d'une fonction *h* de *E* telle que pour tout entier naturel *n*, $\int_{-1}^{1} \dfrac{h(t)T_n(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = 0$?

III. <u>Polynôme de meilleure approximation au sens de Tchebychev</u>

Dans toute cette partie, *n* désigne un entier naturel et *f* un élément de *E*.

On note $d_\infty(f, E_n) = \inf\left\{\|f - Q\|_\infty, Q \in E_n\right\}$.

On dit qu'un élément *P* de E_n, est un polynôme de meilleure approximation (on notera en abrégé PMA) au sens de Tchebychev de *f* d'ordre *n*, s'il vérifie une des deux conditions équivalentes :

(i) $\|f - P\|_\infty = d_\infty(f, E_n)$

(ii) $\forall Q \in E_n, \|f - P\|_\infty \leq \|f - Q\|_\infty$.

Existence d'un PMA d'ordre *n* pour *f*

On pose $K = \left\{ Q \in E_n, \left\| f - Q \right\|_\infty \leq \left\| f \right\|_\infty \right\}$

12. a) Montrer que *K* est une partie non vide fermée et bornée de E_n.

b) En déduire que *K* est une partie compacte non vide de E_n.

13. a) Montrer que $d_\infty(f, E_n) = d_\infty(f, K)$.

b) En déduire qu'il existe un élément *P* de E_n tel que $\left\| f - P \right\|_\infty = d_\infty(f, E_n)$.

P est donc un PMA d'ordre *n* de *f*.

Condition suffisante pour être un PMA

Soit *h* un élément de *E*. On dit que *h* équioscille sur $k+1$ points s'il existe $k+1$ réels $x_0 < x_1 < \ldots < x_k$ de l'intervalle [-1,1] , tels que

$$\forall i \in \{0,1,\ldots,k\},\ |h(x_i)| = \left\| h \right\|_\infty \quad \text{et} \quad \forall i \in \{0,1,\ldots,k-1\},\ h(x_{i+1}) = -h(x_i).$$

(on dit que les extrema sont alternés).

14. Exemples

a) Dessiner le graphe d'une fonction ϕ de *E* telle que $\left\| \phi \right\|_\infty = \frac{1}{2}$ et ϕ équioscille sur 4 points.

(on ne cherchera pas à expliciter une telle fonction).

b) Montrer que le polynôme T_{n+1} de Tchebychev d'indice $n+1$ équioscille sur $n+2$ points.

Le but de la question **15.** est de montrer le résultat suivant :
Si *P* est un élément de E_n tel que $f - P$ équioscille sur $n+2$ points, alors *P* est un PMA d'ordre *n* de *f*.

15. Soit *P* un élément de E_n tel que $f - P$ équioscille sur $n+2$ points que l'on note $x_0 < x_1 < \ldots < x_{n+1}$.

Soit *Q* un élément de E_n tel que $\left\| f - Q \right\|_\infty < \left\| f - P \right\|_\infty$.

a) Soit $i \in \{0,1,\ldots,n+1\}$, montrer que si $f(x_i) - P(x_i) > 0$ alors $Q(x_i) - P(x_i) > 0$.

On a de même, que si $f(x_i) - P(x_i) < 0$ alors $Q(x_i) - P(x_i) < 0$.

b) En déduire que $P = Q$ et conclure.

Détermination de PMA

16. Dans cette question, pour $x \in$ [-1,1], on prend $f(x) = x^{n+1}$ et on pose :

$q_n(x) = x^{n+1} - 2^{-n} T_{n+1}(x)$.

Montrer que q_n est un PMA d'ordre *n* de *f*.

17. En déduire que pour tout polynôme *P* unitaire de degré $n+1$, on a $2^{-n}\left\|T_{n+1}\right\|_\infty \leq \left\|P\right\|_\infty$.

18. **a)** Dans cette question, *f* est un polynôme de degré $n+1$.
Déterminer un PMA d'ordre *n* de *f*.
b) Application : déterminer un PMA d'ordre 2 de $f(x)=5x^3+2x-3$.

Remarque : On peut montrer l'unicité du PMA.
Il n'existe pas de formule générale qui donne l'expression du PMA d'une fonction quelconque. On peut cependant utiliser un algorithme (de Remes) qui fournit une suite de polynômes qui converge vers le PMA.

Fin de l'énoncé

Tournez la page S.V.P.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Nombres complexes et trigonométrie
- Calcul algébrique : sommes, produits, binôme et systèmes linéaires
- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Suites et séries de fonctions
- Topologie des espaces vectoriels normés

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mp