Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2004, filière MP

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : résultats préliminaires
- Partie II : une série de Fourier divergente en un point
- Partie III : fonctions à variation bornée et théorème de Jordan

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mp/2004/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

SESSION 2004

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE – FILIÈRE MP

MATHÉMATIQUES 1

Durée : 4 heures

Les calculatrices ***sont interdites****.*

* * *

NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

À propos de l'hypothèse « de classe C^1 par morceaux » du théorème de convergence normale d'une série de Fourier ...

Pour toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, continue par morceaux et de période 2π, on associe ses coefficients de Fourier exponentiels définis, pour $n \in \mathbb{Z}$, par $c_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)e^{-int}\ \mathrm{d}\,t$ et ses coefficients de Fourier trigonométriques définis par :
$a_n(f) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt)\ \mathrm{d}\,t$ (pour $n \in \mathbb{N}$) et $b_n(f) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)\sin(nt)\ \mathrm{d}\,t$ (pour $n \in \mathbb{N}^*$).
On pose, pour tout entier naturel p et tout réel x :

$$S_p(f)(x) = \sum_{n=-p}^{p} c_n(f)e^{inx} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{p} (a_n(f)\cos(nx) + b_n(f)\sin(nx)).$$

On rappelle le **théorème de convergence normale** :
Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue de période 2π et de classe C^1 par morceaux, la série de Fourier de f converge normalement vers la fonction f sur $\mathbb{R}$.
Ainsi, la fonction f est limite uniforme de la suite de polynômes trigonométriques $(S_p(f))_{p\in\mathbb{N}}$.

Nous allons étudier ce qui peut se produire si on enlève à ce théorème l'hypothèse « de classe C^1 par morceaux ».
Une première partie démontre des résultats préliminaires.
Une deuxième partie traite d'un exemple où, sans l'hypothèse « de classe C^1 par morceaux », la série de Fourier peut diverger.
Une troisième partie recherche une condition plus faible pour que, sans l'hypothèse « de classe C^1 par morceaux », on puisse quand même assurer que la série de Fourier de f converge uniformément vers la fonction f sur $\mathbb{R}$.

I. Résultats préliminaires

1. Si, dans le théorème de convergence normale ci-dessus, on suppose que la fonction f n'est pas continue mais seulement continue par morceaux sur $\mathbb{R}$:

a. Rappeler le théorème de Dirichlet en précisant de quel type de convergence il s'agit.

b. Cette convergence pourrait-elle être uniforme sur $\mathbb{R}$?

2. On considère la fonction continue $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de période 2π , paire et définie pour $x \in [0, \pi]$, par $\varphi(x) = \sqrt{x}$.

Donner l'allure de la courbe de cette fonction et expliquer pourquoi elle n'est pas de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$.

3. Théorème de Cesàro

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de complexes qui converge vers le complexe l.

a. Justifier, simplement, en utilisant un théorème de sommation de relations de comparaison, que : $\sum_{k=0}^{n} (u_k - l) = o(n+1)$ au voisinage de $+\infty$.

b. En déduire que la suite $\left(\dfrac{u_0 + u_1 + \ldots + u_n}{n+1}\right)$ converge vers l.

4. Soit une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et de période 2π dont la somme de Fourier de rang n est notée $S_n(f)$. Pour n entier naturel non nul, on définit la somme de Fejér de f de rang n, notée $\sigma_n(f)$ comme la moyenne de Cesàro des sommes de Fourier :

$$\sigma_n(f) = \frac{1}{n+1}\left(S_0(f) + S_1(f) + \ldots + S_n(f)\right).$$

On démontre, ***et nous l'admettrons***, le **théorème de Fejér** :

« La suite de polynômes trigonométriques $(\sigma_n(f))$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f ».

Une application :

Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue et de période 2π telle que la suite $(S_n(f))$ converge simplement sur $\mathbb{R}$, montrer que la suite $(S_n(f))$ converge vers la fonction f.

5. Si (u_n) est une suite de réels positifs qui converge vers 0, montrer qu'il existe une suite de réels (d_n) décroissante et de limite nulle telle que, pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant d_n$ (on pourra, par exemple, vérifier que la suite $(\sup\{u_k, k \geqslant n\})$ convient).

II. Un exemple de Série de Fourier divergente (en un point)

On considère la suite de fonctions (f_n) définies sur l'intervalle $[0, \pi]$ pour tout entier naturel non nul n par : $f_n(x) = \dfrac{1}{n^2}\sin\left[\left(2^{n^3}+1\right)\dfrac{x}{2}\right]$.

6. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ converge normalement sur $[0, \pi]$.

On définit alors la fonction f paire, continue, de période 2π sur $\mathbb{R}$ et telle que pour tout réel $x \in [0, \pi]$, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.

7. On pose, pour p et k entiers naturels, $I_{p,k} = \displaystyle\int_0^{\pi} \cos(pt)\sin\left(\frac{2k+1}{2}t\right)\,\mathrm{d}\,t$ et, pour q entier naturel, $T_{q,k} = \sum_{p=0}^{q} I_{p,k}$.

a. Calculer, pour p et k entiers naturels, l'intégrale $I_{p,k}$.

b. Pour q et k entiers naturels, déterminer un réel positif c_k tel que $T_{q,k} = c_k + \sum_{j=k-q}^{k+q} \dfrac{1}{2j+1}$, et en déduire que, pour tout couple (q, k) d'entiers naturels, $T_{q,k} \geqslant 0$.

c. Déterminer, pour N au voisinage de $+\infty$, un équivalent simple de $\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{2k+1}$.

d. En déduire que, pour k au voisinage de $+\infty$, $T_{k,k} \sim \frac{1}{2} \ln k$.

8. Montrer que, pour p entier naturel non nul, $a_p(f) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} I_{p,2^{n^3-1}}$.

9. Montrer que, pour p entier naturel non nul, $S_{2^{p^3-1}}(f)(0) \geqslant \frac{-a_0(f)}{2} + \frac{2}{\pi p^2} T_{2^{p^3-1},2^{p^3-1}}$

(on remarquera que : $\frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{N} a_i = -\frac{a_0}{2} + \sum_{i=0}^{N} a_i$).

Conclure que la suite $(S_n(f)(0))$ diverge.

III. Fonctions à variation bornée, Théorème de Jordan

Pour deux réels $a < b$ on note $S_{[a,b]}$ l'ensemble des subdivisions de l'intervalle $[a, b]$.

Si f est une fonction de $[a, b] \to \mathbb{R}$ et $\sigma = (x_0, x_1, \ldots, , x_n) \in S_{[a,b]}$, on note :

$$V(\sigma, f) = \sum_{i=0}^{n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|.$$

On dira que la fonction f est à variation bornée s'il existe un réel positif M tel que pour toute $\sigma \in S_{[a,b]}$, l'on ait : $V(\sigma, f) \leqslant M$.

On appelle alors **variation totale** de f sur $[a, b]$ le réel positif noté :

$$V([a, b], f) = \sup_{\theta \in S_{[a,b]}} V(\sigma, f).$$

10. Montrer que la fonction $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = x \cos\left(\frac{\pi}{2x}\right)$ si $x \neq 0$ est continue et n'est pas à variation bornée sur $[0, 1]$.

(on pourra choisir $\sigma = (x_k)_{0 \leqslant k \leqslant n+1}$ subdivision de $[0, 1]$: $x_0 = 0$, $x_{n+1} = 1$ et $\forall k \in \{1, \ldots, n\}, x_k = \frac{1}{2(n+1-k)}$).

11. Exemples généraux

a. Montrer qu'une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ qui est monotone est à variation bornée sur $[a, b]$, et préciser $V([a, b], f)$.

b. Montrer qu'une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ qui est somme de deux fonctions monotones est à variation bornée sur $[a, b]$.

c. Montrer qu'une fonction $[a, b] \to \mathbb{R}$ qui est continue et de classe C^1 par morceaux est à variation bornée.

12. Soit une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ à variation bornée sur $[a, b]$, et soit $a < c < b$.

Montrer que chacune des restrictions de f aux intervalles $[a, c]$ et $[c, b]$ est à variation bornée et que : $V([a, c], f) + V([c, b], f) \leqslant V([a, b], f)$.

Remarque : on peut même montrer qu'il y a égalité mais ce ne sera pas utile pour ce problème.

13. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue et de période 2π telle que la restriction de f à l'intervalle $[0, 2\pi]$ soit à variation bornée.

Pour n entier relatif et N entier naturel, tous deux non nuls, on utilisera la subdivision $\sigma = (x_k)_{0 \leqslant k \leqslant |n|N}$ de $[0, 2\pi]$ définie, pour k entier compris entre 0 et $|n|N$, par : $x_k = \frac{2\pi k}{|n|N}$.

Pour k entier compris entre 1 et $|n|N$, on notera $V_k(f)$ la variation totale de f sur l'intervalle $[x_{k-1}, x_k]$.

a. Vérifier que : $\left|\sum_{k=1}^{|n|N}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left(f(t)-f(x_k)\right)e^{-int}\ \mathrm{d}\,t\right| \leqslant \sum_{k=1}^{|n|N} V_k(f)\,(x_k-x_{k-1})$.

b. Montrer que : $\left|\sum_{k=1}^{|n|N}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x_k)e^{-int}\ \mathrm{d}\,t\right| \leqslant \frac{1}{|n|}V\left([0,2\pi]\,,f\right)$.

c. En déduire que pour tout entier n non nul, $|c_n(f)| \leqslant \dfrac{V\left([0,2\pi]\,,f\right)}{2\,|n|\,\pi}$.

14. Soit (u_n) une suite de complexes, on pose, pour tout entier naturel n,

$$S_n=\sum_{j=0}^{n} u_j \text{ et } \sigma_n=\frac{S_0+S_1+\ldots+S_n}{n+1}.$$

On suppose que la suite (σ_n) converge vers un complexe L et on suppose qu'il existe une constante réelle A non nulle telle que, pour tout entier naturel k, $|u_k| \leqslant \dfrac{A}{k+1}$.

a. Pour n et k entiers naturels non nuls, exprimer, à l'aide des termes de la suite (u_i), l'expression : $k\,(S_n-L)-(n+k)\,(\sigma_{n+k-1}-L)+n\,(\sigma_{n-1}-L)$.

b. Soit une suite de réels (d_n) décroissante et de limite nulle telle que, pour tout entier naturel n, $|\sigma_n-L| \leqslant d_n$, montrer que, pour n et k entiers naturels non nuls :

$$|S_n-L| \leqslant \left(1+\frac{2n}{k}\right)d_{n-1}+A\frac{k-1}{2(n+2)}.$$

c. L'entier naturel non nul n étant donné, on choisit k tel que $(k-1)^2 \leqslant 4n^2 d_{n-1} < k^2$ ($k-1$ est donc la partie entière de $2n\sqrt{d_{n-1}}$).

Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, on a :

$|S_n-L| \leqslant d_{n-1}+(1+A)\sqrt{d_{n-1}}$.

Que peut-on en déduire ?

15. Montrer que la série de Fourier d'une fonction $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue et de période 2π telle que la restriction de f à l'intervalle $[0,2\pi]$ soit à variation bornée converge uniformément vers la fonction f.

16. Montrer que la série de Fourier de la fonction φ de la question **2.** converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f.

17. *Application*

Montrer que la série de Fourier d'une fonction $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, de période 2π et lipschitzienne converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Suites et séries de fonctions
- Nombres réels et suites numériques
- Séries numériques et vectorielles
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Limites et continuité

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mp