Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2024, filière MP

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Exercice I : espérance d'une variable à valeurs entières
- Exercice II : équation différentielle linéaire
- Partie I : première méthode, intégrales de Wallis et arcsinus
- Partie II : deuxième méthode, intégrale à paramètre

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mp/2024/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUN INP

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MP

MATHÉMATIQUES 1

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- *Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.*
- *Ne pas utiliser de correcteur.*
- *Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.*

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème, tous indépendants.

EXERCICE I

X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ d'espérance finie.

Q1. Exprimer, pour k non nul, $P(X=k)$ en fonction de $P(X>k-1)$ et de $P(X>k)$.

Démontrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} kP(X=k)=\sum_{k=0}^{n-1}P(X>k)-nP(X>n)$.

Démontrer le résultat de cours : $\displaystyle E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty}P(X>k)$.

Q2. Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On effectue, de façon équiprobable, p tirages successifs avec remise et on note X le plus grand nombre obtenu. Calculer, pour tout entier naturel k, $P(X\leq k)$, puis donner la loi de X.

Q3. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^p$, puis en utilisant la **Q1**., déterminer un équivalent pour n au voisinage de $+\infty$ de $E(X)$.

EXERCICE II

On considère les équations différentielles :

(E) : $x^2y''+4xy'+(2-x^2)y=1$

(H) : $x^2y''+4xy'+(2-x^2)y=0$

On note $I=]0,+\infty[$, $S_I(E)$ l'ensemble des solutions de l'équation (E) sur I et $S_I(H)$ l'ensemble des solutions de l'équation (H) sur I.

Q4. Donner, en justifiant, la dimension de l'espace vectoriel $S_I(H)$.

Q5. Démontrer qu'il existe une unique solution f de (E) sur I développable en série entière sur $\mathbb{R}$.

Vérifier que pour tout $x\in I$, $f(x)=\dfrac{\mathrm{ch}x-1}{x^2}$.

Q6. On note pour $x\in I$, $g(x)=\dfrac{-1}{x^2}$ et $h(x)=\dfrac{\mathrm{sh}x}{x^2}$.

On admet dans cette question que $g\in S_I(E)$ et $h\in S_I(H)$.

Donner, sans calculs, l'ensemble $S_I(E)$.

Q7. Quelle est la dimension de l'espace vectoriel $S_{\mathbb{R}}(H)$ (solutions de (H) sur $\mathbb{R}$) ?

PROBLÈME

Il existe de nombreuses méthodes pour déterminer la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Ce problème propose deux méthodes différentes de recherche de la valeur de cette somme.

Q8. Question préliminaire

Si on admet que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, que vaut la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$?

Partie I

Q9. On note, pour tout entier naturel n, $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n \mathrm{d}x$.

Calculer la dérivée de la fonction $x \mapsto (\sin x)^{n+1}$, puis déterminer une relation entre W_{n+2} et W_n.

En déduire, pour tout entier naturel n, que $W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.

Q10. Déterminer sur l'intervalle $]-1, 1[$ le développement en série entière des fonctions $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $x \mapsto \operatorname{Arcsin} x$.

Q11. En déduire que pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}$.

Q12. Justifier que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}\right] \mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1} \mathrm{d}x$.

Q13. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Partie II

Q14. Donner sur l'intervalle $]-1,1[$ le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$, puis calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x$.

On donnera le résultat sous la forme de la somme d'une série numérique.

Q15. On pose pour $x \in [0,+\infty[$, $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan}(xt)}{1+t^2}\mathrm{d}t$.

Démontrer que la fonction f est bien définie et est continue sur l'intervalle $[0,+\infty[$.

Q16. Établir que cette fonction f est de classe C^1 sur l'intervalle $]0,1]$ et exprimer $f'(x)$ comme une intégrale.

Q17. Réduire au même dénominateur l'expression $\dfrac{t}{1+t^2} - \dfrac{x^2t}{1+t^2x^2}$ et en déduire que pour tout $x \in]0,1[$, $f'(x) = \dfrac{\ln x}{x^2-1}$.

Q18. Calculer $f(1)$, puis en déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

FIN

IMPRIMERIE NATIONALE – 24 1089 – D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Séries numériques et vectorielles
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Techniques fondamentales de calcul en analyse

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mp