Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2025, filière MPI

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Exercice I : connexité par arcs et dérivée
- Exercice II : un minimum par deux méthodes
- Partie I : théorème de comparaison avec une intégrale
- Partie II : contre-exemples

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mpi/2025/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUN INP

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MPI

MATHÉMATIQUES 1

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- *Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.*
- *Ne pas utiliser de correcteur.*
- *Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.*

Les calculatrices sont interdites

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème, tous indépendants.

EXERCICE I

Q1. Soit une application $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ de classe C^1.

Justifier que $f'\left(]-1,1[\right)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

Q2. On considère l'application $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(t) = \begin{cases} (0,0) & \text{si } t \in]-1,0] \\ \left(t^2 \sin\frac{1}{t}, t^2 \cos\frac{1}{t}\right) & \text{si } t \in]0,1[\end{cases}.$$

On note pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$.

a) Démontrer que f est dérivable en 0 puis sur l'intervalle $]-1,1[$.

Préciser le vecteur $f'(t)$ pour tout $t \in]-1,0]$ et pour tout $t \in]0,1[$.

b) Démontrer que $\forall t \in]0,1[$, $\| f'(t) \|_2 \geq 1$ et en déduire que $f'\left(]-1,1[\right)$ n'est pas connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

On pourra tracer la boule unité de $\mathbb{R}^2$ pour la norme $\| \ \|_2$ et on acceptera un dessin pertinent comme preuve.

EXERCICE II

On pose pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$.

On se propose de déterminer le réel $\min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$ par deux méthodes différentes.

Q3. Première méthode

Déterminer le seul point critique de la fonction f sur $\mathbb{R}^2$. Démontrer à l'aide d'une matrice Hessienne que f admet en ce point un minimum local.

En admettant que ce minimum est global, donner la valeur du $\min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$.

Q4. Deuxième méthode

Sur l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^3$, on note le produit scalaire canonique par $\langle \ | \ \rangle$ et sa norme associée par $\|(x,y,z)\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

On note $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$ et $F = \text{vect}\{u,v\}$.

On note $b \in F$ le projeté orthogonal du vecteur a sur le sous-espace vectoriel F.

Justifier que $\langle a-b | u \rangle = \langle a-b | v \rangle = 0$ et en déduire le vecteur b.

Déterminer la valeur de $\min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} f(x,y)$.

PROBLÈME
Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Dans ce problème, on se propose de démontrer le théorème de comparaison avec une intégrale, puis de traiter des exemples et des applications. On terminera par deux contre-exemples.

Partie I - Théorème de comparaison avec une intégrale

Dans cette partie, *f* est une fonction continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

On pose, pour tout entier naturel *n*, $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\mathrm{d}t$ et pour tout entier *k* non nul, $I_k = \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t$.

Q5. Préciser la monotonie des suites (S_n) et (J_n), puis démontrer que pour tout entier *k* non nul, $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t \leq f(k-1)$.

Q6. Démontrer que pour tout entier *n* non nul, $S_n - f(0) \leq J_n \leq S_{n-1}$.

Q7. Démontrer enfin les deux résultats :

(1) *f* est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, si et seulement si, la série $\sum f(n)$ converge.

(2) La série $\sum_{n\geq 1}\left[\int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t - f(n)\right]$ converge.

Q8. Un exemple.

On pose pour $\alpha > 0$ et $x \in [2,+\infty[$, $f(x) = \dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha}}$.

a) Étudier la monotonie de la fonction *f*, calculer $\int_2^x f(t)\mathrm{d}t$ et en déduire la nature de la série $\sum_{n\geq 2} \dfrac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}$.

b) Dans le cas où $\alpha = 2$, déterminer en fonction de $\ln 2$, un encadrement de $\sum_{n=2}^{+\infty} \dfrac{1}{n(\ln n)^2}$.

Q9. Une application.

On pose pour *n* entier naturel non nul, $T_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k} - \ln n$.

a) En utilisant le résultat (2) de la question **Q7.**, établir que la suite (T_n) converge. On notera γ sa limite (constante d'Euler).

b) Justifier que, au voisinage de $+\infty$, $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+o(1)$ et en déduire un équivalent au voisinage de $+\infty$ de $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

Q10. Une application sur une série de fonctions.

On considère la série de fonctions $\sum g_n$ où pour tout $x\in]0,+\infty[$, $g_n(x)=\frac{x}{n^2+x^2}$.

a) Étudier la convergence normale de cette série de fonctions sur $]0,+\infty[$.

b) On pose pour *x* fixé non nul, $f(t)=\frac{x}{t^2+x^2}$.

Établir que, pour *n* entier non nul, $\int_1^{n+1}f(t)\mathrm{d}t\le\sum_{k=1}^{n}f(k)\le\int_0^{n}f(t)\mathrm{d}t$.

c) En déduire que, pour tout *x* non nul, $\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\le\sum_{n=1}^{+\infty}g_n(x)\le\frac{\pi}{2}$.

d) Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}g_n(x)$.

La série de fonctions $\sum g_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0,+\infty[$?

Partie II - Contre-exemples

Q11. On pose pour $x\in[1,+\infty[$, $f(x)=|\sin(2\pi x)|$.

a) Calculer pour *n* entier naturel non nul, $\int_n^{n+1}f(t)\mathrm{d}t$.

On pourra remarquer que $\int_n^{n+1}f(t)\mathrm{d}t=\int_n^{n+\frac{1}{2}}f(t)\mathrm{d}t+\int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1}f(t)\mathrm{d}t$.

On note $\lfloor x\rfloor$ la partie entière du réel *x*.

b) Établir que pour $x\in[1,+\infty[$, $\int_1^{x}|\sin(2\pi t)|\mathrm{d}t\ge\frac{2}{\pi}(\lfloor x\rfloor-1)$.

La fonction *f* est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$? Que dire de la nature de la série $\sum_{n\geq 1} f(n)$?

Q12. On se propose de construire un contre-exemple d'une fonction *f* continue, positive et intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum_{n\geq 1} f(n)$ diverge.

Pour tout entier *n* non nul, trouver un réel a_n de sorte que le triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire égale à $\frac{1}{n^2}$.

Dessiner l'allure d'une courbe de fonction *f* définie et continue sur $[1, +\infty[$ de la manière suivante : chaque entier naturel *n* non nul a pour image 1 et autour de chaque *n* (sur chaque intervalle $[n - a_n, n + a_n]$) tracer l'allure du triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1. Enfin, la fonction est nulle en dehors de tous les intervalles $[n - a_n, n + a_n]$.

Démontrer que cette fonction *f* fournit un contre-exemple.

FIN

IMPRIMERIE NATIONALE – 25 1073 – D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MPI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Topologie des espaces vectoriels normés
- Fonctions vectorielles et arcs paramétrés
- Séries numériques et vectorielles
- Intégration sur un intervalle quelconque

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mpi