Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2001, filière PC

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : décomposition en valeurs singulières
- Partie II : pseudo-inverse

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/pc/2001/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC

MATHÉMATIQUES 1

DURÉE : 4 heures

Les calculatrices ne sont pas autorisées

Notations

Soit n et p des entiers supérieurs ou égaux à 1. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des matrices à coefficients réels ayant n lignes et p colonnes. On identifiera $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ respectivement à $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$, que l'on supposera munis de leurs produits scalaires canoniques notés respectivement $< \cdot \mid \cdot >_n$ et $< \cdot \mid \cdot >_p$. Les normes associées à ces produits scalaires seront notées respectivement $|| \cdot ||_n$ et $|| \cdot ||_p$.

On notera $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $(F_j)_{1 \leq j \leq n}$ celle de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Lorsque $p = n$, $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ est noté plus simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et est muni de sa structure d'algèbre, I_n représentant la matrice identité.

$0_{n,p}$ désigne la matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et 0_n la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Pour A appartenant à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, ${}^tA$ désigne la matrice transposée de A : c'est un élément de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$.

$\operatorname{Ker} A$ est le noyau de A défini par

$$\operatorname{Ker} A = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \mid AX = 0\}$$

$\operatorname{Im} A$ est l'image de A définie par

$$\operatorname{Im} A = \{AX \mid X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\}$$

Enfin, on adopte la notation $F^\perp$ pour désigner l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel F d'un espace euclidien.

Partie I

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

I.1 Montrer que ${}^tAA$ est nulle si et seulement si A est nulle.

Dans toute la suite du problème A sera supposée non nulle.

I.2 Montrer que les matrices ${}^tAA$ et $A{}^tA$ sont diagonalisables au moyen de matrices orthogonales.

I.3 a) X, Y désignant deux éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, exprimer le produit scalaire $< X \mid Y >_n$ sous la forme d'un produit matriciel.

Tournez la page S.V.P.

b) Si W est un vecteur propre de ${}^tAA$ associé à la valeur propre λ, exprimer $||AW||_n^2$ en fonction de λ et $||W||_p$.

c) En déduire que les valeurs propres de ${}^tAA$ sont réelles, positives ou nulles.

I.4 a) Pour x réel, calculer les produits matriciels par blocs suivants :

$$\begin{pmatrix} xI_n & A \\ {}^tA & I_p \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -I_n & 0_{n,p} \\ {}^tA & I_p \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} xI_n & A \\ {}^tA & I_p \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -I_n & A \\ 0_{p,n} & -xI_p \end{pmatrix}$$

b) En déduire que les matrices ${}^tAA$ et $A{}^tA$ ont les mêmes valeurs propres non nulles avec le même ordre de multiplicité.

c) En déduire également que les matrices ${}^tAA$ et $A{}^tA$ ont même rang.

I.5 Montrer que si $n > p$, 0 est valeur propre de $A{}^tA$ et que si $n < p$, 0 est valeur propre de ${}^tAA$.

I.6 On note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres de ${}^tAA$, chaque valeur propre apparaissant dans cette liste un nombre de fois égal à son ordre de multiplicité et on pose $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$ pour tout i élément de $\{1, 2, \ldots, p\}$.

Les réels μ_i sont appelés valeurs singulières de A.

On suppose les réels λ_i ordonnés tels que $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_p \geq 0$.

a) Montrer que λ_1 est non nul.

On définit alors un unique entier naturel r appartenant à $\{1, 2, \ldots, p\}$ comme suit : si toutes les valeurs propres de ${}^tAA$ sont non nulles, $r = p$, sinon r est tel que pour tout $i \leq r$, $\lambda_i > 0$ et pour tout $i > r$, $\lambda_i = 0$.

Soit $(V_1, V_2, \ldots, V_p)$ une base orthonormale de vecteurs propres de ${}^tAA$ respectivement associés aux valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$; $V_1, V_2, \ldots, V_r$ désignent les vecteurs propres associés aux valeurs propres non nulles et lorsque r est strictement inférieur à p, $V_{r+1}, \ldots, V_p$ désignent les vecteurs propres associés à la valeur propre 0.

b) Montrer que $r \leq n$ et que la dimension de $\mathrm{Ker}\, A{}^tA$ est égale à $n - r$.

Pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$, on pose $U_i = \dfrac{1}{\mu_i} AV_i$ et si $n > r$, on désigne par $(U_{r+1}, \ldots, U_n)$ une base orthonormale de $\mathrm{Ker}\, A{}^tA$.

c) Montrer que pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$, $AV_i = \mu_i U_i$ et que si r est strictement inférieur à p, pour tout $i \in \{r+1, \ldots, p\}$, $AV_i = 0$.

d) Montrer que pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$, ${}^tAU_i = \mu_i V_i$.

e) Montrer que si $n > r$, pour tout $i \in \{r+1, \ldots, n\}$, ${}^tAU_i = 0$.

f) En déduire que le système de vecteurs $(U_1, U_2, \ldots, U_n)$ constitue une base orthonormale de vecteurs propres de $A{}^tA$ et préciser la valeur propre associée à chaque vecteur U_i.

I.7 On note V la matrice carrée réelle d'ordre p dont le i$^{\text{ème}}$ vecteur colonne est le vecteur V_i, U la matrice carrée réelle d'ordre n dont le j$^{\text{ème}}$ vecteur colonne est le vecteur U_j et $({}^tUAV)_{ij}$ l'élément de la i$^{\text{ème}}$ ligne, j$^{\text{ème}}$ colonne de la matrice ${}^tUAV$.

a) Montrer que :

$$\forall (i,j) \in \{1, 2, \ldots, n\} \times \{1, 2, \ldots, p\}\ ,\ ({}^tUAV)_{ij} = \mu_j \delta_{ij} \text{ où } \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

b) On note Δ la matrice appartenant à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ dont tous les éléments Δ_{ij} sont nuls sauf $\Delta_{11}, \Delta_{22}, \ldots, \Delta_{rr}$ respectivement égaux à $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r$. Montrer que $A = U\Delta {}^tV$.

La factorisation de A ainsi obtenue est dite décomposition de A en valeurs singulières.

c) Trouver une décomposition en valeurs singulières de chacune des matrices :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

I.8 Montrer que le rang de A est égal à r.

I.9 **a)** Montrer que $V = \sum_{i=1}^{p} V_i {}^tE_i$.

b) En déduire :

$$A = \sum_{i=1}^{r} \mu_i U_i {}^tV_i \quad , \quad {}^tAA = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i V_i {}^tV_i \quad , \quad A{}^tA = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i U_i {}^tU_i$$

c) Déterminer les sous-espaces vectoriels suivants : $\mathrm{Ker}\, A$, $\mathrm{Ker}\, {}^tA$, $\mathrm{Im}\, A$, $\mathrm{Im}\, {}^tA$.

d) Montrer que $\mathrm{Ker}\, {}^tAA = \mathrm{Ker}\, A$ et $\mathrm{Ker}\, A{}^tA = \mathrm{Ker}\, {}^tA$

Partie II

Avec les notations de la partie **I**, pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ admettant une décomposition en valeurs singulières $A = U\Delta {}^tV$, on appelle Δ^+ la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ dont tous les éléments Δ^+_{ij} sont nuls sauf $\Delta^+_{11}, \Delta^+_{22}, \ldots, \Delta^+_{rr}$ respectivement égaux à $\frac{1}{\mu_1}, \frac{1}{\mu_2}, \ldots, \frac{1}{\mu_r}$ et on pose $A^+ = V(\Delta^+){}^tU$

Δ^+ (resp. A^+) est appelée pseudo-inverse de Δ (resp. de A). A priori, la matrice A^+ ainsi définie dépend de la décomposition en valeurs singulières choisie pour la matrice A, mais il sera montré à la question **II.9** *qu'il n'en est rien et que A^+ est uniquement déterminée à partir de A.*

II.1 Déterminer les matrices A_0^+, $A_0A_0^+$, $A_0^+A_0$, $A_0A_0^+A_0$ et $A_0^+A_0A_0^+$.

II.2 Déterminer $(A_0^+)^+$.

II.3 Evaluer $\Delta^+\Delta$ et $\Delta\Delta^+$.

II.4 Montrer que si A est une matrice carrée inversible ($n = p = r$), alors $A^+ = A^{-1}$.

II.5 Montrer que :

$$A^+ = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\mu_i} V_i {}^tU_i \quad , \quad AA^+ = \sum_{i=1}^{r} U_i {}^tU_i \quad , \quad A^+A = \sum_{i=1}^{r} V_i {}^tV_i$$

II.6 **a)** Evaluer AA^+U_j pour tout $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ et en déduire que AA^+ est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$ de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathrm{Im}\, A$.

b) Montrer de même que A^+A est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^p$ de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^p$ sur $(\mathrm{Ker}\, A)^\perp$.

II.7 Etablir les identités suivantes :

$$AA^+ = {}^t(AA^+)\ ,\ A^+A = {}^t(A^+A)\ ,\ AA^+A = A\ ,\ A^+AA^+ = A^+ \qquad (1)$$

II.8 Etablir les résultats suivants :

i) $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Im}\, AA^+$, $\mathrm{Ker}\, A^+ = \mathrm{Ker}\, AA^+$, $\mathrm{Im}\, A^+ = \mathrm{Im}\, A^+A$, $\mathrm{Ker}\, A = \mathrm{Ker}\, A^+A$.

ii) $\mathbb{R}^n = \mathrm{Im}\, A \oplus \mathrm{Ker}\, A^+$, $\mathbb{R}^p = \mathrm{Im}\, A^+ \oplus \mathrm{Ker}\, A$.

II.9 Soit B une matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$AB = {}^t(AB)\ ,\ BA = {}^t(BA)\ ,\ ABA = A\ ,\ BAB = B$$

a) Montrer que B vérifie les identités suivantes :

i) $B = B{}^tB{}^tA = {}^tA{}^tBB$

ii) $A = A{}^tA{}^tB = {}^tB{}^tAA$

iii) ${}^tA = {}^tAAB = BA{}^tA$

b) En déduire que $B = A^+$, autrement dit que A^+ est l'unique matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ vérifiant les relations (1).

II.10 Montrer que $(A^+)^+ = A$ et ${}^t(A^+) = ({}^tA)^+$.

II.11 Evaluer $(A_0B_0)^+$ et $B_0^+A_0^+$. A-t-on l'égalité ?

II.12 Soit $H \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\overline{H} = A^+H$. On note $\mathrm{d}(H, \mathrm{Im}\, A)$ la distance de H au sous-espace vectoriel $\mathrm{Im}\, A$.

a) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $AX - AA^+H$ et $H - AA^+H$ sont orthogonaux et en déduire :

$$\forall\, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\ ,\ ||A\overline{H} - H||_n \leq ||AX - H||_n$$

Que vaut alors $\mathrm{d}(H, \mathrm{Im}\, A)$?

b) Montrer que s'il existe $\widetilde{H} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ tel que $||A\widetilde{H} - H||_n = ||A\overline{H} - H||_n$ avec $\widetilde{H} \neq \overline{H}$, alors $||\overline{H}||_p < ||\widetilde{H}||_p$.

c) Si $H = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, déterminer $\inf_{X \in \mathbb{R}^2} ||A_0X - H||_3$.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PC chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Compléments d'algèbre linéaire

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/pc