Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2004, filière PC

Mathématiques 2

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : la série entière somme des z^n / n^s
- Partie II : la fonction zêta
- Partie III : séries de Fourier et intégrales

Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.

Copie recomposée du sujet officiel, sans retouche de son contenu ; la mise en page diffère de l'original.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/pc/2004/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Concours CCP 2004

Epreuve spécifique - Filière PC

MATHEMATIQUES 2

Durée : 4 heures

Les calculatrices sont interdites

****

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

****

La partie II peut être traitée indépendamment des parties I et III.

Partie I

On considère la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}\, z^n$ de la variable complexe z, où s est un nombre réel donné.

I.1 Déterminer le rayon de convergence de cette série entière.

I.2 Dans cette question, $z = e^{i\theta}$ désigne un nombre complexe de module 1.

I.2.1 Etudiez la convergence de $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s} z^n$ dans le cas où $s > 1$ ainsi que dans le cas où $s \leq 0$.

I.2.2 Dans le cas où $0 < s \leq 1$, étudier la convergence de $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s} z^n$ pour $z = 1$.

I.2.3 Toujours dans le cas où $0 < s \leq 1$, on suppose que $z \neq 1$. On pose $S_0 = 0$ et pour tout nombre entier $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} z^k$.

Montrer que $|S_n| \leq M(\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $M(\theta) = \dfrac{1}{\left|\sin \dfrac{\theta}{2}\right|}$.

En écrivant z^k sous la forme $S_k - S_{k-1}$ pour tout nombre entier $k \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} k^{-s}\, z^k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left[k^{-s} - (k+1)^{-s}\right] + S_n\, n^{-s}.$$

Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} S_n \left[n^{-s} - (n+1)^{-s}\right]$ est convergente et en déduire que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}\, z^n$ est convergente.

Nous noterons dorénavant $\varphi(z,s)$ la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}\, z^n$ pour tout couple $(z,s) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ pour lequel cette série est convergente.

I.3 On note I l'intervalle ouvert $]-1,1[$ de $\mathbb{R}$.

I.3.1 Montrer que pour tout $(x,s) \in I \times \mathbb{R}$ on a $\varphi(x,s+1) = \displaystyle\int_0^x \frac{\varphi(t,s)}{t}\, \mathrm{d}t$.

I.3.2 Calculer $\varphi(x,0)$ et $\varphi(x,1)$ pour tout $x \in I$.

I.4 On suppose dans cete question que $s > 1$.

I.4.1 Soit f_n la fonction définie sur $[0,+\infty[$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $f_n(t) = e^{-nt}\, t^{s-1}$. Montrer que f_n est intégrable sur $[0,+\infty[$ et exprimer $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(t)\, \mathrm{d}t$ à l'aide de n, s et l'intégrale $\Gamma(s) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{s-1}\, \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} f_1(t)\, \mathrm{d}t$.

I.4.2 Soit z un nombre complexe de module inférieur ou égal à 1. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} z^n f_n(t)$ de fonctions de la variable réelle t est intégrable terme à terme sur $]0,+\infty[$.
En déduire que pour tout $s > 1$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \leq 1$, on a

$$\varphi(z,s) = \frac{z}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - z}\, \mathrm{d}t. \tag{1}$$

Partie II

Pour tout nombre réel $s > 1$, on pose $\zeta(s) = \varphi(1,s) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}$.

II.1 Montrer que ζ est une fonction indéfiniment dérivable de la variable s sur $]1,+\infty[$.

II.2 Montrer que ζ est strictement décroissante sur $]1,+\infty[$.

II.3 Montrer que pour tout $s \in]1,+\infty[$, on a :

$$0 \leq \zeta(s) - 1 \leq \int_1^{+\infty} t^{-s}\, \mathrm{d}t \leq \zeta(s).$$

En déduire la limite de $\zeta(s)$ lorsque s tend vers $+\infty$. Déterminer un équivalent de $\zeta(s)$ lorsque s tend vers 1 par valeurs supérieures à 1.

Partie III

III.1 Soit g la fonction de la variable réelle x définie par :

$$(i) \quad g(x) = \Big(\frac{\pi - x}{2}\Big)^2 \text{ pour tout } x \in [\,0, 2\pi\,[$$

$$(ii) \quad g \text{ est périodique de période } 2\pi.$$

III.1.1 Montrer que g est paire. Développer g en série de Fourier réelle. Etudier l'égalité entre g et la somme de sa série de Fourier.

III.1.2 Calculer les valeurs de $\zeta(2)$ et $\zeta(4)$, où ζ est la fonction définie dans la partie précédente.

III.2 Soit θ un nombre réel. On note $R\varphi(\theta)$ la partie réelle de $\varphi(e^{i\theta}, 2)$ où φ est la fonction définie à la question I.2.

III.2.1 Exprimez $R\varphi(\theta)$ à l'aide de $g(\theta)$.

III.2.2 En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ on a :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t(e^t \cos\theta - 1)}{e^{2t} - 2e^t \cos\theta + 1}\, \mathrm{d}t = g(\theta) - \frac{\pi^2}{12}\,.$$

III.2.3 Déduire de ce qui précède la valeur des intégrales :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1}\, \mathrm{d}t \qquad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t + 1}\, \mathrm{d}t \qquad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{t}{\operatorname{sh} t}\, \mathrm{d}t$$

III.3 Soit s un nombre réel strictement positif.

III.3.1 Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ on a les égalités :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^s(e^t \cos\theta - 1)}{e^{2t} - 2e^t \cos\theta + 1}\, \mathrm{d}t = \Gamma(s+1) \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-(s+1)} \cos n\theta,$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^s\, e^t \sin\theta}{e^{2t} - 2e^t \cos\theta + 1}\, \mathrm{d}t = \Gamma(s+1) \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-(s+1)} \sin n\theta.$$

III.3.2 En déduire des expressions des intégrales :

$$I(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^s}{\operatorname{ch} t}\, \mathrm{d}t, \qquad J(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^s}{\operatorname{sh} t}\, \mathrm{d}t,$$

en fonction des sommes $S_1(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} (2k+1)^{-(s+1)}$, $S_2(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (2k+1)^{-(s+1)}$ et de $\Gamma(s+1)$.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PC chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Séries entières
- Séries numériques et vectorielles
- Suites et séries de fonctions
- Intégration sur un intervalle quelconque

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/pc