Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2015, filière PC

Mathématiques

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1, partie 1 : analyse de la suite e^(-t) t^n / n!
- Problème 1, partie 2 : interprétation probabiliste
- Problème 2 : matrices binaires et matrices de Hadamard

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/pc/2015/maths

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

MATHEMATIQUES

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont interdites

L'épreuve est constituée de deux problèmes indépendants.

Lorsqu'un raisonnement utilise un résultat obtenu précédemment dans le problème, il est demandé au candidat d'indiquer précisément le numéro de la question utilisée.

PROBLEME 1 : ANALYSE ET PROBABILITE


On propose d'étudier dans ce premier problème le comportement d'une certaine suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sous différents points de vue. Dans la partie 1, on étudie les aspects analytiques de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$: convergence uniforme de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, propriétés d'intégrales associées à f_n et modes de convergence de la série $\sum f_n$.
La partie 2 correspond à l'étude de la formule de Bernstein : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(e^{-n}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{n^k}{k!}\right)=\dfrac{1}{2}$.
Cette formule, en lien avec la suite de fonctions introduites dans la partie 1, peut être avantageusement interprétée en terme de suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Poisson. Le point de vue probabiliste permet alors d'éclairer le lien avec une intégrale intervenant en partie 1 et l'existence d'une limite ℓ pour $e^{-n}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{n^k}{k!}$. Cela permet aussi d'approcher la valeur de ℓ par différentes méthodes.
Les parties 1 et 2 peuvent être traitées, en grande partie, indépendamment l'une de l'autre.

PARTIE 1 : ANALYSE

On considère la fonction f et, pour $n\in\mathbb{N}$, la fonction f_n, définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\text{pour tout } t\in\mathbb{R}_+,\ f(t)=0 \text{ et } f_n(t)=\frac{e^{-t}t^n}{n!}.$$

Figure 1 : famille de courbes



1. On rappelle qu'un équivalent de $n!$ est $\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ quand n tend vers $+\infty$.

1.a. Etudier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les variations de la fonction f_n sur $\mathbb{R}_+$ et en déduire son maximum.

1.b. Montrer que $f_n(n) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{n^{1/2}}$ quand n tend vers $+\infty$.

1.c. Etablir que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}_+$.

2.

2.a. Déterminer l'ensemble D des valeurs de $x \in \mathbb{R}$ pour lesquelles l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}t^x \, \mathrm{d}t$ est convergente et vérifier que $\mathbb{R}_+ \subset D$.

2.b. Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}_+$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} (\ln t)e^{-t}t^x \, \mathrm{d}t$ est convergente.

2.c. Montrer que la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}t^x \, \mathrm{d}t$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

2.d. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(t) \, \mathrm{d}t$ est convergente.

2.e. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(t) \, \mathrm{d}t = 1$.

3. Pour $x \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n(x) = \frac{1}{n!}\displaystyle\int_x^{+\infty} e^{-t}t^n \, \mathrm{d}t$.

3.a. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $H_n(x) = 1 - \displaystyle\int_0^x f_n(t) \, \mathrm{d}t$.

3.b. Etablir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et donner l'expression de H_n'.

3.c. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to 0}(H_n(x))$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(H_n(x))$.

3.d. Calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\lim\limits_{n\to+\infty}(H_n(x))$.

4. Dans la figure 1 de la page 2, on peut visualiser certaines des représentations graphiques des fonctions de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont celle de f_1 et f_5.

4.a. Lesquelles des courbes $\mathscr{C}_a$, $\mathscr{C}_b$, $\mathscr{C}_c$, $\mathscr{C}_d$ ou $\mathscr{C}_e$ de la figure 1 correspondent respectivement aux représentations graphiques de f_1 et de f_5 ?

4.b. Pouvez-vous faire le lien entre cette figure et certaines propriétés analysées dans les questions précédentes ?

5.

5.a. Montrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.

5.b. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur le segment $[0, a]$.

5.c. Montrer que la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur $\mathbb{R}_+$.

PARTIE 2 : PROBABILITE

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$ et mutuellement indépendantes. On admet que dans ce cas, pour tout $n \geqslant 2$, $X_1 + \cdots + X_n$ et X_{n+1} sont indépendantes.

On suppose de plus que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, X_n suit la loi de Poisson de paramètre 1.

On rappelle que si X est une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$ et qui suit une loi de Poisson de paramètre λ, alors $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, $\mathbf{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} X_k$ et $S_n^* = \dfrac{S_n - n}{\sqrt{n}}$.

1.

1.a. Montrer que S_n suit une loi de Poisson de paramètre n et en déduire son espérance et sa variance.

1.b. Déterminer l'espérance et la variance de S_n^*.

1.c. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{P}(S_n^* \leqslant 0) = e^{-n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}$.

2. Soit $r \in \mathbb{N}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(a, b) \in I^2$. On rappelle que si f est une fonction de classe $\mathscr{C}^{r+1}$ sur I, alors on a :

$$f(b) = \sum_{k=0}^{r} f^{(k)}(a)\frac{(b-a)^k}{k!} + \int_a^b f^{(r+1)}(t)\frac{(b-t)^r}{r!}\,\mathrm{d}t.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$e^n = \sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!} + \int_0^n \frac{e^{n-t}\cdot t^n}{n!}\,\mathrm{d}t.$$

3.

3.a. Montrer que : $\mathbf{P}(S_n^* \leqslant 0) = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_n^{+\infty} e^{-t}t^n\,\mathrm{d}t = H_n(n)$ où H_n est définie dans la partie 1.

3.b. Etablir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbf{P}(S_n^* \leqslant 0) - \mathbf{P}(S_{n+1}^* \leqslant 0) = \int_n^{n+1} e^{-t}\frac{t^{n+1}}{(n+1)!}\,\mathrm{d}t - e^{-n}\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}.$$

3.c. En déduire que la suite $\left(\mathbf{P}(S_n^* \leqslant 0)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante qui converge vers une limite $\ell \in [0, 1[$.

3.d. Proposer une méthode numérique et une méthode probabiliste pour conjecturer la valeur de ℓ. Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs de ces deux méthodes ?

4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbf{G}_{S_n}$ la série génératrice de S_n. On rappelle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\mathbf{G}_{S_n}(t) = \mathbf{E}(t^{S_n}) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbf{P}(S_n = k)t^k$.

4.a. Donner, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, une expression simple de $\mathbf{G}_{S_n}(t)$.

4.b. Vérifier que, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $t^{S_n^*}$ admet une espérance, notée $\mathbf{E}(t^{S_n^*})$, et que :

$$\mathbf{E}(t^{S_n^*}) = \frac{\mathbf{G}_{S_n}(t^{1/\sqrt{n}})}{t^{\sqrt{n}}}.$$

4.c. Déterminer, pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\mathbf{E}(t^{S_n^*})\right)$.

PROBLEME 2 : ALGEBRE

On propose d'étudier, dans ce second problème, différents aspects des matrices à coefficients dans $\{-1, 1\}$ (matrices binaires) : inversibilité, orthogonalité des colonnes (matrices de Hadamard) et propriétés du spectre.

Dans tout le problème, n désigne un entier naturel tel que $n \geqslant 2$.

On débute l'étude par des exemples en petite dimension. En dimension n, on aboutit notamment à trois résultats sur de telles matrices :

- une matrice de Hadamard ne peut exister que si $n = 2$ ou si n est un multiple de 4 ;
- on peut construire une matrice binaire inversible à n'importe quel ordre n ;
- les valeurs propres des matrices binaires sont de module inférieur ou égal à n.

Notons $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles carrées d'ordre n,

$\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles à n lignes et 1 colonne,

A^T la matrice transposée d'une matrice A,

I_n la matrice identité d'ordre n,

$\mathrm{Sp}(A)$ l'ensemble des valeurs propres d'une matrice carrée A.

Dans tout le problème, on munit $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique défini de la façon suivante :

$$\forall (X, Y) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \qquad \langle X, Y \rangle = X^T \cdot Y.$$

Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, on note :

$A_{i,j}$ le coefficient situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne de A,

$C_j(A)$ la j-ème colonne de A et $L_i(A)$ la i-ème ligne de A.

On définit les trois ensembles suivants :

$$\mathscr{B}_n = \left\{A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}) \quad \text{tel que} \quad \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, A_{i,j} \in \{-1,1\}\right\},$$

$$\mathscr{G}_n = \left\{A \in \mathscr{B}_n \quad \text{tel que} \quad A \quad \text{est inversible}\right\},$$

$$\mathscr{H}_n = \left\{A \in \mathscr{B}_n \quad \text{tel que} \quad A^T \cdot A = nI_n\right\}.$$

On admettra que le déterminant d'une matrice dont les coefficients sont des entiers relatifs est aussi un entier relatif.

1. Donner un exemple de matrices A_2 et A_2' dans $\mathscr{B}_2$ telles que $A_2 \in \mathscr{H}_2$ et $A_2' \notin \mathscr{G}_2$.

2. Soit $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

La matrice A_3 appartient-elle à $\mathscr{B}_3$? à $\mathscr{H}_3$? à $\mathscr{G}_3$?

3. Soit $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $S = \frac{1}{2}A_4$.

On note φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à S.

3.a. Montrer que A_4 est une matrice de $\mathscr{H}_4$.

3.b. Montrer que φ est une symétrie et en déduire $\mathrm{Sp}(S)$.

3.c. Montrer que A_4 est diagonalisable et établir que $\mathrm{Sp}(A_4) = \{-2, 2\}$.

3.d. Proposer une méthode pour trouver une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telles que $A_4 = PDP^{-1}$.

4. Vérifier que $\mathscr{H}_n \subset \mathscr{G}_n \subset \mathscr{B}_n$ et que $\mathscr{B}_n$ est un ensemble fini dont on donnera le cardinal.

5. Montrer que, pour une matrice $A \in \mathscr{B}_n$, les propositions suivantes sont équivalentes :

i) $A \in \mathscr{H}_n$;

ii) $(C_j(A))_{1 \leqslant j \leqslant n}$ est une famille orthogonale de l'espace euclidien $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$;

iii) $\frac{1}{\sqrt{n}}A$ est une matrice orthogonale.

6. Soit $A \in \mathscr{G}_n$. On transforme A en une matrice A' par les opérations sur les lignes de A suivantes : $\forall i \in [\![2,n]\!]$, $L_i \leftarrow A_{1,1} \cdot L_i - A_{i,1} \cdot L_1$ si bien que $L_i(A') = A_{1,1} \cdot L_i(A) - A_{i,1} \cdot L_1(A)$.

6.a. Donner la relation entre $\det(A)$ et $\det(A')$.

6.b. Montrer que $A' = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & B' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ avec B' une matrice carrée d'ordre $n-1$, qui est inversible et dont tous les coefficients sont dans l'ensemble $\{-2, 0, 2\}$.

6.c. Montrer que $\det(A)$ est un multiple de 2^{n-1}.

6.d. On suppose, dans cette question, que $A \in \mathscr{H}_n$ et que $n \geqslant 3$.

Montrer que $|\det(A)| = n^{n/2}$ et en déduire que n est un multiple de 4.

7. Soient $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 4$ et $r = n-1$. On définit la fonction $\tau_r : \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathbb{R}^r$ par :

$$\text{pour tout } (x_1, \ldots, x_r) \in \mathbb{R}^r,\ \tau_r(x_1, \ldots, x_r) = (x_2, x_1, x_3, \ldots, x_r).$$

7.a. Montrer que τ_r définit un automorphisme de $\mathbb{R}^r$.

7.b. Déterminer la matrice, notée T_r, associée à τ_r dans la base canonique de $\mathbb{R}^r$.

On pose alors $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & & & \\ \vdots & & 2T_r & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$.

On transforme A en A' par les opérations sur les lignes de A suivantes : $\forall i \in [\![2, n]\!]$, $L_i \leftarrow L_1 - L_i$ si bien que $L_i(A') = L_1(A) - L_i(A)$.

7.c. Montrer que A' est un élément de $\mathscr{G}_n$.

8. Donner un exemple explicite de matrice A qui soit dans $\mathscr{G}_6$ mais pas dans $\mathscr{H}_6$.

9. Soit $A \in \mathscr{B}_n$ et soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que λ soit une valeur propre de A.

9.a. Montrer qu'il existe $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ tel que :

i) pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} A_{i,j} x_j = \lambda x_i$,

ii) il existe $k \in [\![1, n]\!]$ tel que : $x_k \neq 0$ et pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, $|x_j| \leqslant |x_k|$.

9.b. Montrer que $|\lambda| \leqslant n$.

9.c. Montrer que : $\sup\left(\left\{|\lambda| \text{ tel que } \lambda \in \mathrm{Sp}(A) \text{ et } A \in \mathscr{B}_n\right\}\right) = n$.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PC chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Suites et séries de fonctions
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Intégrales dépendant d'un paramètre
- Variables aléatoires discrètes
- Espaces probabilisés
- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Compléments d'algèbre linéaire

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/pc