Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2001, filière PSI

Mathématiques 2

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Première partie : procédé d'extrapolation de Richardson
- Deuxième partie : formule d'Euler-Mac Laurin
- Troisième partie : méthode de Romberg

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/psi/2001/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI

MATHÉMATIQUES 2

DURÉE : 4 heures

Les calculatrices programmables et alphanumériques sont autorisées, sous réserve des conditions définies dans la circulaire n° 99-186 du 16.11.99 – BOEN n°42 du 25.11.99.

L'objet de ce problème est de définir un algorithme de calcul approché d'une intégrale, utilisant la méthode des trapèzes.

Dans la première partie, on étudie le procédé d'extrapolation de Richardson.

Dans une deuxième partie, on établit la formule d'Euler - Mac Laurin.

La troisième partie utilise les deux premières parties pour définir la méthode de Romberg, qui est une méthode d'intégration basée sur l'accélération de la convergence à partir de la méthode des trapèzes.

La deuxième partie est indépendante de la première partie.

De nombreuses questions de ce problème sont simples ; le candidat s'attachera à les résoudre avec soin et complètement.

On note **R** l'ensemble des nombres réels, **N** l'ensemble des entiers naturels et **N*** l'ensemble des entiers naturels non nuls.

Etant donné un intervalle I de **R**, on note $C^\infty(I, \mathbf{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur I à valeurs dans **R**, indéfiniment dérivables.

Etant donné un entier $s \in \mathbf{N}$ et une fonction φ, on utilise la notation $\varphi(t) = O(t^s)$ lorsque $t \to 0$, qui signifie que le quotient $\dfrac{\varphi(t)}{t^s}$ est borné lorsque $t \to 0$, $t \neq 0$.

t_n étant le terme général d'une suite qui ne s'annule pas et qui tend vers 0 lorsque $n \to +\infty$, on note $u_n = O(t_n)$ lorsque $n \to +\infty$, le terme général d'une suite telle que le quotient $\dfrac{u_n}{t_n}$ est borné lorsque $n \to +\infty$.

Tournez la page S.V.P.

PREMIÈRE PARTIE

Procédé d'extrapolation de Richardson

On désigne par A une fonction définie sur $\mathbf{R}$ à valeurs dans $\mathbf{R}$, et on suppose que A admet un développement limité à tout ordre au voisinage de 0.

On note $A(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_k t^k + O\left(t^{k+1}\right)$ son développement limité à l'ordre k au voisinage de 0, les coefficients a_p étant des réels.

I.1.1 Etant donné un réel ρ non nul et un entier $s \in \mathbf{N}$, on suppose que φ est une fonction qui vérifie $\varphi(t) = O\left((\rho t)^s\right)$ lorsque $t \to 0$ .Montrer que $\varphi(t) = O\left(t^s\right)$ lorsque $t \to 0$.

I.1.2 Pour $k \in \mathbf{N}^*$, on suppose que $\varphi(t) = O\left(t^k\right)$ lorsque $t \to 0$. Déterminer la limite lorsque $t \to 0$, $t \neq 0$, du quotient $\dfrac{\varphi(t)}{t^{k-1}}$.

I.2.1. Montrer que $A(t)$ admet une limite lorsque $t \to 0$ et déterminer cette limite.

Soit r un réel vérifiant $r > 1$. On définit la suite des fonctions A_n par :

pour t réel, $A_0(t) = A(t)$ puis, pour t réel et $n \in \mathbf{N}^*$, $A_n(t) = \dfrac{r^n A_{n-1}(t) - A_{n-1}(rt)}{r^n - 1}$.

I.2.2. Montrer qu'il existe un réel $a_{1,2}$, que l'on déterminera, tel que le développement limité de A_1 à l'ordre k au voisinage de 0 soit $A_1(t) = a_0 + a_{1,2} t^2 + \cdots + O\left(t^{k+1}\right)$.

I.2.3. En déduire qu'il existe un réel $a_{n,n+1}$, que l'on ne demande pas de déterminer, tel que le développement limité de A_n à l'ordre k au voisinage de 0 soit $A_n(t) = a_0 + a_{n,n+1} t^{n+1} + \cdots + O\left(t^{k+1}\right)$.

I.2.4. Soit t_0 un réel non nul fixé. Montrer que la suite de terme général $A(r^{-m} t_0)$ converge vers a_0 lorsque $m \to +\infty$.

Dans la suite de la première partie, on suppose que pour tout $t_0 \neq 0$ fixé et $r > 1$ fixé, on sait calculer les premiers termes $A(t_0), A(r^{-1} t_0), \ldots, A(r^{-m} t_0)$ de la suite.
Le procédé de Richardson consiste à extrapoler ces valeurs pour obtenir, grâce à un procédé d'accélération de convergence, la valeur de a_0.

Pour $p \in \mathbf{N}$, on note $A_{p,0} = A_0(r^{-p} t_0)$ puis, pour q entier vérifiant $1 \leq q \leq p$, on note $A_{p,q} = A_q(r^{-p} t_0)$.

I.3.1. Justifier l'égalité $A_{p,0} = a_0 + O(r^{-p})$ lorsque $p \to +\infty$.

I.3.2. Déterminer un entier naturel $\alpha(p,q) > 0$, que l'on explicitera, tel que $A_{p,q} = a_0 + O(r^{-\alpha(p,q)})$ lorsque $p \to +\infty$.

I.3.3. Pour $p \geq 1$, justifier l'égalité : $A_{p,1} = \dfrac{r A_{p,0} - A_{p-1,0}}{r - 1}$.

I.3.4. Pour $1 \le q \le p$, justifier l'égalité :

$$A_{p,q} = \frac{r^q A_{p,q-1} - A_{p-1,\,q-1}}{r^q - 1} = A_{p,q-1} + \frac{1}{r^q - 1}\left(A_{p,q-1} - A_{p-1,\,q-1}\right).$$

Dans la pratique on range les valeurs $A_{p,q}$ pour $0 \le q \le p \le m$ dans un tableau triangulaire :

$$\begin{array}{lllll} A_{0,0} & & & & \\ A_{1,0} & A_{1,1} & & & \\ A_{2,0} & A_{2,1} & A_{2,2} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ A_{m,0} & A_{m,1} & A_{m,2} & \cdots & A_{m,m} \end{array}$$

I.4. Déterminer la plus petite valeur et la plus grande valeur de $\alpha\,(p,q)$ pour $0 \le q \le p \le m$.
Lorsque $m \to +\infty$, de laquelle des valeurs $A_{p,q}$ du tableau peut-on attendre la meilleure approximation de a_0 (on pourra utiliser **I.1.2** pour justifier la réponse) ?
On écrira cette valeur sous la forme $a_0 + O(r^{-\sigma(m)})$ lorsque $m \to +\infty$ et on précisera la valeur de l'entier naturel $\sigma(m) > 0$.

On considère une fonction $g \in C^{\infty}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ et on note $g(\alpha+h) = c_0 + c_1 h + \ldots + c_{2k} h^{2k} + O(h^{2k+1})$ son développement limité à l'ordre $2k$ au voisinage de α.

I.5.1. Exprimer les coefficients c_p pour $0 \le p \le 2k$, en fonction de g et de ses dérivées successives.

Pour $h \neq 0$, on note $G(h) = \dfrac{g(\alpha+h) - g(\alpha-h)}{2h}$.

I.5.2. Montrer que la fonction G est paire.
Montrer que G se prolonge par continuité en 0 par une valeur que l'on déterminera.

On note $\tilde{G}$ la fonction G prolongée en 0 par cette valeur.

I.5.3. Exprimer à l'aide des coefficients c_p le développement limité de $\tilde{G}$ à l'ordre $2k-1$ au voisinage de 0.

Pour t réel positif, on note $A(t) = \tilde{G}\left(\sqrt{t}\right)$.

I.6.1. On choisit $h > 0$ et on considère la suite de valeurs $G(h)$, $G\left(\dfrac{h}{2}\right)$, ..., $G\left(\dfrac{h}{2^m}\right)$.

Déterminer un réel $t_0 > 0$ et un réel $r > 1$ tels que cette suite de valeurs soit $A(t_0)$, $A(r^{-1} t_0)$, ..., $A(r^{-m} t_0)$.

Tournez la page S.V.P.

On utilise les notations des questions précédentes avec $A_0(t) = A(t)$, $A_{p,0} = A_0(r^{-p}t_0)$ puis $A_{p,q}$, pour les valeurs r et t_0 déterminées dans **I.6.1.**

I.6.2. Quelle est la limite ℓ de $A_{p,0}$ lorsque $p \to +\infty$? On exprimera ℓ à l'aide de la fonction g et de α.

Dans ce qui suit, on prend $g(x) = \ell n\, x$, $\alpha = 3$ et $h = 0{,}8$.

I.7.1. Calculer les valeurs $A_{p,0}$ pour $0 \le p \le 3$.
Donner le tableau des valeurs $A_{p,q}$ pour $0 \le q \le p \le 3$.

I.7.2. Quelle est la valeur exacte de ℓ?
Parmi les valeurs $A_{p,q}$ trouvées, quelle est la meilleure approximation de ℓ?

DEUXIÈME PARTIE

Formule d'Euler –Mac Laurin

Pour $p \in \mathbf{N}$, on définit la suite B_p de polynômes par :
(i) Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $B_0(t) = 1$
(ii) Pour $p \in \mathbf{N}^*$ et $t \in \mathbf{R}$, $B_p'(t) = pB_{p-1}(t)$ et $\int_0^1 B_p(t)dt = 0$,
et on note $b_p = B_p(0)$.

II.1.1. Déterminer les polynômes B_1, B_2, B_3.

II.1.2. Pour $0 \le p \le 3$, calculer b_p et comparer b_p à $B_p(1)$.

II.1.3. Montrer que pour $p \ge 2$, on a $b_p = B_p(1)$.

II.2.1. Pour $p \in \mathbf{N}$ et $t \in \mathbf{R}$, on définit $\tilde{B}_p(t) = (-1)^p B_p(1-t)$.
Montrer que la suite de polynômes $\tilde{B}_p$ vérifie les relations (i) et (ii). En déduire que $\tilde{B}_p = B_p$.
II.2.2. Montrer que pour $p \in \mathbf{N}^*$, on a $b_{2p+1} = 0$.

Soit $f \in C^\infty([0,1], \mathbf{R})$; on note $f^{(p)}$ la dérivée d'ordre p de la fonction f.
II.3.1. Montrer l'égalité $\int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 B_0(t)\, f(t)dt = \frac{1}{2}(f(0)+f(1)) - \int_0^1 B_1(t)\, f'(t)dt$.
II.3.2. Pour $n \ge 2$, montrer l'égalité
$$\frac{1}{2}(f(0)+f(1)) = \int_0^1 f(t)\, dt + \sum_{p=2}^{n} (-1)^p \frac{b_p}{p!}\left(f^{(p-1)}(1) - f^{(p-1)}(0)\right) + (-1)^{n+1}\int_0^1 \frac{B_n(t)}{n!} f^{(n)}(t)\, dt.$$

II.3.3. En déduire que pour $n = 2k$ on a l'égalité

(1) $\frac{1}{2}(f(0)+f(1)) = \int_0^1 f(t)\,dt + \sum_{p=1}^{k} \frac{b_{2p}}{(2p)!}\left(f^{(2p-1)}(1) - f^{(2p-1)}(0)\right) - \int_0^1 \frac{B_{2k}(t)}{(2k)!} f^{(2k)}(t)\,dt$.

Pour $t \in \mathbf{R}$, on note $E(t)$ la partie entière de t.
Pour $p \in \mathbf{N}$, on définit la fonction D_p par : pour $t \in \mathbf{R}$, $D_p(t) = B_p(t-E(t))$.

II.4.1. Montrer que D_p est une fonction périodique de période 1.
Montrer que D_p est une fonction de classe C^∞ par morceaux sur $\mathbf{R}$.

Dans la suite la fonction f appartient à $C^\infty([0,N], \mathbf{R})$ où $N \in \mathbf{N}$ avec $N \geq 2$.
Pour q entier vérifiant $1 \leq q \leq N$, on définit les fonctions f_q de $[0,1]$ dans $\mathbf{R}$ par $f_q(t) = f(t+q-1)$.

II.4.2. Montrer que les fonctions f_q appartiennent à $C^\infty([0,1], \mathbf{R})$ et qu'elles vérifient les égalités : pour $m \in \mathbf{N}$ et q entier tel que $2 \leq q \leq N$,

$$f_1^{(m)}(0) = f^{(m)}(0)\,, \quad f_q^{(m)}(0) = f_{q-1}^{(m)}(1)\,, \quad f_N^{(m)}(1) = f^{(m)}(N).$$

II.4.3. En appliquant (1) aux fonctions f_q, en déduire la formule d'Euler -Mac Laurin sur $[0,N]$:

(2) $\frac{1}{2}f(0) + \sum_{q=1}^{N-1} f(q) + \frac{1}{2}f(N) = \int_0^N f(t)\,dt + \sum_{p=1}^{k} \frac{b_{2p}}{(2p)!}\left(f^{(2p-1)}(N) - f^{(2p-1)}(0)\right) - \int_0^N \frac{D_{2k}(t)}{(2k)!} f^{(2k)}(t)\,dt.$

TROISIÈME PARTIE

Méthode de Romberg

Dans cette partie on note $[a, b]$ un intervalle de $\mathbf{R}$ et f une fonction de $C^\infty([a, b], \mathbf{R})$.

Etant donné $N \in \mathbf{N}^*$ et $h = \frac{b-a}{N}$, on note $T_f(h) = h\left[\frac{1}{2}f(a) + \sum_{q=1}^{N-1} f(a+qh) + \frac{1}{2}f(b)\right]$ si $N \geq 2$, $T_f(h) = h\left[\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b)\right]$ si $N = 1$, la valeur approchée de l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ obtenue par la méthode des trapèzes pour le pas h.

III.1. On suppose $N \geq 2$. En appliquant la formule (2) à la fonction $g(t) = f(a + ht)$ définie sur $[0,N]$, montrer la formule

(3) $T_f(h) = \int_a^b f(t)\,dt + \sum_{p=1}^{k} h^{2p} \frac{b_{2p}}{(2p)!}\left(f^{(2p-1)}(b) - f^{(2p-1)}(a)\right) - h^{2k} \int_a^b \frac{D_{2k}\left(\frac{t-a}{h}\right)}{(2k)!} f^{(2k)}(t)\,dt$.

Tournez la page S.V.P.

III.2. Montrer que la formule (3) peut s'écrire : (4) $T_f(h) = \int_a^b f(t)\,dt + \sum_{p=1}^{k-1} d_p h^{2p} + O(h^{2k})$ où les d_p désignent des nombres réels.

Pour $t > 0$, on définit $A(t) = T_f(\sqrt{t})$.

III.3.1. Déterminer $\lim_{t \to 0} A(t)$.

III.3.2. On prend $N = 1$ et donc $h = b - a$, et on calcule la suite de valeurs

$$T_f(h),\ T_f\left(\frac{h}{2}\right),\ \cdots,\ T_f\left(\frac{h}{2^m}\right).$$

Déterminer un réel $t_0 > 0$ et un réel $r > 1$ tels que cette suite de valeurs soit

$$A(t_0),\ A(r^{-1}t_0),\ \ldots,\ A(r^{-m}t_0).$$

On utilise les notations de la première partie avec $A_0(t) = A(t)$, $A_{p,0} = A_0(r^{-p}t_0)$ puis, $A_{p,q}$, t_0 et r étant les valeurs trouvées en **III.3.2.** On note $h_p = \frac{b-a}{2^p}$.

III.4.1. Exprimer $A_{p,0}$ et $A_{p-1,0}$ à l'aide de T_f et de h_p.

III.4.2. Pour $p \geq 1$, on définit $A'_{p,0} = h_p \sum f(a + (2q+1)h_p)$, la somme étant étendue aux entiers q tels que $a < a + (2q+1)\ h_p < b$.

Exprimer $A_{p,0}$ en fonction de $A_{p-1,0}$ et $A'_{p,0}$. Quel est l'intérêt de cette expression ?

III.5. On choisit $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ pour $t \neq 0$, $f(0) = 1$, $a = 0$, $b = \pi$, $h = b - a = \pi$.

III.5.1. Montrer que f appartient à $C^\infty([0, \pi], \mathbf{R})$.

III.5.2. Calculer les valeurs $A_{p,0}$ pour $0 \leq p \leq 3$ et les valeurs $A'_{p,0}$ pour $1 \leq p \leq 3$.
Indiquer dans quel ordre vous calculez ces sept valeurs.

III.5.3. Donner le tableau des valeurs $A_{p,q}$ pour $0 \leq q \leq p \leq 3$.

De laquelle de ces valeurs peut-on attendre la meilleure approximation de $\int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$?

III.6. Que donne cette méthode lorsque f est une fonction périodique de période $b - a$?

Fin de l'énoncé.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Nombres réels et suites numériques
- Dérivabilité et convexité
- Calcul algébrique : sommes, produits, binôme et systèmes linéaires

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/psi