Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2017, filière PSI

Mathématiques

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1 : matrices antisymétriques et matrices orthogonales
- Problème 2, partie I : résultats préliminaires
- Problème 2, partie II : l'intégrale de Dirichlet
- Problème 2, partie III : phénomène de Gibbs

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/psi/2017/maths

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PSI

MATHEMATIQUES

Mardi 2 mai : 14 h - 18 h

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

Le sujet est composé de deux problèmes indépendants : un d'algèbre et un d'analyse.

PROBLÈME 1

Présentation générale

On se propose ici d'étudier certaines propriétés des matrices antisymétriques réelles. Après avoir étudié un exemple en dimension 2, on utilise les matrices antisymétriques pour paramétrer un sous-ensemble des matrices orthogonales.

Notations

- $\mathbf{R}$ désigne l'ensemble des réels et, pour tout entier $n > 0$, $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ désigne l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients réels. On note I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.
- Pour tout entier $n > 0$, on désigne par $\mathcal{A}_n(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices $n \times n$ *antisymétriques* à coefficients réels et par $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ celui des matrices $n \times n$ *orthogonales* à coefficients réels. Le groupe *spécial orthogonal* est constitué des matrices orthogonales de déterminant 1.

Partie I - Un exemple en dimension 2

Q1. Soit t un réel et soit $A = \begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres complexes de A.

Q2. Calculer $R = (I_2 + A)(I_2 - A)^{-1}$ et montrer que R est une matrice du groupe spécial orthogonal.

Q3. Pour tout réel $\theta \in \mathbf{R} \setminus \pi\mathbf{Z}$, on note $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Calculer $M = (I_2 + R_\theta)^{-1}(I_2 - R_\theta)$.

Partie II - Matrices antisymétriques et matrices orthogonales

Dans ce qui suit, n désigne un entier strictement positif.

Q4. Soient B et C deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Montrer que si C est inversible et $BC = CB$, alors $BC^{-1} = C^{-1}B$.

Q5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ une matrice antisymétrique. Soit λ une valeur propre complexe de A et $X \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé. En calculant de deux façons

$$^t(AX)\,\overline{X},$$

montrer que λ est un complexe imaginaire pur (éventuellement nul).

Q6. Déduire de la question précédente que si A est antisymétrique réelle, alors $I_n + A$ est inversible et :

$$(I_n - A)(I_n + A)^{-1} = (I_n + A)^{-1}(I_n - A).$$

Montrer que $R = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$ est une matrice orthogonale.

Q7. Calculer le déterminant de R.

Q8. Soit R une matrice orthogonale telle que $I_n + R$ soit inversible. Démontrer que la matrice $A = (I_n + R)^{-1}(I_n - R)$ est antisymétrique.

Q9. On suppose ici que $n = 3$ et que $\mathbf{R}^3$ est muni de sa structure usuelle d'espace euclidien orienté par la base canonique. Soit r une rotation d'angle $\theta \in]-\pi, \pi[$ autour d'un axe orienté par un vecteur u de norme 1 et soit $R \in O_3(\mathbf{R})$ sa matrice dans la base canonique.

Montrer qu'il existe une matrice antisymétrique $A \in \mathcal{M}_3(\mathbf{R})$ telle que :

$$R = (I_3 + A)^{-1}(I_3 - A).$$

PROBLÈME 2

Présentation générale

L'objet de ce problème est l'étude du phénomène de Gibbs. Dans la première partie, on démontre des lemmes de Riemann-Lebesgue. Dans la deuxième, on calcule l'intégrale de Dirichlet. Enfin, dans la troisième partie, on met en évidence le phénomène de Gibbs.

Notations

– $\mathbf{R}$ désigne l'ensemble des réels, $\mathbf{R}^+$ désigne l'intervalle $[0, +\infty[$ et $\mathbf{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

Partie I - Résultats préliminaires

Dans ce qui suit, $\varphi : \mathbf{R} \to \mathbf{C}$ désigne une fonction continue 2π-périodique telle que :

$$\int_0^{2\pi} \varphi(t)\, dt = 0.$$

Q10. Si $f : [0, 2\pi] \to \mathbf{C}$ est une fonction de classe C^1, montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt)\ dt = 0.$$

Q11. Montrer que la primitive de φ s'annulant en 0 est 2π-périodique et bornée sur $\mathbf{R}$.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$, déduire de ce qui précède que pour toute fonction f de classe C^1 sur $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbf{C}$ on a :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)\, \varphi(nt)\, dt = 0.$$

Q12. Soient α et β deux réels tels que $\alpha < \beta$ et $h : [\alpha, \beta] \to \mathbf{C}$ une fonction continue. Soient ε un réel strictement positif et g une fonction de classe C^1 sur $[\alpha, \beta]$ telle que $\sup_{[\alpha,\beta]} |h - g| \leq \varepsilon$, montrer qu'il existe une constante M ne dépendant que de φ telle que :

$$\left| \int_\alpha^\beta h(t)\, \varphi(nt)\, dt \right| \leq M\, |\beta - \alpha|\, \varepsilon + \left| \int_\alpha^\beta g(t)\, \varphi(nt)\, dt \right|.$$

En déduire que pour tout intervalle $[a,b]$ de $\mathbf{R}$ et toute fonction $f : [a,b] \to \mathbf{C}$ continue par morceaux :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)\,\varphi(nt)\,dt = 0.$$

On pourra admettre et utiliser le théorème de Weierstrass qui affirme que pour tout segment $[\alpha,\beta]$ avec $\alpha < \beta$ et toute fonction continue $f : [\alpha,\beta] \to \mathbf{C}$, il existe une suite $(f_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur $[\alpha,\beta]$.

Q13. Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $f : [a,b] \to \mathbf{C}$ une fonction continue par morceaux. Déduire de ce qui précède que :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f(t)\sin^2(nt)\,dt = \frac{1}{2}\int_a^b f(t)\,dt.$$

Partie II - L'intégrale de Dirichlet

Soit $f : \mathbf{R}^+ \to \mathbf{C}$ une fonction continue telle que la fonction $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ soit bornée.

Q14. Montrer que, pour tout réel $a > 0$, les intégrales généralisées $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{F(t)}{t^2}dt$ puis $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{f(t)}{t}dt$ sont convergentes et que :

$$\int_a^{+\infty} \frac{f(t)}{t}dt = \int_a^{+\infty} \frac{F(t)}{t^2}dt - \frac{F(a)}{a}.$$

Q15. Montrer que les intégrales généralisées $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}dt$ sont convergentes et que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}dt.$$

Dans ce qui suit, on considère une fonction continue $f : \mathbf{R}^+ \to \mathbf{C}$ telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ soit absolument convergente.

Q16. Montrer que la fonction

$$\mathcal{L}(f) : x \in \mathbf{R}^+ \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)\,e^{-xt}dt$$

est bien définie et continue sur $\mathbf{R}^+$.

Q17. On suppose de plus que la fonction f est bornée. Montrer que la fonction $\mathcal{L}(f)$ est de classe C^∞ sur $]0,+\infty[$ et que $\mathcal{L}(f)(x)$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

Q18. Soit $f : t \in \mathbf{R}^+ \mapsto \dfrac{1}{1+t^2}$.

1 . Montrer que la fonction $\mathcal{L}(f)$ est solution de l'équation différentielle

$$y'' + y = \frac{1}{x} \qquad \textbf{(E)}$$

sur $]0,+\infty[$.

2 . On cherche une solution particulière de (**E**) de la forme $x \mapsto \alpha(x)\cos(x) + \beta(x)\sin(x)$ où les fonctions α et β sont de classe C^2 et vérifient :

$$\forall x \in]0, +\infty[\quad \alpha'(x)\cos(x) + \beta'(x)\sin(x) = 0.$$

Montrer que l'on peut prendre $\alpha(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} f_1(t)\,dt$ et $\beta(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} f_2(t)\,dt$ où f_1 et f_2 sont des fonctions que l'on déterminera.

3 . En déduire que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{x+t}\,dt$ est une solution de l'équation (**E**) sur $]0, +\infty[$.

4 . Montrer qu'il existe $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ tel que :

$$\forall x \in]0, +\infty[\quad \mathcal{L}(f)(x) = a\cos x + b\sin x + \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{x+t}\,dt.$$

Q19. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{x+t}\,dt$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$ et en déduire que pour tout $x > 0$ on a :

$$\mathcal{L}(f)(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{x+t}\,dt.$$

Q20. Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin(t)}{x+t} - \frac{\sin(t)}{t}\right) dt$ tend vers 0 quand x tend vers 0^+. En déduire que :

$$\lim_{x\to 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{x+t}\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\,dt.$$

Q21. Déduire des questions précédentes que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}dt = \frac{\pi}{2}$.

Partie III - Phénomène de Gibbs

Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ la fonction 2π-périodique et impaire définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \in]0, \pi[\\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \text{ ou } x = \pi \end{cases} . \qquad \textbf{(E.1)}$$

On désigne par $(S_n)_{n\in\mathbf{N}}$ la suite de fonctions définie par :

$$\forall n \in \mathbf{N},\ \forall x \in \mathbf{R},\ S_n(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{n} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

Q22. En calculant la dérivée de S_n, montrer que :

$$\forall n \in \mathbf{N},\ \forall x \in [0, \pi],\ S_n(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{\sin(t)}dt.$$

Q23. Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbf{N}$, on a :

$$\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} = (-1)^{n+1}\int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}\,dt.$$

En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Q24. En déduire que $S_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$ tend vers 1 quand n tend vers l'infini.

Q25. Calculer $S_n(\pi - x)$ en fonction de $S_n(x)$. En utilisant le résultat de la **question Q12**, montrer que, pour tout $x \in]0, \pi/2]$, on a :

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x) = 1.$$

Q26. Déduire de ce qui précède que la suite $(S_n)_{n\in\mathbf{N}}$ converge simplement vers la fonction f définie par (**E.1**) sur $\mathbf{R}$.

Q27. Montrer que la suite de fonctions $(\varphi_n)_{n\geq 1}$ définie sur $[0, \pi]$ par

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2n}\dfrac{\sin(x)}{\sin\left(\frac{x}{2n}\right)} & \text{si} \quad x \in]0, \pi] \\ \\ 1 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$

converge simplement sur $[0, \pi]$ vers la fonction φ définie sur $[0, \pi]$ par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & \text{si} \quad x \in]0, \pi] \\ \\ 1 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}.$$

Q28. Montrer que φ est continue sur $[0, \pi/2]$ et en déduire que

$$\lim_{n\to+\infty} S_n\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{x}dx$$

puis que :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(f\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right) - S_n\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)\right) = \frac{2}{\pi}\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}dx.$$

Q29. Montrer que

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{x}dx = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

puis que :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(S_n\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right) - f\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)\right) = 2\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n+1)(2n+1)!} - 1.$$

Q30. Comparer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n+1)(2n+1)!} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{3} (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n+1)(2n+1)!},$$

et montrer que :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(S_n\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right) - f\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)\right) > 0.17\ .$$

En déduire que la suite de fonctions $(S_n)_{n\in\mathbf{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur $]0, \pi/2[$.

FIN

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Suites et séries de fonctions
- Intégrales dépendant d'un paramètre
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Équations différentielles linéaires
- Séries numériques et vectorielles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/psi