Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2000, filière TSI

Physique

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Problème 1 : oscillations au voisinage d'une bifurcation
- Problème 2, partie 1 : Michelson en lame d'air
- Problème 2, partie 2 : Michelson en coin d'air

Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.

Copie du sujet officiel dont l'en-tête du concours (année, filière, épreuve) a été retiré ; le contenu de l'énoncé est inchangé.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/tsi/2000/physique

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE-FILIÈRE TSI

PHYSIQUE

DURÉE : 4 heures

L'usage des calculatrices programmables et alphanumériques est autorisé sous réserve des dispositions définies dans la circulaire n' 99-018 du 01. 02.99.

Il est rappelé aux candidats qu'il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction des copies.

PROBLEME 1: MECANIQUE

L'objet de ce problème consiste à étudier les oscillations d'un système mécanique au voisinage d'une bifurcation (changement du nombre de positions d'équilibre, de la position d'équilibre stable...)

On s'intéresse au système mécanique suivant: un point matériel M de masse m est fixé à l'extrémité d'un ressort de longueur à vide 1. et de constante de raideur k. La masse peut coulisser sans frottement horizontalement sur une tige (figure 1). On repère la position de la masse ni sur cette tige par l'abscisse x dont l'axe est confondu avec la tige, et dont l'origine 0 est située sur la même verticale que le point d'attache R fixe du ressort.

La tige se trouve à une distance 1 du point R : OR=I.

On posera $\omega=(k/m)^{1/2}$




Figure 1

A. Positions d'équilibre

1) Initialement le point matériel M se trouve en 0 et OR=lo. Décrire qualitativement (aucun calcul n'est demandé) le nombre de positions d'équilibre et la stabilité de celles-ci suivant qu'on rapproche la tige du point R (c'est-à-dire 1<1,) ou qu'on éloigne la tige du point R (soit 1>1,).

2) On considère maintenant OR=l (quelconque). Déterminer l'énergie potentielle élastique $E_p(x)$ en fonction de k, I,, 1 et x. On prendra E_p (O)=O.

3) Expliquer dans le cas général où l'énergie potentielle E_p d'un point matériel de masse ni ne dépend que d'un seul paramètre (dans ce problème, il s'agit de x), quelles sont les conditions sur E_p en un point d'équilibre stable. On dessinera l'allure de E_p (x) pour un équilibre stable et un équilibre instable.

4) Déterminer en utilisant les questions 2 et 3, les positions d'équilibre x, de la masse m en distinguant les cas $1>1_o$ et $1<1_o$. Dans chaque cas, préciser si la position d'équilibre est stable ou non.

5) Tracer, sur un même graphe, x_e en fonction de la distance OR=I. On précisera sur le graphe la nature de l'équilibre (stabilité ou instabilité). Pouvez-vous justifier alors le nom donné à la bifurcation (existant en $1=1_o$) : bifurcation fourche.

6) On dit également de cette bifurcation qu'elle est à symétrie brisée: justifier cette propriété.

B. Pulsation autour d'une position d'équilibre stable

On cherche maintenant à déterminer les pulsations des oscillations autour des positions d'équilibre stable.

1) En écrivant le principe fondamental de la dynamique appliqué au point matériel de masse ni, montrer que la pulsation s'exprime sous la forme générale:

$$\omega^2=(1/m)(d^2E_p/dx^2)(x=x_e)$$

On pourra écrire la relation fondamentale de la dynamique dans le cas général où la force dérive d'un potentiel E_p en développant celle-ci à l'ordre 2 en $\varepsilon=x-x$, au voisinage proche de la position $x=x_e$ d'équilibre.

2) Pour le système étudié, exprimer maintenant ω^2 en fonction de k, m, 1 et $_{l0}$ .On distinguera les cas $1>1_0$ et $1<1_0$.

3) Tracer ω^2 en fonction de 1.

4) Montrer qu'au voisinage de $1=1_0$, on peut écrire la pulsation sous là forme:

$$1>l_0,: \quad \omega=a\,(1-1_0)^{\alpha}$$

$$1<1_0: \quad \omega=b\,(1_0-1)^{\alpha'}$$

Déterminer les exposants, dits critiques, α et α' ainsi que les coefficients a et b.

5) On s'intéresse au cas limite où $1=1_0$. On lâche la masse ni sans vitesse initiale, écartée d'une distance $x(O)=x_0$.

a. Montrer graphiquement que le mouvement est périodique.

b. Par une méthode énergétique, exprimer la vitesse de la masse en fonction de ω, x_0., k, m et l_0.

c. Exprimer la période des oscillations en fonction de. ω, x_0., l_0 et de l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1-u^4}}$$

dans l'hypothèse où x_o est très petit devant. l_0.

d. Peut-on dire que cet oscillateur est harmonique?

C. Discussion

1) Le point matériel M est également relié à un autre ressort identique au premier, fixé lui aussi sur l'axe Oy à une distance 1 de la tige mais symétriquement à R par rapport à l'axe Ox. Qu'est-ce qui change par rapport à l'étude précédente?

2) M n'est attaché qu'à un seul ressort, mais la tige Ox n'est pas tout à fait horizontale: elle est inclinée d'un petit angle 0. Y-a-t-il un terme nouveau dans l'énergie potentielle? Dessiner l'allure de $E_p(x)$ pour $1<1_0$ dans ce cas. Quelle est la conséquence principale sur les positions d'équilibre?

3) Proposer une démarche expérimentale pour déterminer les exposants critiques. Leur obtention vous semble-t-elle aisée?

PROBLEME 2: OPTIQUE

On cherche dans ce problème à étudier le passage d'une source ponctuelle à une source large, et notamment le problème de la localisation des franges dans le cas de l'interféromètre de Michelson dans les deux situations: en lame d'air et en coin d'air.

Aucune connaissance sur la théorie de la localisation des franges n'est nécessaire pour faire le problème.

Partie 1: Michelson en lame d'air




Figure 1: Interféromètre de Michelson en lame d'air

On considère un interféromètre de Michelson dont les miroirs M_1 et M_2 sont perpendiculaires. Les deux miroirs sont initialement à égale distance de l'ensemble séparatrice-compensatrice (Sp+Cp). L'interféromètre est éclairé par une source ponctuelle Σ monochromatique, de longueur d'onde λ. On place un écran (E) à la "sortie" de l'interféromètre, parallèle au miroir M_2,.

On déplace le miroir M_1 d'une distance e perpendiculairement à lui-même, selon l'axe des x. (Figure 1)

1) a. Montrer l'équivalence du Michelson dans cette configuration avec une lame d'air (Figure 2). [Les échelles de la figure 1 et de la figure 2 ne sont pas les mêmes.]. A quoi correspondent dans le schéma équivalent M_1' et S ? On appelle D la distance entre M_2 et l'écran E (dont on repère la position d'un point M par l'axe OX), et d la distance entre S et M_2

On suppose que D et d sont nettement plus grandes que e.




Figure 2: Equivalence en lame d'air

b. Faire un dessin de deux rayons différents issus de la source réelle S et interférant en un point M de (E) à partir de la Figure 1.

<u>Dans la suite de cette partie, on ne raisonnera plus qu'à partir de la lame d'air.</u>

2) On cherche à calculer la différence de marche entre les rayons issus de S (de la Figure 2) et qui interférent en un point M de (E) tel que OM=X, en se limitant aux rayons peu inclinés sur l'axe OS. Montrer que cette différence de marche est donnée par:

$$\delta = 2e\left(1 - X^2/(2(D+d)^2)\right)$$

Justifier que les franges sont des anneaux.

3) On suppose, pour simplifier, que $2e = p_o\lambda$ où p_o est un entier. Qu'observe-t-on en O? Lorsque l'on s'éloigne de O, on observe une alternance d'anneaux sombres et brillants. Quel est l'ordre d'interférence p correspondant à l'anneau brillant numéro m (que l'on exprimera en fonction de p_o et m)?

Exprimer le rayon X_m de cet anneau en fonction de D, d, λ, e et m. Calculer numériquement X_m, pour m variant de 0 à 5 (on présentera les résultats sous forme d'un tableau) pour e=l mm, D+d=1 m et λ=0.5 μm. Tracer X_m en fonction de m. Comment évolue la distance entre deux anneaux successifs?

4) On considère en plus de la source S, une autre source S' placée à une R de l'axe OS au dessus ou en dessous de S. S et S' émettent de façon incohérente à la même longueur d'onde λ. On cherche à savoir à quelle condition les interférences sont encore visibles et dans quelle partie de l'espace. On choisit le critère suivant (de façon un peu arbitraire): les interférences sont encore visibles si le décalage entre ces deux systèmes de franges est inférieur à 1/4 d'interfrange. Trouver une condition sur R pour que les m premiers anneaux soient visibles.

5) Montrer que si D tend vers l'infini, on peut remplacer la source ponctuelle du début par une source large (forme d'un disque de rayon R) sans changer l'allure de la figure d'interférences. Quel est l'intérêt d'utiliser une source étendue à la place d'une source ponctuelle? Comment fait-on pour observer des anneaux à l'infini? Faire un schéma en donnant un maximum d'informations sur les distances, propriétés et qualités des instruments d'optique...

6) On souhaite observer le plus grand nombre d'anneaux possible avec une source étendue: quelle condition cela impose-t-il sur l'angle maximal d'inclinaison des rayons issus de S? Comment dans la pratique réalise-t-on cette condition?

7)

Partie 2: Michelson en coin d'air

On règle maintenant l'interféromètre de Michelson, éclairé par une source ponctuelle Σ émettant à la longueur d'onde λ, avec les miroirs M_1 et M_2 ne faisant plus un angle droit mais un angle $\pi/2-\alpha$ où α est angle très faible (Figure 3).




Figure 3: Interféromètre de Michelson en coin d'air

1) Montrer que le système considéré est équivalent à un coin d'air (Figure 4). Faire un dessin avec deux rayons issus de E interférant en un point M de l'écran (E) disposé perpendiculairement à M_1, à partir de la Figure 3.

<u>Dans la suite on ne raisonnera plus que sur le coin d'air.</u>




Figure 4: Coin d'air

La source S (qui a même signification que dans la partie 1) est repérée par ses coordonnées (x_o, y_o, z_o); le point M par ses coordonnées notées (x, y, z). Le repère Oxyz est direct.

On fera les hypothèses suivantes: (x est petit (on assimilera donc tanx et sinx à α et on ne gardera pas les termes en α d'ordre supérieur ou égal à deux), et x, x_o, y, y_o sont très inférieurs à $(z+z_o)$.

2) Montrer que les images S_1 et S_2 de S données respectivement par M_1' et M_2 ont pour coordonnées (dans le cadre de nos hypothèses):

$$S_1 (x_0, y_0, -z_0) \text{ et } S_2 (x_0-2 z_0\alpha, y_0, - z_0 -2 x_0\alpha)$$

3) Montrer que la différence de chemin optique entre deux rayons qui interfèrent en M s'écrit:

$$\delta=S_2M-S_1M=2\alpha(x_0z+xz_0)/(z+z_0)$$

4) On observe les interférences sur un écran (E) parallèle au miroir M_1' à la côte z. Quelle est l'allure des franges? Que vaut l'interfrange? Donner la position de la frange centrale x, définie par un ordre d'interférences $p=\delta/\lambda$ nul. Dans quel cas l'interfrange est-elle indépendante de la position de l'écran? Quelle est la valeur de l'interfrange dans ce cas? Pouvait-on prévoir ce résultat?

1) Montrer que si l'on remplace la source ponctuelle par une fente allongée parallèle à l'arête du coin, cela ne modifie pas l'allure des franges précédentes.

6) On déplace maintenant cette fente-source parallèlement à elle-même, selon l'axe des x. Est-ce que le système de franges se déplace aussi? En déduire la largeur maximale que peut avoir une fente-source pour que les interférences demeurent visibles dans le plan de E en utilisant le même critère qu'à la question 4 de la partie 1. On donnera le résultat en fonction de λ,α, z et z_0.

7) En déduire que si (E) est placé au voisinage du coin d'air, on peut observer les franges même avec une source large.

8) Comment en pratique observe-t-on les interférences en coin d'air? Faire un schéma et préciser les différentes valeurs entrant en jeu.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de TSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Équations différentielles linéaires du second ordre
- Description et paramétrage du mouvement d'un point
- Superposition d'ondes lumineuses, trous d'Young et réseau
- Modèle scalaire des ondes lumineuses

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/tsi