Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2014, filière TSI

Mathématiques 2

Durée : 3 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : calcul de la somme des 1/k^2
- Partie II : régularité de f(t) = -ln(1 - t)/t
- Partie III : développement en série entière du dilogarithme
- Partie IV : une équation différentielle

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/tsi/2014/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE TSI

MATHEMATIQUES 2

Durée : 3 heures

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont interdites

La fonction *Dilogarithme*

Dans tout le problème, ln désigne le logarithme népérien.
On considère la fonction f définie sur $]-\infty, 1[$ par :

$$f(t) = \begin{cases} -\dfrac{\ln(1-t)}{t} & t \in]-\infty, 0[\cup]0, 1[\\ \\ 1 & t = 0 \end{cases}.$$

Dans ce problème, on s'intéresse à la fonction *Dilogarithme* définie pour tout x de $[-1, 1[$ par :

$$L(x) = -\int_0^x \frac{\ln(1-t)}{t}\ \mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t.$$

Dans la partie I, on calcule $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$. La partie II est consacrée à une étude de la régularité de f. Dans la partie III, on détermine le développement en série entière de L et on déduit ensuite le prolongé de L en 1. Dans la partie IV, on résout une équation différentielle.

Les différentes parties de ce problème ont un lien entre elles, mais peuvent être traitées séparément.

I. Calcul de $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$

Soit $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, périodique de période 2π, telle que :

$$\forall x \in]-\pi, \pi], \quad g(x) = x.$$

Soit $S : x \longmapsto \dfrac{1}{2}a_0 + \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ la somme de la série de Fourier de g. On admet provisoirement l'existence de cette somme, existence qui sera démontrée à la question 4.

1. Représenter graphiquement la restriction de la fonction g à l'intervalle $]-3\pi, 3\pi]$.
2. Calculer pour tout n de $\mathbb{N}$, la valeur de a_n.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = (-1)^{n-1}\dfrac{2}{n}$.
4. Pour quelles valeurs de x, a-t-on l'égalité $S(x) = g(x)$? On précisera le théorème utilisé, et notamment ses hypothèses.
5. En appliquant avec soin l'égalité de Parseval, en déduire que $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

II. Régularité de la fonction f

1. Donner le développement limité de $x \longmapsto \ln(1-x)$ au voisinage de 0 à l'ordre 2.
2. En déduire que f est continue en 0.
3. f est-elle dérivable en 0 ? Si oui, préciser le nombre dérivé $f'(0)$.
4. Calculer pour tout x de $]-\infty, 0[\cup]0, 1[$, $f'(x)$.
5. Prouver que la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\infty, 1[$.
   (On pourra à nouveau utiliser la question 1. de cette partie)

III. Développement en série entière de L

On rappelle la fonction Dilogarithme définie pour tout x de $[-1,1[$ par :

$$L(x) = \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t$$

où la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1[$ (d'après la partie II).

1. Dérivée de L.
   1.a. Vérifier que la fonction L est bien définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-1,1[$.
   1.b. Déterminer pour tout x de $[-1,1[$, $L'(x)$.
2. Développement en série entière de f.
   2.a. Déterminer le développement en série entière en 0 de la fonction $x \longmapsto -\ln(1-x)$.
   2.b. En déduire le développement en série entière de la fonction f sur $]-1,1[$.
3. Prolongement par continuité de L en 1.
   3.a. Montrer que $L(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k^2}$ pour tout $x \in]-1,1[$. Rappeler le théorème utilisé.

   On rappelle le théorème radial d'Abel :
   Soit une série entière de coefficients (a_n), de rayon non nul R et de somme S.
   On suppose que la série converge en un point x_0 tel que $|x_0| = R$. Alors :

   - si $x_0 = -R$, alors $\displaystyle\lim_{x\to(-R)^+} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,(-R)^n$,
   - si $x_0 = R$, alors $\displaystyle\lim_{x\to R^-} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$.

   3.b. Vérifier que le développement de la question précédente est encore valable en $x = -1$.
   3.c. Montrer que L admet un prolongement par continuité en 1.

   On note désormais ce prolongement $L(1) = \displaystyle\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} L(x)$.

   3.d. En déduire que l'intégrale impropre $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t}\ \mathrm{d}t$ converge et que :

$$-\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t}\ \mathrm{d}t = L(1) = \frac{\pi^2}{6}.$$

4. Application 1.

   On considère l'intégrale impropre $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1}\ \mathrm{d}x$.

   4.a. Montrer que J converge.
   4.b. Calculer en fonction de π la valeur de J.
   (On peut utiliser le changement de variable $t = 1 - e^{-x}$).
5. Application 2.
   5.a. Montrer que pour tout $x \in [-1,1]$, $L(x) + L(-x) = \dfrac{1}{2}L(x^2)$.
   (On peut par exemple dériver les deux membres de l'égalité).
   5.b. En déduire en fonction de π la valeur de $L(-1)$.

IV. Etude d'une équation différentielle

On se propose de résoudre dans $[-1, 1[$ l'équation différentielle $\mathcal{E}$:

$$xy'' + y' = \frac{1}{1-x}$$

où y est une fonction réelle de la variable x.
On considère sur $[-1, 0[\cup]0, 1[$ l'équation différentielle $\mathcal{E}'$:

$$xz' + z = \frac{1}{1-x}$$

où z est une fonction réelle de la variable x.
K désigne un des deux intervalles $[-1, 0[$ ou $]0, 1[$.

1.

1.a. Donner la solution générale de l'équation homogène associée à $\mathcal{E}'$ sur K.

1.b. Démontrer que les solutions de $\mathcal{E}'$ sur l'intervalle K sont les fonctions z de la forme : $x \longmapsto z(x) = f(x) + \dfrac{A}{x}$ où A est une constante réelle.

2. En déduire que les solutions de $\mathcal{E}$ sur l'intervalle K sont les fonctions y de la forme : $x \longmapsto y(x) = L(x) + A \ln|x| + B$ où A et B sont des constantes réelles.

3. Soit y une solution éventuelle de l'équation $\mathcal{E}$ sur $[-1, 1[$.

3.a. Déterminer l'expression explicite de y sur $[-1, 0[$ et sur $]0, 1[$.

3.b. En exprimant la continuité et la dérivabilité de y en 0, déterminer les solutions éventuelles de $\mathcal{E}$ sur $[-1, 1[$.

3.c. Vérifier que les fonctions ainsi déterminées conviennent.

Fin de l'énoncé

IMPRIMERIE NATIONALE – 14 1324 – D'après documents fournis

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de TSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Séries de Fourier
- Séries numériques et vectorielles
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Dérivabilité et convexité
- Limites et continuité
- Séries entières
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Équations différentielles linéaires

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/tsi