Concours Centrale-Supélec, France

Session 2007, filière MP

Mathématiques 2

Ce que traite le sujet

- Partie I : cas d'un hyperplan de L(E)
- Partie II : cas où dim E = 3

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/mp/2007/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Concours Centrale - Supélec 2007

Épreuve : MATHÉMATIQUES II — Filière MP

Dans tout ce problème E est un espace euclidien de dimension $n \geq 1$. Les vecteurs de E sont représentés par des lettres surmontées de flèches et le produit scalaire de deux vecteurs $\overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{y}$ de E est noté $(\overrightarrow{x}|\overrightarrow{y})$. L'orthogonal d'un sous-espace F de E est noté F°. On note a^* l'adjoint de $a \in \mathcal{L}(E)$ pour la structure euclidienne définie par le produit scalaire $(\ |\ )$ et ab le composé de deux endomorphismes a et b de E.

Le sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ constitué des endomorphismes symétriques est noté $\mathcal{S}(E)$. On appelle endomorphisme antisymétrique un endomorphisme $a \in \mathcal{L}(E)$ tel que $a^* = -a$ et on note $\mathcal{A}(E)$ le sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ constitué par les endomorphismes antisymétriques. L'ensemble des endomorphismes symétriques positifs de E est noté $\mathcal{S}^+(E)$.

On désigne par $\mathrm{O}(E)$ l'ensemble des automorphismes orthogonaux de E et $\mathrm{O}^+(E)$ l'ensemble de ceux dont le déterminant est positif.

L'objectif de ce problème est de prouver que certains sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ contiennent des automorphismes orthogonaux. Les deux parties du problème sont indépendantes nonobstant la question I.B.2.

Partie I - Cas d'un hyperplan de $\mathcal{L}(E)$

I.A -

I.A.1) Soit $a \in \mathcal{L}(E)$ et $(e) = (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \ldots, \overrightarrow{e_n})$ une base orthonormée de E.

Prouver que

$$\mathrm{Tr}\, a = \sum_{i=1}^{n} (\overrightarrow{e_i}|a(\overrightarrow{e_i}))$$

I.A.2) Soient a et b deux endomorphismes de E.

On pose $\langle\langle a, b\rangle\rangle = \mathrm{Tr}(a^*b)$,

montrer qu'on définit ainsi un produit scalaire sur $\mathcal{L}(E)$. L'orthogonal, pour ce produit scalaire, d'un sous-espace $\mathcal{E} \subset \mathcal{L}(E)$ sera noté $\mathcal{E}^\perp$.

I.A.3) Montrer que les sous-espaces $\mathcal{S}(E)$ et $\mathcal{A}(E)$ sont des supplémentaires orthogonaux de $\mathcal{L}(E)$ pour $\langle\langle\ ,\ \rangle\rangle$.

I.B -

I.B.1) Soit $a \in \mathcal{L}(E)$ de rang $r \geq 1$.

a) Montrer que $\mathrm{Ker}\, a^*a = \mathrm{Ker}\, a$ et que $\mathrm{rg}\, a^*a = \mathrm{rg}\, a$.

b) Montrer que a^*a possède au moins une valeur propre non nulle.

c) Soit $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s\}$ l'ensemble des valeurs propres non nulles de a^*a. En notant $E(\lambda)$ le sous-espace propre de a^*a associé à la valeur propre λ, montrer que :

$$\mathrm{Im}\, a^* = \mathrm{Im}\, a^*a = \bigoplus_{i=1}^{s} E(\lambda_i)$$

d) Prouver l'existence d'une base orthonormée $(e) = (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \ldots, \overrightarrow{e_n})$ de E et de scalaires μ_1, μ_2,...,μ_n avec $\mu_i \neq 0$ pour $i \leq r$ tels que $a^*a(\overrightarrow{e_i}) = \mu_i^2 \overrightarrow{e_i}$ pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Pour toute base orthonormée (e) vérifiant ces propriétés, que valent les μ_i si $i > r$?

e) La base (e) étant choisie comme dans la question précédente, prouver l'existence d'une base orthonormée $(f) = \left(\overrightarrow{f_1}, \overrightarrow{f_2}, \ldots, \overrightarrow{f_n}\right)$ telle que $a(\overrightarrow{e_i}) = \mu_i \overrightarrow{f_i}$ pour tout i.

I.B.2) Soit $a \in \mathcal{L}(E)$, $a \neq 0$, déduire de la question précédente l'existence de $u \in \mathrm{O}(E)$ tel que $ua \in \mathcal{S}^+(E)$, et $Tr(ua) > 0$.

I.C - Soit $\mathcal{H}$ un hyperplan de $\mathcal{L}(E)$ et a un élément non nul de $\mathcal{H}^\perp$.

I.C.1) La base $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \ldots, \overrightarrow{e_n})$ de E étant toujours choisie comme dans la question I.B.1.d, prouver l'existence de $h \in \mathrm{O}(E)$ tel que, pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, $ha(\overrightarrow{e_i}) \in \mathrm{Vect}(\overrightarrow{e_i})^\circ$.

I.C.2) Montrer que $\mathcal{H}$ contient au moins un automorphisme orthogonal.

Partie II - Cas où $\dim E = 3$

Dans toute cette partie l'espace euclidien E est de dimension 3 et orienté. On se propose de prouver que tout sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ de dimension 7 contient au moins une rotation.

II.A - Si $\overrightarrow{k} \in E$ est un vecteur unitaire et si $\theta \in \mathbf{R}$, on note $p_{\overrightarrow{k}}$ le projecteur orthogonal d'image $\mathrm{Vect}(\overrightarrow{k})$, $\omega_{\overrightarrow{k}}$ l'endomorphisme $\overrightarrow{x} \mapsto \overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{x}$ et $r_{\theta,\overrightarrow{k}}$ la rotation d'angle θ autour de $\overrightarrow{k}$.

- version du 14 mars 2007 11h49

Soit $a \in \mathcal{L}(E)$, $\overrightarrow{k}$ un vecteur unitaire et θ un réel.

II.A.1) Exprimer simplement le produit scalaire $\langle\langle a, p_{\overrightarrow{k}}\rangle\rangle$ à l'aide du produit scalaire de deux vecteurs de E.

II.A.2) Exprimer simplement $r_{\theta,\overrightarrow{k}}$ à l'aide de $p_{\overrightarrow{k}}$ et de $\omega_{\overrightarrow{k}}$. En déduire la relation :

$$\left\langle\left\langle a, r_{\theta,\overrightarrow{k}}\right\rangle\right\rangle = \cos\theta\,\mathrm{Tr}(a) + (1-\cos\theta)\left(\overrightarrow{k}\,|a(\overrightarrow{k})\right) + \sin\theta\,\langle\langle a, \omega_{\overrightarrow{k}}\rangle\rangle \qquad (1)$$

II.A.3) Que devient cette relation (1) lorsque $a \in \mathcal{S}(E)$, lorsque $a \in \mathcal{A}(E)$?

II.B - Dans cette section $s \in \mathcal{S}^+(E)$ est un endomorphisme symétrique positif de rang ≤ 2 et de trace égale à 1 et ν est un endomorphisme de E non nul mais de trace nulle. On pose $\mathcal{V} = \mathrm{Vect}(s,\nu)^{\perp}$ et on veut montrer que $\mathcal{V} \cap \mathrm{O}^+(E) \neq \emptyset$.

II.B.1) Quelle est la dimension de $\mathcal{V}$?

II.B.2) Soit $(e) = (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$ une base orthonormée de E. Pour $\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) \in \{-1,1\}^3$, on note $\overrightarrow{x_\epsilon}$ le vecteur $\dfrac{\epsilon_1\overrightarrow{e_1} + \epsilon_2\overrightarrow{e_2} + \epsilon_3\overrightarrow{e_3}}{\sqrt{3}}$.

Prouver l'identité : $\sum_{\epsilon\in\{-1,1\}^3}(\overrightarrow{x_\epsilon}\,|s(\overrightarrow{x_\epsilon})) = \frac{8}{3}$.

II.B.3) Dans cette question seulement, on rajoute l'hypothèse ν symétrique.

a) Prouver l'existence d'une base (e) telle que $(\overrightarrow{x_\epsilon}\,|\nu(\overrightarrow{x_\epsilon})) = 0$ pour tout $\epsilon \in \{-1,1\}^3$.

b) Démontrer l'existence d'un vecteur $\overrightarrow{k}$ unitaire vérifiant :

$$0 \leq \left(\overrightarrow{k}\,|s(\overrightarrow{k})\right) \leq \tfrac{1}{3} \text{ et } \left(\overrightarrow{k}\,|\nu(\overrightarrow{k})\right) = 0$$

c) Établir l'existence de $\theta \in [\pi/2, \pi[$ tel que $r_{\theta,\overrightarrow{k}} \in \mathcal{V}$.

II.B.4) On décompose maintenant ν sous la forme $\nu_1 + a$ où ν_1 est symétrique et a antisymétrique. On choisit $\overrightarrow{k}_1$ unitaire tel que :

$$0 \leq \left(\overrightarrow{k}_1|s(\overrightarrow{k}_1)\right) \leq \tfrac{1}{3} \text{ et } \left(\overrightarrow{k}_1|\nu_1(\overrightarrow{k}_1)\right) = 0$$

a) Dans la suite on posera, pour tout réel x :

$\mathrm{sgn}(x) = 1$ si $x \geq 0$, -1 sinon.

On note $(e) = (\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$ une base orthonormée de vecteurs propres de s et l'on pose :

$$\overrightarrow{k}_i = a_i\overrightarrow{e_1} + b_i\overrightarrow{e_2} + c_i\overrightarrow{e_3} \text{ pour } i = 1,\, 2.$$

Démontrer l'existence d'un vecteur unitaire $\overrightarrow{k}_2$ tel que $r_{\pi,\overrightarrow{k}_2}$ soit orthogonale à s pour $\langle\langle\ ,\ \rangle\rangle$ et que les composantes de $\overrightarrow{k}_2$ dans une base de diagonalisation de s soient de mêmes signes que celles de $\overrightarrow{k}_1$.

b) Justifier l'existence d'une fonction $t \mapsto \overrightarrow{k}(t)$ de $[0,1]$ dans E et d'une fonction $t \mapsto \theta(t)$ de $[0,1]$ dans $\mathbf{R}$ vérifiant les propriétés suivantes :

$\overrightarrow{k}(t) = a(t)\overrightarrow{e_1} + b(t)\overrightarrow{e_2} + c(t)\overrightarrow{e_3}$ avec :

$a(t) = \mathrm{sgn}(a_1)\sqrt{2ta_2^2 + (1-2t)a_1^2}$ si $0 \leq t \leq 1/2$, $a(1-t)$ si $1/2 < t \leq 1$

$b(t) = \mathrm{sgn}(b_1)\sqrt{2tb_2^2 + (1-2t)b_1^2}$ si $0 \leq t \leq 1/2$, $b(1-t)$ si $1/2 < t \leq 1$

$c(t) = \mathrm{sgn}(c_1)\sqrt{2tc_2^2 + (1-2t)c_1^2}$ si $0 \leq t \leq 1/2$, $c(1-t)$ si $1/2 < t \leq 1$

$$\theta(t) = \mathrm{Arccos}\,\frac{\left(\overrightarrow{k}(t)|s(\overrightarrow{k}(t))\right)}{\left(\overrightarrow{k}(t)|s(\overrightarrow{k}(t))\right) - 1} \text{ si } 0 \leq t \leq 1/2,\ 2\pi - \theta(1-t) \text{ si } 1/2 < t \leq 1$$

c) Vérifier que $\overrightarrow{k}(t)$ est unitaire et que $\rho(t) = r_{\theta(t),\overrightarrow{k}(t)}$, est orthogonale à s pour $\langle\langle\ ,\ \rangle\rangle$.

d) Montrer que la fonction $t \mapsto \langle\langle\rho(t), \nu\rangle\rangle$ de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est continue. Étudier les signes de $\langle\langle\rho(0), \nu\rangle\rangle$ et de $\langle\langle\rho(1), \nu\rangle\rangle$ et prouver qu'existe t tel que $\rho(t) \in \mathcal{V}$.

II.C - Cas général

II.C.1) En utilisant le résultat de la question I.B.2, prouver que tout sous espace vectoriel de dimension 7 de $\mathcal{L}(E)$ contient au moins un automorphisme orthogonal.

II.C.2) Un sous-espace vectoriel de dimension 6 de $\mathcal{L}(E)$ contient-il toujours un automorphisme de E ?

• • • FIN • • •

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Espaces préhilbertiens réels et endomorphismes des espaces euclidiens
- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Limites et continuité

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/mp