Concours Centrale-Supélec, France

Session 2024, filière MPI

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : inégalité de Knopp
- Partie II : inégalité de Carleman
- Partie III : inégalité de Carleman-Yang

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/mpi/2024/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Mathématiques 1

MP, MPI

4 heures Calculatrice autorisée

2024

Inégalité de Carleman

On s'intéresse dans ce problème à une inégalité établie par Torsten Carleman : si $(a_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de réels strictement positifs telle que $\sum a_n$ converge, alors la série de terme général $\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n}$ converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leqslant \mathrm{e}\sum_{n=1}^{+\infty} a_n.$$

Le problème est constitué de trois parties largement indépendantes. La première partie commence en démontrant un analogue intégral de cette inégalité : l'inégalité de Knopp. La deuxième partie s'intéresse à la démonstration originale de l'inégalité de Carleman, utilisant du calcul différentiel. Enfin, la troisième partie étudie l'inégalité de Carleman-Yang, qui est un raffinement de l'inégalité de Carleman.

I Inégalité de Knopp

Dans cette partie, on démontre l'inégalité de Knopp, souvent présentée comme analogue continu de l'inégalité de Carleman (on justifie cette appellation en fin de partie).

I.A – Deux inégalités intégrales

I.A.1) Inégalité intégrale de Jensen

Q 1. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux à valeurs dans un intervalle J. Soit φ une fonction continue et convexe sur J. Démontrer que

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi\circ f(t)\,\mathrm{d}t.$$

On pourra utiliser des sommes de Riemann.

I.A.2) Une autre inégalité intégrale

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, une fonction continue par morceaux, strictement positive et intégrable.
Pour tout $x > 0$, on pose

$$g(x) = \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad h(x) = \frac{1}{x}g(x) = \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

Q 2. Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers 0.

Q 3. Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Notant $\mathbb{1}_{[0,x]}$ la fonction indicatrice de $[0,x]$, on pourra remarquer que $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{x}tf(t)\mathbb{1}_{[0,x]}(t)\,\mathrm{d}t$.

Q 4. En déduire que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} h(x)\,\mathrm{d}x$ converge et que

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} h(x)\,\mathrm{d}x.$$

On pourra utiliser une intégration par parties.

I.B – Démonstration de l'inégalité de Knopp

Soit f une fonction continue par morceaux, strictement positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Q 5. Démontrer que, pour tout $x > 0$,

BY-NC-SA

$$\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,\mathrm{d}t\right) \leqslant \frac{\mathrm{e}}{x^2}\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

On pourra remarquer que $\ln(f(t)) = \ln(tf(t)) - \ln(t)$.

Q 6. En déduire que $x \mapsto \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,\mathrm{d}t\right)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que

$$\int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{e}\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

I.C – Application à l'inégalité de Carleman

On suppose dans cette sous-partie que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante de réels strictement positifs. On note f la fonction en escalier qui, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, est égale à a_k sur l'intervalle $[k-1, k[$.

Q 7. Soit k dans $\mathbb{N}^*$. Démontrer que la fonction v_k définie sur $[k-1, k]$ par

$$\begin{cases} v_k(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\sum_{i=1}^{k-1}\ln(a_i) + \dfrac{1}{x}(x-k+1)\ln(a_k) & \text{si } k \geqslant 2 \\ v_1(x) = \ln(a_1) \end{cases}$$

est minimale pour $x = k$.

Q 8. Démontrer que, pour tout k dans $\mathbb{N}^*$,

$$\int_{k-1}^{k} \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \geqslant \exp\left(\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\ln(a_i)\right).$$

On pourra utiliser la question précédente.

Q 9. En déduire l'inégalité de Carleman dans le cas où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante.

Q 10. Expliquer comment on peut retirer l'hypothèse de décroissance.

II Inégalité de Carleman

On démontre dans cette partie l'inégalité de Carleman d'une manière indépendante de la partie I.
La sous-partie II.A établit l'inégalité arithmético-géométrique avec des méthodes de calcul différentiel qui permettent de se familiariser avec celles qui seront utilisées dans la sous-partie II.B pour démontrer l'inégalité de Carleman.
La sous-partie II.B est indépendante de II.A. L'inégalité arithmético-géométrique sera utilisée dans la partie III.
Soit n dans $\mathbb{N}^*$. On note U_n l'ouvert $(\mathbb{R}_+^*)^n$. Son adhérence, notée $\overline{U_n}$, est $(\mathbb{R}_+)^n$.

II.A – Inégalité arithmético-géométrique

Soit $s > 0$. On définit les fonctions f et g_s sur $\overline{U_n}$ en posant, pour tout $x = (x_1, ..., x_n) \in \overline{U_n}$,

$$f(x) = \prod_{k=1}^{n} x_k \qquad \text{et} \qquad g_s(x) = \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) - s.$$

On note X_s le sous-ensemble de $\overline{U_n}$ constitué des zéros de g_s : $X_s = \{x \in \overline{U_n} \mid g_s(x) = 0\}$.

Q 11. On admet que f et g_s sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_n. Donner l'expression de leur gradient en un point $x = (x_1, ..., x_n)$ de U_n.

Q 12. Démontrer que la restriction de f à X_s admet un maximum sur X_s et que ce maximum est en fait atteint sur $X_s \cap U_n$.

On pourra vérifier que f est strictement positive en certains points de $X_s \cap U_n$.

On note $a = (a_1, ..., a_n)$ un élément de $X_s \cap U_n$ en lequel la restriction de f à X_s atteint son maximum.

Q 13. Démontrer qu'il existe un réel $\lambda > 0$ tel que, pour tout k dans $[\![1, n]\!]$, $a_k = \dfrac{f(a)}{\lambda}$.

Q 14. Démontrer alors que, pour tout $(x_1, ..., x_n) \in U_n \cap X_s$, $\left(\displaystyle\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ et en déduire l'inégalité arithmético-géométrique

BY-NC-SA

$$\forall (x_1,...,x_n)\in(\mathbb{R}_+)^n,\qquad \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n}\leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i.$$

II.B – Démonstration de l'inégalité de Carleman

On considère l'application F_n de $\overline{U_n}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$\forall (x_1,...,x_n)\in\overline{U_n},\qquad F_n(x_1,...,x_n)=x_1+(x_1x_2)^{1/2}+(x_1x_2x_3)^{1/3}+\cdots+(x_1\cdots x_n)^{1/n}.$$

On note h_n l'application de $\overline{U_n}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$\forall (x_1,...,x_n)\in\overline{U_n},\qquad h_n(x_1,...,x_n)=x_1+\cdots+x_n-1.$$

On admet que F_n et h_n sont toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_n.

On note H_n l'ensemble $H_n=\{(x_1,...,x_n)\in\mathbb{R}^n \mid x_1+\cdots+x_n=1\}$.

Q 15. Déterminer le gradient de F_n et le gradient de h_n en tout point de U_n.

Q 16. Démontrer que la restriction de F_n à $\overline{U_n}\cap H_n$ admet un maximum.

On admet que le maximum de F_n est en fait atteint sur $U_n\cap H_n$.

On note M_n le maximum de F_n sur $\overline{U_n}\cap H_n$ et on note $(a_1,...,a_n)$ un point de $U_n\cap H_n$ en lequel il est atteint.

Pour k entre 1 et n, on note $\gamma_k=(a_1a_2\cdots a_k)^{1/k}$.

Q 17. Démontrer qu'il existe un réel $\lambda>0$ tel que

$$\begin{cases}\gamma_1+\dfrac{\gamma_2}{2}+\cdots+\dfrac{\gamma_n}{n}=\lambda a_1\\ \qquad\dfrac{\gamma_2}{2}+\cdots+\dfrac{\gamma_n}{n}=\lambda a_2\\ \qquad\qquad\vdots\\ \qquad\qquad\dfrac{\gamma_n}{n}=\lambda a_n\\ a_1+a_2+\cdots+a_n=1\end{cases}$$

Q 18. En déduire que :

a) $\lambda=\gamma_1+\gamma_2+\cdots+\gamma_n=M_n$;

b) pour tout k dans $[\![1,n]\!]$, $\gamma_k=\lambda\omega_k a_k$, où

$$\begin{cases}\omega_k=k\left(1-\dfrac{a_{k+1}}{a_k}\right)\text{ si }k\in[\![1,n-1]\!]\\ \omega_n=n\end{cases}$$

L'objectif des trois questions suivantes est de démontrer que $\lambda\leqslant \mathrm{e}$. On suppose par l'absurde que $\lambda>\mathrm{e}$.

Q 19. Vérifier que, pour tout k dans $\mathbb{N}$, $\dfrac{1}{\mathrm{e}}\leqslant\left(\dfrac{k+1}{k+2}\right)^{k+1}$.

Q 20. Démontrer que $\omega_1\leqslant\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ et que, pour tout k dans $[\![1,n]\!]$, $\omega_k\leqslant\dfrac{k}{k+1}$.

On pourra démontrer, pour $k\in[\![1,n-1]\!]$, que $\omega_{k+1}^{k+1}=\dfrac{1}{\lambda}\omega_k^k\left(1-\dfrac{\omega_k}{k}\right)^{-k}$.

Q 21. Aboutir à une contradiction sur ω_n. En déduire que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, pour tout $(x_1,...,x_n)\in(\mathbb{R}_+^*)^n$ tels que $x_1+\cdots+x_n=1$,

$$\sum_{k=1}^n(x_1x_2\cdots x_k)^{1/k}\leqslant\mathrm{e}.$$

Q 22. En déduire l'inégalité de Carleman.

III Inégalité de Carleman-Yang

Le but de cette dernière partie est d'établir l'inégalité de Carleman-Yang, qui est un raffinement de l'inégalité de Carleman.

III.A – Un développement en série entière

Soit φ la fonction définie par

$$\forall t\in\,]-1,1[\,\setminus\{0\},\qquad \varphi(t)=(1-t)^{1-1/t}.\tag{III.1}$$

BY-NC-SA

On définit aussi la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$\begin{cases} b_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad b_n = -\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k+1} b_{n-k} \end{cases}$$

Q 23. Justifier que φ est prolongeable par continuité en 0 et préciser la valeur de son prolongement en 0. On notera toujours φ ce prolongement.

Q 24. Démontrer que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $|b_n| \leqslant 1$. En déduire une inégalité sur le rayon de convergence de la série entière $\displaystyle\sum_{k\geqslant 0} b_k t^k$.

Q 25. Démontrer que, pour tout t dans $]-1,1[$, $\varphi'(t) = \varphi(t)\psi(t)$, où

$$\forall t \in]-1,1[, \qquad \psi(t) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+2} t^n, \tag{III.2}$$

puis que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$,

$$\varphi^{(n)}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!}{k+2} \binom{n-1}{k} \varphi^{(n-k-1)}(0).$$

Q 26. Conclure alors que

$$\forall t \in]-1,1[, \qquad \varphi(t) = \mathrm{e}\left(1 - \sum_{k=1}^{+\infty} b_k t^k\right). \tag{III.3}$$

III.B – Démonstration de l'inégalité de Carleman-Yang

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ deux suites de réels strictement positifs.

Q 27. Démontrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} c_k a_k \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{n} \left(\prod_{i=1}^{n} c_i\right)^{-1/n}.$$

Q 28. En considérant $c_n = \dfrac{(n+1)^n}{n^{n-1}}$, en déduire l'inégalité de Carleman-Yang :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leqslant \mathrm{e} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{b_k}{(n+1)^k}\right) a_n.$$

Q 29. Démontrer que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $b_n \geqslant 0$. En quoi l'inégalité précédente est-elle un raffinement de l'inégalité de Carleman ?

• • • FIN • • •

BY-NC-SA

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MPI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Dérivabilité et convexité
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Séries numériques et vectorielles
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Topologie des espaces vectoriels normés

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/mpi