Concours Centrale-Supélec, France

Session 2017, filière PC

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : nombre de partitions en k parties
- Partie II : nombres de Bell
- Partie III : une suite de polynômes
- Partie IV : fonctions génératrices
- Partie V : somme de puissances

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/pc/2017/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Mathématiques 1

PC

2017

4 heures Calculatrices autorisées

Soit E un ensemble non vide.

On appelle *partition* de E tout ensemble $\mathcal{U} = \{A_1, ..., A_k\}$ de parties de E tel que

- chaque A_i, pour $i \in [\![1, k]\!]$ est une partie *non vide* de E ;
- les parties $A_1, ..., A_k$ sont *deux à deux disjointes*, c'est-à-dire que pour tous $i \neq j$ entre 1 et k, $A_i \cap A_j = \varnothing$;
- la réunion des A_i forme E tout entier : $E = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$.

Si $\mathcal{U}$ une partition de E et si k est le nombre d'éléments de $\mathcal{U}$, on dit aussi que $\mathcal{U}$ une *partition de E en k parties*.

I Nombre de partitions en k parties

I.A – Soit k et n deux entiers strictement positifs. Montrer qu'il n'existe qu'un nombre fini de partitions de l'ensemble $[\![1, n]\!]$ en k parties.

Dans tout le problème, pour tout couple (n, k) d'entiers strictement positifs, on note $S(n, k)$ le nombre de partitions de l'ensemble $[\![1, n]\!]$ en k parties.

On pose de plus $S(0, 0) = 1$ et, pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^{*2}$, $S(n, 0) = S(0, k) = 0$.

I.B – Exprimer $S(n, k)$ en fonction de n ou de k dans les cas suivants :

I.B.1) $k > n$;

I.B.2) $k = 1$.

I.C – Montrer que pour tous k et n entiers strictement positifs, on a

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$$

On pourra distinguer les partitions de $[\![1, n]\!]$ selon qu'elles contiennent ou non le singleton $\{n\}$.

I.D –

I.D.1) Rédiger une fonction Python récursive permettant de calculer le nombre $S(n, k)$, par application directe de la formule établie à la question I.C.

I.D.2) Montrer que, pour $n \geqslant 1$, le calcul de $S(n, k)$ par cette fonction récursive nécessite au moins $\binom{n}{k}$ opérations (sommes ou produits).

II Nombres de Bell

Dans toute la suite, on pose pour tout entier $n \geqslant 0$,

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n, k)$$

II.A – Montrer que pour $n \geqslant 1$, B_n est égal au nombre total de partitions de l'ensemble $[\![1, n]\!]$.

II.B – Démontrer la formule

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$$

II.C – Montrer que la suite $\left(\frac{B_n}{n!}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée par 1.

II.D – En déduire une minoration du rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} \frac{B_n}{n!} z^n$.

Pour $x \in]-R, R[$, on pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n$.

II.E – Montrer que pour tout $x \in]-R, R[$, $f'(x) = \mathrm{e}^x f(x)$.

II.F – En déduire une expression de la fonction f sur $]-R, R[$.

BY-NC-SA

III Une suite de polynômes

On définit la suite de polynômes $(H_k)_{k\in\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}[X]$ par $H_0(X)=1$ et, pour tout $k\in\mathbb{N}^*$,

$$H_k(X)=X(X-1)\cdots(X-k+1)$$

III.A – Montrer que la famille $(H_0,...,H_n)$ est une base de l'espace $\mathbb{R}_n[X]$.

III.B –

III.B.1) Pour tout $k\in\mathbb{N}$, établir une expression simplifiée de $H_{k+1}(X)+kH_k(X)$.

III.B.2) En déduire que, pour tout entier naturel n

$$X^n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)H_k(X)$$

III.C – Soit $k\in\mathbb{N}$.

III.C.1) Montrer que la fonction $f_k : x\mapsto\sum_{n=k}^{+\infty}S(n,k)\frac{x^n}{n!}$ est définie sur $]-1,1[$.

III.C.2) Pour $k\in\mathbb{N}$, on considère la fonction $g_k : x\mapsto\frac{(\mathrm{e}^x-1)^k}{k!}$.
Montrer que la fonction g_k vérifie l'équation différentielle

$$y'=\frac{(\mathrm{e}^x-1)^{k-1}}{(k-1)!}+ky$$

III.C.3) En déduire que pour tout $k\in\mathbb{N}$ et pour tout $x\in]-1,1[$,

$$\frac{(\mathrm{e}^x-1)^k}{k!}=\sum_{n=k}^{+\infty}S(n,k)\frac{x^n}{n!}$$

III.D –

III.D.1) Pour $x\in]-1,1[$ et $\alpha\in\mathbb{R}$, simplifier $\sum_{k=0}^{+\infty}H_k(\alpha)\frac{x^k}{k!}$.

III.D.2) Montrer que pour $u<\ln 2$

$$\mathrm{e}^{u\alpha}=\sum_{k=0}^{+\infty}H_k(\alpha)\frac{(\mathrm{e}^u-1)^k}{k!}$$

IV Fonctions génératrices

On se donne dans la suite un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},\mathbb{P})$.
Soit m un entier strictement positif. On dit qu'une variable aléatoire $Y\colon\Omega\to\mathbb{N}$ admet un moment d'ordre m fini si Y admet une espérance finie, c'est-à-dire si la série $\sum n^mP(Y=n)$ converge. On appelle alors moment d'ordre m de Y le réel

$$\mathbb{E}(Y^m)=\sum_{n=0}^{\infty}n^m\mathbb{P}(Y=n)$$

IV.A – Montrer que si $Y:\Omega\to\mathbb{N}$ est une variable aléatoire associée à une fonction génératrice G_Y de rayon strictement supérieur à 1, alors Y admet à tout ordre un moment fini.

IV.B – Réciproquement, soit $Y:\Omega\to\mathbb{N}$ une variable aléatoire admettant à tout ordre un moment fini.

IV.B.1) Montrer que la fonction génératrice G_Y est de classe C^∞ sur $[-1,1]$.

IV.B.2) Exprimer $G_Y^{(k)}(1)$ à l'aide des polynômes $H_k(X)$ et de la variable Y.

IV.B.3) La fonction génératrice G_Y a-t-elle nécessairement un rayon de convergence strictement supérieur à 1 ?
On pourra utiliser la série entière $\sum\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}x^n$.

IV.C – On suppose dans cette question que Y suit la loi de Poisson de paramètre 1.

IV.C.1) Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $B_n=\mathbb{E}(Y^n)$.

IV.C.2) En déduire que pour tout polynôme $Q(X)$ à coefficients entiers, la série $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{Q(n)}{n!}$ est convergente et sa somme est de la forme Ne, où N est un entier.

BY-NC-SA

V Somme de puissances

On fixe $n \in \mathbb{N}$. On pose l'application linéaire :

$$\begin{aligned}\Delta : \mathbb{R}[X] &\to \mathbb{R}[X] \\ P(X) &\mapsto P(X+1) - P(X)\end{aligned}$$

V.A – À l'aide d'un encadrement par des intégrales, déterminer un équivalent de $U_n(p) = \sum_{k=0}^{p} k^n$, à $n \geqslant 1$ fixé, lorsque p tend vers $+\infty$.

V.B – Soit Δ_n l'endomorphisme induit par Δ sur le sous-espace stable $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer la matrice A de Δ_n dans la base $(H_0, ..., H_n)$.

V.C – En déduire que $U_n(p) = \sum_{k=0}^{n} \frac{S(n,k)}{k+1} H_{k+1}(p+1)$.

V.D – On note $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(0) = 0\}$, puis $G = \mathrm{Vect}(X^{2k+1} \ ; \ 0 \leqslant k \leqslant n-1)$.

Soit $Q(X)$ le polynôme tel que $\forall p \in \mathbb{N}$, $Q(p) = \sum_{k=0}^{p} k$.

V.D.1) Rappeler l'expression explicite du polynôme $Q(X)$.

V.D.2) Montrer que l'application :

$$\begin{aligned}\Phi : F &\to G \\ P(X) &\mapsto \Delta\left(P(Q(X-1))\right)\end{aligned}$$

est un isomorphisme.

V.D.3) En déduire que pour tout $r \in \mathbb{N}$, il existe un seul polynôme $P_r(X)$ tel que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^{p} k^{2r+1} = P_r\left(\frac{p(p+1)}{2}\right)$$

V.E –

V.E.1) Déterminer le terme dominant dans $P_r(X)$.

V.E.2) Montrer que pour $r \geqslant 1$, X^2 divise $P_r(X)$.

V.E.3) Expliciter les polynômes $P_1(X)$ et $P_2(X)$.

• • • FIN • • •

BY-NC-SA

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PC chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Calcul algébrique : sommes, produits, binôme et systèmes linéaires
- Récursivité
- Logique, ensembles et applications
- Séries entières
- Compléments d'algèbre linéaire
- Équations différentielles linéaires
- Variables aléatoires discrètes
- Séries numériques et vectorielles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/pc