Concours Centrale-Supélec, France

# Session 2009, filière PSI

## Mathématiques 1

### Ce que traite le sujet

- Partie I : réorganisation des termes d'une série semi-convergente
- Partie II : suites vérifiant (P1) et (P2)

**Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.**

Copie recomposée du sujet officiel, sans retouche de son contenu ; la mise en page diffère de l'original et le pied de page porte un nom de fichier.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/psi/2009/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Concours Centrale - Supélec 2009

# Épreuve de Mathématiques I – Filière PSI

**Calculatrices autorisées**

## *Définitions et notations*

On rappelle le résultat suivant : toute partie $X$ **non vide** de $\mathbf{N}$ possède un plus petit élément noté $\min X$.

On rappelle les points suivants de Maple :
- La liste contenant l'unique élément $a$ est notée $[a]$.
- Le couple $(a, b)$ sera représenté par la liste $[a, b]$.
- Pour ajouter l'élément $x$ (qui peut être un couple) en queue de la liste $L$ on invoque : `L :=[op(L),x]`

Et pour Mathematica :
- La liste contenant l'unique élément a est notée $\{a\}$.
- Le couple $(a, b)$ sera représenté par la liste $\{a, b\}$.
- Pour ajouter l'élément $x$ (qui peut être un couple) en queue de la liste $L$ on invoque : `L=Append[L,x]`

On dira qu'une série à termes réels est semi-convergente si elle converge sans converger absolument.

On dira qu'une suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ à valeurs complexes vérifie la propriété $(P_1)$ si pour toute suite complexe $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ bornée, la série $\sum a_n u_n$ converge.

On dira qu'une suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ à valeurs réelles vérifie la propriété $(P_2)$ si pour toute suite réelle $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$, la convergence de la série $\sum u_n$ entraîne celle de la série $\sum a_n u_n$.

L'objectif du problème est d'étudier, en particulier à l'aide de méthodes algorithmiques, des propriétés et des contre-exemples de la théorie des suites et des séries et de caractériser simplement les suites qui vérifient $(P_1)$ ou $(P_2)$.

Les parties I et II sont indépendantes.

*Les correcteurs tiendront compte de la présentation, particulièrement de la position correcte des indices.*

## *Partie I - Réorganisation des termes d'une série semi-convergente*


On se donne un réel $x$. On note, pour $n \in \mathbf{N}^*$, $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ et on se propose de construire une bijection $s$ de $\mathbf{N}^*$ dans $\mathbf{N}^*$ telle que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_{s(n)} = x$.

**I.A -** On définit simultanément par récurrence trois suites d'entiers naturels $(p_n)_{n\geq 0}$, $(q_n)_{n\geq 0}$, $(s_n)_{n\geq 1}$ et une suite $(S_n)_{n\geq 0}$ de réels de la manière suivante :
- $p_0 = q_0 = 0$, $S_0 = 0$
- pour tout $n \in \mathbf{N}$, si $S_n > x$ alors : $q_{n+1} = 1 + q_n,\ p_{n+1} = p_n,\ s_{n+1} = 2q_{n+1} - 1$
  sinon : $q_{n+1} = q_n,\ p_{n+1} = 1 + p_n,\ s_{n+1} = 2p_{n+1}$
  Dans les deux cas : $S_{n+1} = S_n + u_{s_{n+1}}$

On aura intérêt à comprendre la construction précédente sous forme algorithmique.

I.A.1) Écrire une fonction `suite` qui prend en argument $x$ et l'entier $n$ et qui renvoie l'affichage de la liste (ou tableau si l'on préfère) $[s_1, s_2 \ldots, s_n]$.

I.A.2) En modifiant la fonction précédente de façon à ce quelle retourne le dessin simultané de la liste des points de coordonnées $(n, S_n)_{n\leq 70}$ et de la droite horizontale d'ordonnée $x$ (on ne demande pas d'écrire cette nouvelle fonction), on obtient pour $x = -1$, $n = 70$ le dessin suivant :




Que constate-t-on pour la suite $(S_n)_{n\geq 0}$ ? Expliquer le principe de l'algorithme.

**I.B** - On pose dorénavant, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $s(n) = s_n$. Prouver, pour $n \geq 1$, les propriétés suivantes :

$$\{s(1), s(2), ..., s(n)\} = \{2, 4, ..., 2p_n\} \cup \{[1, 3, ..., 2q_n - 1\}$$
$$p_n + q_n = n$$
$$S_n = u_{s(1)} + \cdots + u_{s(n)}$$

En déduire que $s$ est injective.

**I.C** -

I.C.1) Démontrer qu'une suite d'entiers convergente est constante à partir d'un certain rang.

I.C.2) On se propose de démontrer que la suite $(p_n)_{n\geq 0}$ croît vers $+\infty$.

a) On suppose dans un premier temps que cette suite est majorée. Utiliser le I.C.1) pour démontrer qu'il existe un entier $n_0$ tel que pour $n \geq n_0$,

$$S_n > x \quad \text{et} \quad S_n = S_{n_0} - \sum_{k=n_0}^{n-1} \frac{1}{2q_{n_0} + 2k - 2n_0 + 1}.$$

En déduire une contradiction.

b) Déduire du raisonnement précédent que la suite $(p_n)_{n\geq 0}$ diverge vers $+\infty$.

I.C.3) Justifier rapidement que $(q_n)$ tend vers $+\infty$.

I.C.4) Déduire de ce qui précède que $s$ est une bijection de $\mathbf{N}^*$ sur lui-même.

**I.D** -

I.D.1) Démontrer que, pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$|S_{n+1} - x| \leq |S_n - x| \quad \text{ou} \quad |S_{n+1} - x| \leq |u_{s(n+1)}|$$

I.D.2) En déduire que pour tout naturel $N$, il existe un entier $n > N$ tel que

$$|S_{n+1} - x| \leq |u_{s(n+1)}|$$

I.D.4) Soit $n \geq n_0$. On note $v_n = \max\left(|S_n - x|, |u_{2p_{n+1}}|, |u_{2q_{n+1}-1}|\right)$.
Démontrer que $(v_n)_{n\geq n_0}$ est décroissante. En déduire qu'elle converge vers 0.

I.D.5) Démontrer que $(S_n)$ converge vers $x$ et conclure.

**I.E** -

I.E.1) Démontrer l'existence d'une constante $\gamma > 0$ telle que :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1) \text{ quand } n \to +\infty.$$

I.E.2) Donner un développement analogue pour $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1}$ en fonction de $\gamma$.

I.E.3)

a) Justifier, pour tout naturel $n$ tel que $p_n \geq 1$ et $q_n \geq 1$, l'égalité :

$$S_n = \sum_{k=1}^{p_n} \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^{q_n} \frac{1}{2k-1}.$$

b) En déduire que :

$$S_n = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{p_n}{n-p_n}\right) - \ln 2 + o(1).$$

c) En déduire un équivalent simple de $p_n$ et de $q_n$.

d) Déterminer la limite de :

$$\frac{|u_{s(1)}| + |u_{s(2)}| + \cdots + |u_{s(n)}|}{|u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n|} \quad \text{quand} \quad n \to +\infty.$$

## *Partie II - Suites vérifiant $(P_1)$ et $(P_2)$*

**II.A** - Montrer qu'une suite complexe $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ telle que la série $\sum a_n$ converge absolument vérifie $(P_1)$.

**II.B** - Soit $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite réelle telle que la série $\sum |a_{n+1} - a_n|$ converge.

II.B.1) Prouver que la suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ possède une limite.

II.B.2) Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite réelle telle que la série $\sum u_n$ converge.
On note $U_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. Prouver, pour tout entier naturel $N$, la relation :

$$\sum_{n=0}^{N} a_n u_n = \sum_{n=0}^{N-1} (a_n - a_{n+1})\, U_n + a_N U_N.$$

En déduire que la suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ vérifie $(P_2)$.

**II.C** - Soit $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite de nombres complexes telle que la série $\sum |a_n|$ diverge. Construire une suite $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de nombres complexes de module 1 telle que la série $\sum a_n u_n$ diverge. Caractériser les suites complexes $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ vérifiant $(P_1)$.

**II.D** - Soit $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite de réels positifs telle que la série $\sum a_n$ diverge. On se propose de construire une suite $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ tendant vers 0 telle que la série $\sum a_n\varepsilon_n$ diverge. Pour cela on définit par récurrence trois suites $(p_n)_{n\in\mathbf{N}}$, $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ et $(A_n)_{n\in\mathbf{N}}$ comme suit :
• $p_0 = 0$, $\varepsilon_0 = 1$, $A_0 = a_0$.

- Pour $n \geq 1$ : $\begin{cases} p_n = 1 + p_{n-1} \quad \text{et} \quad \varepsilon_n = \dfrac{\varepsilon_{n-1}}{2} \quad \text{si} \quad A_{n-1} \geq p_{n-1} \\ p_n = p_{n-1} \quad \text{et} \quad \varepsilon_n = \varepsilon_{n-1} \text{ sinon} \end{cases}$
  Dans tous les cas : $A_n = A_{n-1} + a_n \varepsilon_n$.

II.D.1) Dans cette question seulement on suppose que $a_0 = 1$ et, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \dfrac{9}{4(n+1)}$.
Déterminer les 6 premiers termes des suites $(p_n)_{n\in\mathbf{N}}$, $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ et $(A_n)_{n\in\mathbf{N}}$.
Écrire une procédure `exemple` qui prend en argument l'entier $n$ et retourne la liste :
- en Maple : $\big[[0, p_0, \varepsilon_0, A_0], [1, p_1, \varepsilon_1, A_1], \ldots, [n, p_n, \varepsilon_n, A_n]\big]$
- en Mathematica : $\big\{\{0, p_0, \varepsilon_0, A_0\}, \{1, p_1, \varepsilon_1, A_1\}, \ldots, \{n, p_n, \varepsilon_n, A_n\}\big\}$

II.D.2)

a) Démontrer que pour tout naturel $N$, il existe un entier $n > N$ tel que : $p_n = 1 + p_{n-1}$ (on pourra raisonner par l'absurde).
En déduire qu'on peut définir une suite $(n_k)_{k\in\mathbf{N}}$ strictement croissante d'entiers par :

$$\begin{cases} n_0 = 0 \\ n_{k+1} = \min\{n \in \mathbf{N} \ / \ n > n_k \text{ et } p_n = 1 + p_{n-1}\} \quad \text{pour } k \geq 0 \end{cases}$$

b) Dans le cas général, calculer $p_{n_k}$, $\varepsilon_{n_k}$.
Prouver que la suite $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ tend vers 0 et que la série $\sum \varepsilon_n a_n$ diverge.

c) Déterminer $n_1$, $n_2$ et $n_3$ pour l'exemple de la question III.B.1).

II.D.3) Dans cette question seulement on suppose que : $\forall n \in \mathbf{N},\ a_n = \dfrac{1}{n+1}$.

a) Écrire une fonction `indexer` qui prend en argument l'entier $n$ et qui retourne :
- en Maple, la liste $\big[[0, n_0], [1, n_1], \ldots, [q, n_q]\big]$
- en Mathematica, la liste $\big\{\{0, n_0\}, \{1, n_1\}, \ldots, \{q, n_q\}\big\}$

où q est le plus grand des entiers $k$ tel que $n_k \leq n$. Par exemple l'appel de `indexer(10000)` retourne :

$$\big[[0,0], [1,1], [2,2], [3,51]\big] \quad (resp.\ \big\{\{0,0\}, \{1,1\}, \{2,2\}, \{3,51\}\big\})$$

b) Soit $k \geq 3$ un indice tel que $n_k - 2 > n_{k-1}$. Prouver l'inégalité :

$$k - 1 \leq A_{n_k - 1} \leq k - 1 + \frac{1}{2^{k-1} n_k}$$

En déduire que $n_{k+1} - 2 > n_k$.

c) Calculer explicitement la différence $A_{n_{k+1}-1} - A_{n_k - 1}$ en fonction de $k$, $n_k$ et $n_{k+1}$. En déduire, pour $k \geq 3$, l inégalité :

$$\frac{1}{2^k} \ln\left(\frac{n_{k+1}+1}{n_k+1}\right) \leq A_{n_{k+1}-1} - A_{n_k-1} \leq \frac{1}{2^k} \ln\left(\frac{n_{k+1}}{n_k}\right).$$

d) Déduire des deux questions précédentes, pour $k \geq 3$, l'inégalité :

$$2^k - \frac{2}{n_k} \leq \ln\left(\frac{n_{k+1}}{n_k}\right) \leq 2^k + \frac{1}{n_{k+1}} - \ln\left(1 + \frac{1}{n_{k+1}}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{n_k}\right).$$

e) En utilisant une série convenable, étudier la convergence de la suite de terme général $(\ln n_k - 2^k)$ ; puis prouver l'existence d'une constante $C > 0$ telle que :

$$n_k \underset{k\to\infty}{\sim} C \exp\left(2^k\right).$$

en déduire que :

$$A_{n_k} \underset{k\to\infty}{\sim} \frac{\ln(\ln n_k)}{\ln 2}$$

puis que :

$$A_n \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{\ln(\ln n)}{\ln 2}.$$

Que peut-on penser de l'exécution de la fonction `indexer` ?

**II.E** - Soit $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite de réels quelconques telle que, pour toute suite $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de réels tendant vers 0, la série $\sum \varepsilon_n a_n$ converge.

a) Prouver que la série $\sum \varepsilon_n |a_n|$ converge.

b) En déduire que la série $\sum |a_n|$ converge.

**II.F** - Soit maintenant $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite de réels telle que, pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbf{N}}$, la convergence de la série $\sum x_n$ entraîne la convergence de la série $\sum a_n x_n$.

II.F.1) Prouver que la suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ est bornée.

II.F.2) Soit $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite réelle de limite nulle. Prouver la convergence de la série $\sum \varepsilon_n (a_{n+1} - a_n)$.

II.F.3) Prouver que la série $\sum |a_{n+1} - a_n|$ converge.

II.F.4) Caractériser les suites vérifiant $(P_2)$.

---

## ●●● FIN ●●●

---

# Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

## Chapitres liés à ce sujet

- Séries numériques et vectorielles
- Ensembles dénombrables et familles sommables
- Nombres réels et suites numériques
- Bases de Python : expressions, types, instructions, fonctions

## Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

**prepahelp.com/#essai**

Une question sur le concours ou sur ta filière :
**écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/psi