Concours Centrale-Supélec, France

Session 2024, filière PSI

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : intégrale de Wallis et intégrale de Gauss
- Partie II : autour d'une équation différentielle
- Partie III : étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien
- Partie IV : une famille totale

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/psi/2024/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Mathématiques 1

PSI

4 heures Calculatrice autorisée

2024

Notations

— On note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$.

— Tout au long du sujet, un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ sera identifié à sa fonction polynomiale.

— Une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continue est dite intégrable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|\,dx$ converge.

— Pour une famille de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on appelle $\mathrm{vect}(\mathrm{P_n}, \mathrm{n} \in \mathbb{N})$ l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est à dire :

$$\mathrm{vect}(\mathrm{P_n}, \mathrm{n} \in \mathbb{N}) = \left\{ \mathrm{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \exists \mathrm{N} \in \mathbb{N}, \exists (\mathrm{a_0}, ..., \mathrm{a_N}) \in \mathbb{R}^{\mathrm{N}+1}, \mathrm{g} = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{N}} \mathrm{a_k P_k} \right\}$$

Le sujet illustre des applications du calcul de l'intégrale de Gauss dans différents domaines.

La partie I est consacrée au calcul de cette intégrale.

La partie II est consacrée à la résolution d'une équation différentielle du second ordre à l'aide des séries entières. Elle utilise le résultat final de la partie I. Elle est totalement indépendantes des deux parties suivantes.

La partie III est consacrée à l'étude d'un endomorphisme autoadjoint de $\mathbb{R}[X]$ et d'une suite de polynômes orthogonaux associés à cet endomorphisme. Elle est indépendante de la partie II.

La partie IV est consacrée à montrer des propriétés sur la famille de polynômes construite à la partie III. Le but est d'établir que c'est une famille totale d'un espace préhilbertien. Ce résultat est en fait un résultat général dans la théorie des espaces de Hilbert.

I Partie I : Intégrale de Wallis et Intégrale de Gauss

I.A – On définit $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\,dt$.

Q 1. Étudier la monotonie de la suite (W_n).

Q 2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.

Q 3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_nW_{n+1} = \dfrac{\pi}{2}$.

Q 4. En déduire que $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$.

I.B – On note $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$ et $J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$

Q 5. Justifier l'existence de I.

Q 6. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \dfrac{x^2}{n}\right)^n dx = I$.

BY-NC-SA

Q 7. En utilisant le changement de variable $x = \sqrt{n}\sin u$, après avoir justifié qu'il est licite, montrer que pour tout $n \geqslant 1$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \sqrt{n} W_{2n+1}$$

Q 8. En déduire la valeur de I puis de J.

II Partie II : Autour d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle définie sur $\mathbb{R}[X]$ par

$$xy'' + y' + xy = 0 \tag{II.1}$$

II.A –

Q 9. Déterminer les solutions développables en série entière de II.1 sur $\mathbb{R}[X]$.

Q 10. Démontrer qu'il existe une unique solution développable en série entière, notée S, telle que $S(0) = 1$.

II.B – On définit, $\forall x \in \mathbb{R}$, $G(x) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \cos(x\sin(t))\,dt$.

Q 11. Montrer que G est définie sur $\mathbb{R}$ et de classe C^2 sur $\mathbb{R}$.

Q 12. Montrer que G est solution de II.1 sur $\mathbb{R}$.

Q 13. Montrer que $G = S$.

III Partie III : Étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien

III.A – Les polynômes d'Hermite.

On note w l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^∞, définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $w(x) = \mathrm{e}^{-\mathrm{x}^2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note H_n l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $H_n(x) = (-1)^n \mathrm{e}^{\mathrm{x}^2}\mathrm{w}^{(\mathrm{n})}(\mathrm{x})$, où $w^{(n)}$ désigne la dérivée n-ième de w.

En particulier : $H_0(x) = 1$.

Q 14. Calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}, H_1(x), H_2(x), H_3(x)$.

Q 15. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H_n'(x).$$

Q 16. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}, H_n$ est un polynôme de degré n dont vous déterminerez la parité.

Q 17. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le coefficient dominant de H_n.

III.B – Un produit scalaire.

On note E l'ensemble des applications f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continues et telles que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x)e^{-x^2}\,dx$ converge.

Q 18. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel contenant $\mathbb{R}[X]$.

Q 19. On note $\langle .,. \rangle$ l'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui à tout $(f,g) \in E^2$ associe $\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)e^{-x^2}\,dx$.

Montrer que $\langle .,. \rangle$ est un produit scalaire sur E.

BY-NC-SA

On notera ||.|| la norme euclidienne associée à ce produit scalaire.

III.C – Lien entre le produit scalaire et les polynômes d'Hermite

Q 20. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $P \in \mathbb{R}[X]$:

$$\left\langle P', H_{n-1} \right\rangle = \langle P, H_n \rangle ,$$

Q 21. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$: $(P \mid H_n) = 0$.

Q 22. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(H_0, ..., H_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Q 23. Montrer : $\|H_n\|^2 = \left\langle H_n^{(n)}, H_0 \right\rangle$.

Q 24. En déduire la valeur de $\|H_n\|$.

III.D – Étude d'un endomorphisme autoadjoint

On note u, v, w les applications définies de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, par :

$$u(P) = -P'' + 2\mathrm{XP}' + \mathrm{P}, \quad \mathrm{v(P)} = 2\mathrm{XP} - \mathrm{P}', \quad \mathrm{w(P)} = \mathrm{P}'.$$

Q 25. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ et que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par u.

Par la suite, on notera u_n l'endomorphisme induit par u sur $\mathbb{R}_n[X]$.

On admet que v et w sont aussi des endomorphismes de $\mathbb{R}[X]$, et on note Id l'application identique de $\mathbb{R}[X]$.

Q 26. Etablir : $v \circ w = u - \mathrm{Id}$ et $w \circ v = u + \mathrm{Id}$.

Q 27. En déduire : $u \circ v - v \circ u = 2v$.

Q 28. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $P \in \mathbb{R}[X]$, si $u(P) = \lambda P$, alors $u(v(P)) = (\lambda + 2)v(P)$.

Q 29. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, H_k est un vecteur propre de u et déterminer la valeur propre associée.

Q 30. Soit $n \in \mathbb{N}$. Justifier que u_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Q 31. Établir, pour tout $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$:

$$\left\langle P', Q' \right\rangle = \langle u(P), Q \rangle - \langle P, Q \rangle .$$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Q 32. Montrer que u_n est un endomorphisme autoadjoint de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q 33. Justifier, d'une deuxième manière, que u_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ dans une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$ formée de vecteurs propres de u_n.

Q 34. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée de vecteurs propres de u_n.

IV Partie IV : Une famille totale

Dans cette partie, nous conservons les notations de la partie III. L'espace E muni de son produit scalaire et la famille $(H_n)_{n\in\mathbb{N}}$ précédemment construite. Nous allons montrer que $(\mathrm{vect(H_n, n \in \mathbb{N})})^{\perp} = \{0\}$. On dit dans ce cas là que la famille $(H_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est totale dans l'espace préhilbertien E ou encore que c'est une base hilbertienne de E.

Q 35. Soit $\xi \in \mathbb{R}$. Pour $\xi \in E$, montrer que $x \longmapsto f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

On pourra écrire $f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2} = f(x)e^{-x^2/2}e^{-ix\xi}e^{-x^2/2}$.

CC BY-NC-SA

On définit ainsi

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-it\xi} e^{-t^2}\, dt.$$

$\mathcal{F}$ est une application linéaire sur E, appelée la transformation de Fourier de f sur l'espace préhilbertien E. Nous admettrons pour la suite que $\mathcal{F}$ est injective sur E.

Q 36. Montrer que, pour tout entier naturel p, la fonction $x \mapsto x^{2p} \exp(-x^2)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

On note $M_p = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^{2p} \exp(-x^2)\, dx$. Déterminer la valeur de M_p.

Q 37. Soit $f \in E$. Justifier que

$$\forall \xi \in \mathbb{R},\ \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f(x) e^{-x^2} \frac{(-i)^n \xi^n x^n}{n!}\, dx$$

Q 38. Montrer que $\mathcal{F}(f)$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.

Dans la suite de la partie, on suppose que $f \in (\mathrm{vect}(\mathbf{H_n}, \mathbf{n} \in \mathbb{N}))^{\perp}$. Le but est de montrer que f est la fonction nulle.

Q 39. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) e^{-x^2}\, dx = 0$.

Q 40. En déduire que $\mathcal{F}(f)$ est la fonction nulle.

Q 41. Conclure.

• • • FIN • • •

BY-NC-SA

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Intégration sur un intervalle quelconque
- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Compléments d'algèbre linéaire
- Espaces vectoriels normés
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Dérivabilité et convexité
- Séries numériques et vectorielles
- Équations différentielles linéaires

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/psi