Concours Centrale-Supélec, France

Session 2012, filière TSI

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I
- Partie II
- Partie III
- Partie IV

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/tsi/2012/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

Mathématiques 1

TSI 2012

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC — 4 heures — Calculatrices autorisées

Le sujet comporte quatre parties. Dans les parties I et II, on établit des résultats utiles pour les parties suivantes. Le jury tiendra compte de la clarté et de la précision de la rédaction. En particulier, les candidats veilleront à justifier avec soin que les hypothèses des théorèmes utilisés sont bien vérifiées.

I

I.A –

I.A.1) Soit x un réel strictement positif.

Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}dt$ est convergente et qu'elle vérifie les inégalités suivantes :

$$0 \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}dt \leqslant \frac{1}{x}$$

I.A.2) Montrer que, pour tout réel $x > 0$, la fonction définie sur $]0,+\infty[$ par $t \mapsto \dfrac{e^{-t}-e^{-xt}}{t}$, admet une limite quand $t \to 0^+$, dont on donnera la valeur.

I.A.3) Déduire de ce qui précède que, pour tout réel $x > 0$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}-e^{-xt}}{t}dt$ est absolument convergente.

I.B – On désigne désormais par F la fonction qui à $x > 0$ associe $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}-e^{-xt}}{t}dt$.

I.B.1) Soit c un réel strictement positif.

Montrer que la fonction F est de classe C^1 sur l'intervalle $[c,+\infty[$.

I.B.2) En déduire que F est de classe C^1 sur l'intervalle $]0,+\infty[$.

Calculer $F'(x)$ puis $F(x)$, pour tout $x \in]0,+\infty[$.

I.C – Soient a et b deux réels vérifiant $0 < a < b$.

Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}dt$ est convergente et calculer sa valeur.

On pourra utiliser la fonction F étudiée précédemment.

I.D – Dans cette question, on considère l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}\left(1-e^{-t}\right)^n dt$, dans laquelle x est un réel strictement positif et n un entier supérieur ou égal à 1.

I.D.1) Montrer que cette intégrale est convergente.

I.D.2) Vérifier que, pour tout réel t strictement positif et tout entier n supérieur ou égal à 1, on a

$$\left(1-e^{-t}\right)^n = -\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k(1-e^{-kt})$$

I.D.3) En déduire la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t}\left(1-e^{-t}\right)^n dt$.

II

Dans cette partie, on se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ des polynômes réels.

On définit sur $\mathbb{R}[X]$ l'application Δ qui à $P \in \mathbb{R}[X]$ associe le polynôme $\Delta(P)$ défini par :

$$\Delta(P)(X) = P(X+1) - P(X)$$

Cette application Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$, ce qu'on ne demande pas de justifier. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on définit l'endomorphisme Δ^n obtenu en composant n endomorphismes égaux à Δ :

$$\Delta^n = \underbrace{\Delta \circ \Delta \circ \ldots \circ \Delta}_{n \text{ fois}}$$

BY-NC-SA

On considère la famille de polynômes $(P_n)_{n\geqslant 0}$ définie par

$$\begin{cases} P_0(X) = 1 \\ P_1(X) = X \\ P_n(X) = \dfrac{X(X+1)\dots(X+n-1)}{n!} = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\prod_{j=0}^{n-1}(X+j) \quad \text{pour } n \geqslant 2 \end{cases}$$

Dans les questions qui suivent, n désigne toujours un entier supérieur ou égal à 1.

II.A –

II.A.1) Montrer que la famille $(P_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$ des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n.

II.A.2) Soit k un entier vérifiant $1 \leqslant k \leqslant n$.

Déterminer $\Delta(P_k)(X)$ en fonction de $P_{k-1}(X+1)$. Donner également la valeur de $\Delta(P_0)$.

II.A.3) Soit m un entier supérieur ou égal à 1 et k un entier vérifiant $0 \leqslant k \leqslant n$.

Déterminer $\Delta^m(P_k)$ en distinguant les cas : $0 \leqslant m \leqslant k-1$, $m = k$ et $m \geqslant k+1$.

II.A.4) Déduire de ce qui précède que, si P est un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-1$, alors $\Delta^n(P) = 0$.

II.B – Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

II.B.1) Démontrer que le polynôme $\Delta^n(P)$ est donné par la formule

$$\Delta^n(P)(X) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} P(X+k)$$

On pourra effectuer une récurrence.

II.B.2) En déduire, pour tout entier r vérifiant $0 \leqslant r \leqslant n-1$, l'égalité suivante,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k (X+k)^r = 0 \tag{II.1}$$

III

Dans toute cette partie, n et r désignent des entiers supérieurs ou égaux à 1 et x un réel strictement positif.

III.A –

III.A.1) Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t^r}\left(1-e^{-t}\right)^n dt$ est convergente.

III.A.2) Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{1} \frac{e^{-xt}}{t^r}\left(1-e^{-t}\right)^n dt$ converge si et seulement si $n \geqslant r$.

III.B – Désormais, on suppose la condition $1 \leqslant r \leqslant n$ vérifiée. On définit la fonction F_r qui à $x > 0$ associe :

$$F_r(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{t^r}\left(1-e^{-t}\right)^n dt$$

III.B.1) Soit c un réel strictement positif.

Montrer que la fonction F_r est de classe C^1 sur l'intervalle $[c, +\infty[$.

III.B.2) En déduire que F_r est de classe C^1 sur l'intervalle $]0, +\infty[$. Montrer que si $r \leqslant n-1$, on a

$$\forall x > 0,\ F'_{r+1}(x) = -F_r(x)$$

III.C –

III.C.1) Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$, on a $0 \leqslant 1 - e^{-t} \leqslant t$.

III.C.2) Montrer que, pour tout $x > 0$, on a :

$$0 < F_r(x) \leqslant \frac{1}{x^{n+1-r}} \int_0^{+\infty} e^{-u} u^{n-r}\, du$$

III.C.3) En déduire que $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} F_r(x) = 0$.

III.D – On définit la fonction G_r qui, à $x > 0$, associe :

$$G_r(x) = \frac{(-1)^r}{(r-1)!} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (x+k)^{r-1} \ln(x+k)$$

BY-NC-SA

On suppose dans cette question que $1 \leqslant r \leqslant n-1$.
Montrer que $\forall x > 0,\ G'_{r+1}(x) = -G_r(x)$.

III.E – Dans cette question, on utilisera le résultat $\lim\limits_{x\to+\infty} G_r(x) = 0$ qu'on admet pour l'instant.

Montrer par récurrence sur l'entier r variant de 1 à n, qu'on a : $\forall x > 0,\ F_r(x) = G_r(x)$.

III.F – Le but de cette question est d'établir que $\lim\limits_{x\to+\infty} G_r(x) = 0$. On utilisera l'égalité (**II.1**).

III.F.1) Montrer que, pour tout entier r vérifiant $1 \leqslant r \leqslant n-1$

$$\forall x > 0,\ G_{r+1}(x) = \frac{(-1)^{r+1}}{r!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(x+k)^r\ln(1+\frac{k}{x})$$

III.F.2) Rappeler le développement limité de la fonction $u \mapsto \ln(1+u)$ à l'ordre r lorsque u tend vers 0. En utilisant ce développement limité pour la fonction $x \mapsto \ln(1+\frac{k}{x})$ lorsque $x \to +\infty$, montrer que :

$$G_{r+1}(x) = \frac{(-1)^{r+1}}{r!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(x+k)^r\left(\sum_{j=1}^{r}\frac{(-1)^{j-1}k^j}{jx^j}\right)+o(1)$$

où $o(1)$ désigne une fonction admettant pour limite 0 lorsque $x \to +\infty$.
Vérifier qu'il existe des constantes A_s, où s est un entier relatif compris entre $-r$ et $r-1$, telles que :

$$G_{r+1}(x) = \frac{(-1)^{r+1}}{r!}\sum_{s=-r}^{r-1}A_s x^s + o(1) \qquad \text{quand } x \to +\infty$$

III.F.3) Montrer que, pour tout entier s vérifiant $0 \leqslant s \leqslant r-1$, la constante A_s est nulle.

III.F.4) En déduire que, pour tout entier r vérifiant $1 \leqslant r \leqslant n$, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} G_r(x) = 0$.

IV

Dans cette partie, a est un réel fixé. On considère la série entière de terme général $P_n(a)\ x^n$, $n \geqslant 0$, où (P_n) est la famille de polynômes étudiée dans la **partie II**.

IV.A – Dans cette question, on suppose que a est un entier relatif négatif.

IV.A.1) Préciser la valeur de $P_n(a)$ lorsque $n \geqslant |a|+1$. En posant $p = |a|$, donner la valeur de $P_n(a)$ lorsque $0 \leqslant n \leqslant p$ en fonction de $\binom{p}{n}$

IV.A.2) Justifier l'existence de la somme $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} P_n(a)\ x^n$ pour tout réel x et la calculer.

IV.B – Dans cette question, on suppose que a n'est pas un entier négatif.

IV.B.1) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum\limits_{n\geqslant 0} P_n(a)\ x^n$.

IV.B.2) Pour tout réel x tel que cette série converge, on pose $S_a(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} P_n(a)\ x^n$.

Montrer que $\forall x \in\ ]-R, R[,\ (1-x)S'_a(x) - aS_a(x) = 0$.

IV.B.3) En déduire la valeur de $S_a(x)$ pour $x \in\ ]-R, R[$.

IV.C – Dans cette question, on étudie la convergence de la série de terme général $\left|P_n(a)\right|$, $n \geqslant 0$, lorsque $a \notin \mathbb{Z}^-$. On suppose que c est un réel fixé, et on définit une suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ en posant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = n^c\ \left|P_n(a)\right|$$

IV.C.1) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $w_n = \ln u_{n+1} - \ln u_n$.
Montrer qu'il existe une unique valeur de c qu'on explicitera, pour laquelle la série de terme général w_n, $n \geqslant 1$, converge.
Dans la suite de cette question, on suppose que c est désormais égal à cette valeur.

IV.C.2) Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge et que sa limite L, qu'on ne cherchera pas à calculer, est strictement positive. En déduire que : $\left|P_n(a)\right| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{L}{n^c}$.

IV.C.3) Préciser pour quelles valeurs de a la série de terme général $\left|P_n(a)\right|$ converge. Donner dans ce cas la valeur de $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} P_n(a)$ et celle de $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n P_n(a)$. On citera avec précision le théorème utilisé.

• • • FIN • • •

BY-NC-SA

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de TSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Intégration sur un intervalle quelconque
- Compléments d'algèbre linéaire
- Calcul algébrique : sommes, produits, binôme et systèmes linéaires
- Limites et continuité
- Séries entières
- Séries numériques et vectorielles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/tsi