Concours Centrale-Supélec, France

Session 2021, filière TSI

Mathématiques 2

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : commutant d'une matrice
- Partie II : suites récurrentes linéaires d'ordre 3

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/centrale/tsi/2021/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Mathématiques 2

TSI

2021

4 heures

Calculatrice autorisée

Notations et rappels

— Pour n et p deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 1, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients réels. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n et I_n la matrice identité d'ordre n.

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $[M]_{i,j}$ le coefficient situé sur la i-ème ligne et la j-ème colonne de M.

Si $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, on note $\text{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont $\lambda_1, ..., \lambda_n$.

— Base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, on note $E_{i,j}^{(n)}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf le coefficient situé sur la i-ème ligne et la j-ème colonne qui vaut 1. On admet que $(E_{i,j}^{(n)})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

— Matrices blocs

Si n_1 et n_2 sont deux entiers naturels non nuls tels que $n_1 + n_2 = n$, toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire sous la forme $M = \left(\begin{array}{c|c} M_1 & M_2 \\ \hline M_3 & M_4 \end{array}\right)$ où $M_1 \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{R})$, $M_2 \in \mathcal{M}_{n_1,n_2}(\mathbb{R})$, $M_3 \in \mathcal{M}_{n_2,n_1}(\mathbb{R})$ et $M_4 \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{R})$.

Si $N = \left(\begin{array}{c|c} N_1 & N_2 \\ \hline N_3 & N_4 \end{array}\right)$ est une décomposition du même type, on admet que le produit matriciel MN s'effectue selon la même formule que le produit habituel en remplaçant les coefficients par des blocs :

$$MN = \left(\begin{array}{c|c} M_1N_1 + M_2N_3 & M_1N_2 + M_2N_4 \\ \hline M_3N_1 + M_4N_3 & M_3N_2 + M_4N_4 \end{array}\right)$$

— Polynômes matriciels

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit la suite des puissances de M par $M^0 = I_n$ et, pour tout entier naturel k, $M^{k+1} = MM^k$.

$\mathbb{R}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients réels et $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n.

Si $\Pi = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ et si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\Pi(M)$ la matrice $\sum_{k=0}^{d} a_k M^k$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On dit alors que $\Pi(M)$ est un polynôme matriciel en M.

Enfin, on admet que, si $(\Pi_1, \Pi_2) \in \mathbb{R}[X]^2$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors $(\Pi_1 \times \Pi_2)(M) = \Pi_1(M) \times \Pi_2(M)$.

Définition et objectifs du problème

On définit le commutant C_A d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$C_A = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}.$$

L'objectif de la première partie est d'expliciter le commutant de certaines matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, notamment dans le cas où $n = 3$. La deuxième partie aborde l'étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 3 à coefficients constants. Seuls les résultats du I.B.3 sont utilisés dans la partie II.

Le candidat mentionnera les résultats obtenus à l'aide d'une calculatrice. Dans ce cas, aucune justification complémentaire n'est attendue.

BY-NC-SA

I Commutant d'une matrice

I.A – Propriétés générales

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et P une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q 1. Montrer que C_A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q 2. Montrer que, si M et N appartiennent à C_A, alors leur produit MN appartient à C_A.

Q 3. Montrer que si M appartient à C_A, alors, pour tout entier naturel k, M^k appartient à C_A.

Q 4. Déduire de la question précédente que, si $\Pi \in \mathbb{R}[X]$, alors $\Pi(A) \in C_A$.

On note $A' = P^{-1}AP$.

Q 5. Montrer que M appartient à C_A si et seulement si $M' = P^{-1}MP$ appartient à $C_{A'}$.

On définit les deux applications Φ et Ψ par

$$\Phi : \left|\begin{array}{ccc} C_A & \to & C_{A'} \\ M & \mapsto & P^{-1}MP \end{array}\right. \qquad \text{et} \qquad \Psi : \left|\begin{array}{ccc} C_{A'} & \to & C_A \\ M & \mapsto & PMP^{-1} \end{array}\right.$$

Q 6. Justifier que Φ et Ψ sont des applications linéaires.

Q 7. Calculer $\Phi \circ \Psi$ et $\Psi \circ \Phi$.

Q 8. Établir que Φ et Ψ sont des isomorphismes.

I.B – Quelques exemples en dimension **3**

I.B.1) Premier exemple

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Q 9. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et expliciter une matrice P_1 inversible et une matrice D diagonale telles que $A = P_1 D P_1^{-1}$.

Q 10. Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ appartient à C_D si et seulement s'il existe trois réels a, b et c tels que

$$M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

Q 11. En déduire une base de C_D faisant intervenir certaines des matrices $E_{i,j}^{(3)}$.

Q 12. En utilisant la question 8, déterminer une base de C_A. Quelle est la dimension de C_A ?

I.B.2) Deuxième exemple

On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Q 13. Justifier sans calcul que B est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et expliciter une matrice P_2 inversible et une matrice Δ diagonale vérifiant $[\Delta]_{3,3} = 9$ telles que $B = P_2 \Delta P_2^{-1}$.

Q 14. Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ appartient à C_Δ si et seulement s'il existe cinq réels a, b, c, d et e tels que

$$M' = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}.$$

BY-NC-SA

Q 15. En déduire une base de C_Δ puis une base de C_B. Quelle est la dimension de C_B ?

I.B.3) Troisième exemple

On considère la matrice $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Q 16. Donner le polynôme caractéristique de G, ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.

Q 17. G est-elle trigonalisable ? Est-elle diagonalisable ? Justifier les réponses.

On note g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ admettant G comme matrice dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.

Q 18. Déterminer les vecteurs u et v de $\mathbb{R}^3$ vérifiant $g(u) = -2u$ et $g(v) = v$ et dont les premières composantes dans la base $\mathcal{B}$ sont égales à 1.

Q 19. Déterminer le vecteur w de première composante nulle dans la base $\mathcal{B}$ vérifiant $(g - Id_{\mathbb{R}^3})(w) = v$.

Q 20. Vérifier que $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner une matrice P_3 inversible telle que $G = P_3 T P_3^{-1}$, où

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q 21. Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ appartient à C_T si et seulement s'il existe quatre réels a, b, c et d tels que

$$M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & d & b \end{pmatrix}.$$

Q 22. En déduire une base de C_T, puis une base de C_G.

I.C – Commutant d'une matrice d'ordre n ayant n valeurs propres distinctes

On suppose dans cette sous-partie que n est un entier naturel supérieur ou égal à 2 et que A est une matrice réelle d'ordre n admettant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes $\lambda_1, ..., \lambda_n$.

I.C.1)

Q 23. Justifier qu'il existe une matrice P_4 inversible telle que $A = P_4 D P_4^{-1}$ où $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$.

Q 24. Démontrer que, pour tout polynôme Π de $\mathbb{R}[X]$,

$$\mathrm{diag}(\Pi(\lambda_1), ..., \Pi(\lambda_n)) = \Pi(\mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)).$$

I.C.2) On considère l'application $\Theta : \left| \begin{matrix} \mathbb{R}_{n-1}[X] & \to & \mathbb{R}^n \\ \Pi & \mapsto & (\Pi(\lambda_1), ..., \Pi(\lambda_n)) \end{matrix} \right.$.

Q 25. Montrer que Θ est linéaire et injective.

Q 26. Démontrer que, pour tout n-uple $(\mu_1, ..., \mu_n)$ de $\mathbb{R}^n$, il existe un unique polynôme $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \qquad Q(\lambda_i) = \mu_i.$$

I.C.3) Soit M' une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q 27. Pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, calculer $[M'D]_{i,j}$ et $[DM']_{i,j}$.

Q 28. Démontrer que M' appartient à C_D si et seulement s'il existe des réels $\mu_1, ..., \mu_n$ tels que

$$M' = \mathrm{diag}(\mu_1, ..., \mu_n).$$

Q 29. Déterminer une base de C_D, puis une base de C_A.

BY-NC-SA

Q 30. Comparer la dimension de C_A avec le résultat obtenu à la question 12.

I.C.4) Soit M une matrice appartenant à C_A. On pose $M' = P_4^{-1}MP_4$.

Q 31. Démontrer qu'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $M' = Q(D)$.

Q 32. Démontrer que pour tout entier naturel n, $(P_4DP_4^{-1})^n = P_4D^nP_4^{-1}$, puis que,

$$\forall \Pi \in \mathbb{R}[X], \qquad \Pi(P_4DP_4^{-1}) = P_4\,\Pi(D)P_4^{-1}.$$

Q 33. En déduire que $M = Q(A)$, puis comparer C_A à l'ensemble des polynômes matriciels en A.

I.D – Commutant d'une matrice diagonalisable ayant deux valeurs propres

On suppose dans cette sous-partie que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ayant exactement deux valeurs propres λ_1 et λ_2.

Pour tout $i \in \{1, 2\}$, on note $n_i = \dim(E_{\lambda_i}(A))$ où $E_{\lambda_i}(A)$ est le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ_i.

Soient

$$D = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 I_{n_1} & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 I_{n_2} \end{array}\right)$$

et P_5 une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = P_5DP_5^{-1}$.

Q 34. Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ appartient à C_D si et seulement s'il existe deux matrices $M_1' \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{R})$ et $M_2' \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{R})$ telles que

$$M' = \left(\begin{array}{c|c} M_1' & 0 \\ \hline 0 & M_2' \end{array}\right)$$

Q 35. En déduire la dimension de C_A et comparer ce résultat avec celui trouvé à la question 15.

II Suites récurrentes linéaires d'ordre 3

On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles définies sur $\mathbb{N}$ et F le sous-ensemble de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formé des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = au_{n+2} + (a+3)u_{n+1} - 2(a+1)u_n$$

où a est un nombre réel. On admet que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

II.A – Étude du cas particulier $a = 0$

On considère ici la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par ses trois premiers termes u_0, u_1, u_2 et la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = 3u_{n+1} - 2u_n. \tag{II.1}$$

Pour tout entier naturel n, on pose $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$.

Q 36. Donner l'expression de U_{n+1} en fonction de U_n et de la matrice G définie au I.B.3. En déduire l'expression de U_n en fonction de G et de U_0.

Q 37. Déterminer, pour tout entier naturel n, la matrice T^n où T est la matrice définie à la question 20.

Q 38. En décomposant T^n en une somme de trois matrices bien choisies, montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est combinaison linéaire des suites $\left((-2)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$, $(n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(1)_{n\in\mathbb{N}}$.

BY-NC-SA

Q 39. Réciproquement, démontrer que toute combinaison linéaire des trois suites précédentes vérifie la récurrence (II.1).

II.B – Étude du cas général

On revient au cas général où a est un réel quelconque. On considère l'application

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} F & \to & \mathbb{R}^3 \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \mapsto & (u_0, u_1, u_2) \end{array} \right.$$

Q 40. Démontrer que φ est un isomorphisme et donner la dimension de F.

Q 41. Justifier que 3 suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de F forment une base de F si, et seulement si, le déterminant $\begin{vmatrix} u_0 & v_0 & w_0 \\ u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \end{vmatrix}$ est non nul.

Q 42. Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Démontrer que la suite (u_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = x^n,$$

appartient à F si et seulement si

$$x^3 - ax^2 - (a+3)x + 2(a+1) = 0. \tag{II.2}$$

L'équation (II.2) s'appelle *équation caractéristique* de la récurrence. On note $C(x) = x^3 - ax^2 - (a+3)x + 2(a+1)$.

Q 43. Démontrer que 1 est racine du polynôme C et et que toutes les racines de C sont réelles.

Q 44. On suppose $a \neq 0$ et $a \neq -3$. Montrer que C admet deux racines distinctes, autres que 1, notées r_1 et r_2. Montrer que les suites $(1)_{n\in\mathbb{N}}$, $(r_1^n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ forment une base de l'espace vectoriel F.

Q 45. Montrer que, si $a = -3$, l'équation (II.2) admet une racine double et une racine simple, notées respectivement r_0 et r_1. Donner les valeurs de r_0 et r_1.

Q 46. Soit x un nombre réel non nul et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général nx^n. Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$,

$$v_{n+3} - av_{n+2} - (a+3)v_{n+1} + 2(a+1)v_n = x^n(nC(x) + xC'(x))$$

où C' désigne la dérivée de C.

Q 47. En déduire, dans le cas où $a = -3$, que la suite $(nr_0^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est élément de F. Déterminer une base de F.

Q 48. Déterminer la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = -3u_{n+2} + 4u_n.$$

• • • FIN • • •

BY-NC-SA

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de TSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
- Compléments d'algèbre linéaire

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/centrale/tsi