Concours National Commun (CNC), Maroc

Session 2003, filière MP

Mathématiques I

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- I. Étude d'un exemple
- II. Quelques propriétés de la transformée de Fourier d'une fonction
- III. Une formule d'inversion

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/cnc/mp/2003/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Jeunesse

Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique

Concours National Commun d'Admission aux Grandes Écoles d'Ingénieurs

Session 2003

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES I

Durée 4 heures

Concours **MP**

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de cette page de garde
L'usage de la calculatrice est *interdit*

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats du concours MP, comporte 4 pages.
L'usage de la calculatrice est interdit .

Les candidats sont informés que la précision des raisonnements ainsi que le soin apporté à la rédaction seront des éléments pris en compte dans la notation. Les candidats pourront admettre et utiliser le résultat d'une question non résolue s'ils l'indiquent clairement sur la copie. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références *des questions abordées.*

Définitions et notations

On travaille dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, qui est l'espace vectoriel de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$; on notera aussi $\mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{C}^p(\mathbb{R})$, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$) le sous-espace vectoriel des fonctions continues (resp. de classes $\mathcal{C}^p$, $\mathcal{C}^\infty$) à valeurs complexes. Pour toute fonction $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ et tout réel x, on pose

$$\hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixt} f(t)\, dt,$$

lorsque cette quantité a un sens.

Quand elle est définie, La fonction $\hat{f}$ s'appelle la transformée de FOURIER de f.

I. ÉTUDE D'UN EXEMPLE

1. Soient x et α deux réels strictement positifs.

   (a) Justifier l'intégrabilité de la fonction $t \mapsto \frac{1-e^{-t}}{t}$ sur l'intervalle $]0, \alpha]$.

   (b) Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est intégrable sur l'intervalle $[x, +\infty[$.

2. Dans la suite, φ désigne la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $\varphi(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\, dt$.

   (a) Montrer que, pour tout réel strictement positif x, $0 < \varphi(x) < \frac{e^{-x}}{x}$.

   (b) Justifier que φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner l'expression de φ'.

   (c) Montrer que, lorsque x tend vers 0^+, $\varphi(x) + \ln x$ tend vers

   $$C = \varphi(1) - \int_0^1 \frac{1 - e^{-t}}{t}\, dt.$$

   (on pourra exprimer $\ln x$ sous forme d'une intégrale.)

   (d) Montrer que, pour tout $x > 0$,

   $$\varphi(x) + \ln x = C + \int_0^x \frac{1 - e^{-t}}{t}\, dt,$$

   et en déduire que

   $$\varphi(x) + \ln x = C + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{x^k}{k!}.$$

3. Soit ψ la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$\psi(x) = \frac{1}{2}\,\varphi(|x|).$$

(a) Montrer que ψ est intégrable sur les deux intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

(b) Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\widehat{\psi}(x)$ a un sens et que

$$\widehat{\psi}(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t)\cos(xt)\,dt.$$

(c) Montrer que $\widehat{\psi}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer ses dérivées successives sous forme d'intégrales.

(d) Montrer que, pour tout réel non nul x, on a

$$\widehat{\psi}(x) = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\sin(xt)\,dt,$$

et calculer $\widehat{\psi}(0)$.

4. (a) Montrer que la fonction $\Phi : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}\sin(xt)\,dt$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $\Phi'(x)$, pour tout $x > 0$, puis l'exprimer sans utiliser le signe intégrale.

(b) En déduire soigneusement que pour tout réel non nul x,

$$\widehat{\psi}(x) = \frac{\arctan x}{x}.$$

II. QUELQUES PROPRIÉTÉS DE LA TRANSFORMÉE DE FOURIER D'UNE FONCTION

1. **Transformée de Fourier d'une fonction intégrable**

(a) Soit f une fonction continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$; montrer que pour tout réel x, $\hat{f}(x)$ est bien définie et que la fonction $\hat{f}$ est bornée.

(b) Si en plus f est continue, montrer que $\hat{f}$ est aussi continue.

2. **Transformations**

(a) Montrer que l'application $F : \varphi \mapsto \hat{\varphi}$, définie sur l'espace vectoriel des fonctions complexes continues par morceaux et intégrables sur $\mathbb{R}$, à valeur dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, est linéaire.

Dans la suite de cette question, f est une fonction continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$.

(b) Vérifier que pour tout réel a, les fonctions $f_a : t \mapsto f(t-a)$ et ${}_af : t \mapsto f(at)$ possèdent des transformées de Fourier et montrer que

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \quad \widehat{f_a}(x) = e^{-iax}\hat{f}(x) \quad \text{et} \quad \widehat{{}_af}(x) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{x}{a}\right)\ (a \neq 0).$$

(c) Exprimer de même la transformée de Fourier de l'application $t \mapsto f(t)e^{iat}$ en fonction de celle de f.

(d) Si f est paire (resp. impaire), donner une expression de sa transformeé de Fourier sous forme d'une intégrale sur $[0, +\infty[$.

(e) Que peut-on alors dire de la tarnsformée de Fourier d'une fonction réelle et paire (resp. impaire).

3. **Dérivation**

On considère un élément f de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$; on suppose que f et f' sont intégrables sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que f tend vers 0 en $\pm\infty$.

(b) Montrer alors que

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \quad \widehat{f'}(x) = ix\hat{f}(x),$$

puis en déduire que $\hat{f}$ tend vers 0 en $\pm\infty$.

(c) On suppose de plus que l'application $g :\ t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$; montrer que $\hat{f}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \quad (\hat{f})'(x) = -i\hat{g}(x).$$

III. UNE FORMULE D'INVERSION

A- Un autre exemple

Dans cette section, h désigne la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$; on admet que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\, dt = \sqrt{\pi}$.

1. Vérifier que $\hat{h}$ est bien définie, dérivable sur $\mathbb{R}$ et qu'elle satisfait l'équation différentielle

$$y' + \frac{x}{2}\, y = 0. \qquad (1)$$

2. Résoudre l'équation différentielle (1) et donner l'expression de $\hat{h}$.

3. Donner alors l'expression de la transformée de Fourier de la fonction $t \mapsto e^{-\varepsilon t^2}$, $\varepsilon > 0$.

B- Application à la formule d'inversion

Dans cette section, f désigne une fonction continue, bornée et intégrable sur $\mathbb{R}$ telle que $\hat{f}$ soit aussi intégrable sur $\mathbb{R}$. Soit $(\varepsilon_n)_n$ une suite de réels strictement positifs tendant vers 0.

1. (a) Soit $v \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$. En utilisant le théorème de la convergence dominée, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} v(y) e^{-\varepsilon_n y^2}\, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} v(y)\, dy.$$

(b) Montrer de même que si $w \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ est une fonction bornée alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} w(x + \varepsilon_n y) e^{-y^2}\, dy = w(x)\sqrt{\pi}.$$

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon_n y^2}\, dy \right) dt = 2\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + 2\sqrt{\varepsilon_n}\, s) e^{-s^2}\, ds.$$

3. Soit x un nombre réel.

   (a) Justifier que, pour tout couple (p, q) d'entiers naturels non nuls et tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{-p}^{p} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-q}^{q} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy = \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-p}^{p} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt.$$

   (b) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{q \to +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-q}^{q} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt}\, dt \right) dy.$$

   (c) Montrer que, pour tout entier naturel non nul q et tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{p \to +\infty} \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-p}^{p} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt = \int_{-q}^{q} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt.$$

   (d) En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iy(t-x)-\varepsilon y^2}\, dy \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy-\varepsilon y^2} \hat{f}(y)\, dy.$$

4. Montrer alors que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy} \hat{f}(y)\, dy.$$

FIN DE L'ÉPREUVE

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Séries numériques et vectorielles
- Limites et continuité
- Équations différentielles linéaires

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/cnc/mp