Concours ECRICOME Prépa, France

Session 2012, filière ECT

Mathématiques (voie technologique)

Ce que traite le sujet

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Scan du sujet officiel sans sa page de garde : le PDF commence à la page numérotée 2 de l'énoncé.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ecricome/ect/2012/maths

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

EXERCICE 1.

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

   (a) Montrer que A est inversible et expliciter A^{-1}.

   (b) On rappelle que $A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Prouver que, pour tout entier $n \geqslant 0$, il existe deux réels u_n, v_n tels que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2u_n & 1 & 0 \\ v_n & u_n & 1 \end{pmatrix}$; On vérifiera que :

   $$u_0 = v_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n - 1 \\ v_{n+1} = v_n - 2u_n \end{cases}.$$

   (c) Exprimer u_n en fonction de n.

   (d) Démontrer que : $\forall n \geqslant 1, \quad v_n = 2\sum_{k=0}^{n-1} k$.

   (e) En déduire une expression simplifiée de v_n puis écrire A^n sous la forme d'un tableau de nombres.

2. Soit f la fonction qui à tout réel x associe $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$. où a, b, c sont trois réels.

   (a) Pour tout réel x, calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x)$ s'écrit sous la forme :

   $$f'(x) = (a_1x^2 + b_1x + c_1)e^{-x}$$

   où a_1, b_1, c_1 sont trois réels. Vérifier que : $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

   (b) Expliciter $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ en fonction de $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$ en utilisant la matrice A^{-1}.

3. Application. Soient r et s les deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad r(x) = (x+1)\,e^{-x} \quad \text{et} \quad s(x) = \left(x^2+x\right)e^{-x}.$$

Déduire de la question précédente une primitive R de r et une primitive S de s.

4. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x < 0, \quad g(x) = 0, \quad \forall x \geqslant 0, \quad g(x) = \frac{1}{2}(x+1)\,e^{-x}.$$

(a) Soit $X \in [0, +\infty[$. Calculer $\displaystyle\int_0^X g(x)dx$ et $\displaystyle\int_0^X xg(x)dx$.

(b) En déduire la convergence des intégrales $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)dx$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} xg(x)dx$ puis donner leurs valeurs respectives.

(c) Prouver que g est une densité de probabilité.

(d) Soit Y une variable aléatoire possédant g pour densité.

Démontrer que Y admet une espérance et donner la valeur de $E(Y)$.

EXERCICE 2.

On considère la fonction f définie sur $[1, +\infty[$ par :

$$\forall x \in [1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{x^2}{2x-1}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. On définit également la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ par :

$$u_0 \in [1, +\infty[, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

1. Etude de $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

(a) Soit $x \geqslant 1$. Etablir les inégalités suivantes : $1 \leqslant f(x)$ et $f(x) \leqslant \dfrac{x+1}{2}$.

(b) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n$.

En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leqslant \dfrac{u_n+1}{2}$.

(c) Prouver par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leqslant u_n \leqslant 1 + \dfrac{1}{2^n}(u_0 - 1)$.

Tournez la page s.v.p.

(d) Démontrer la convergence de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et donner la valeur de sa limite.

2. Asymptote à $\mathcal{C}_f$. On pose $a = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et $b = \lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - ax]$.

(a) Donner la valeur de $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(b) Calculer a et b.

(c) Montrer qu'il existe un réel c tel que :

$$\forall x \in [1, +\infty[, \quad f(x) - ax - b = \frac{c}{2x-1}$$

et donner la valeur de c.

(d) Prouver que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote $(\mathcal{D})$ dont on donnera une équation ainsi que la position de $(\mathcal{D})$ par rapport à $\mathcal{C}_f$.

3. Variations de f.

(a) Soit $x \in [1, +\infty[$. Calculer $f'(x)$.

(b) Préciser le sens de variations de f sur $[1, +\infty[$.

(c) Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f)$ ainsi que la droite $(\mathcal{D})$ et la tangente $(\mathcal{T})$ à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 1.

4. Etude d'une réciproque.

(a) Montrer que la fonction f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

(b) Soit $t \in [1, +\infty[$. Prouver que l'équation $x^2 - 2tx + t = 0$ (d'inconnue x) admet des solutions réelles et les donner.

(c) Soit $t \in [1, +\infty[$. Déterminer l'unique réel $x \in [1, +\infty[$ tel que $f(x) = t$.

EXERCICE 3.

On considère deux urnes notées respectivement U et V. On suppose que :
- l'urne U contient deux boules noires et deux boules blanches ;
- l'urne V contient deux boules noires, deux boules blanches et deux boules vertes.

1. On considère l'expérience suivante $(\mathcal{E})$: « On tire au hasard et simultanément deux boules dans l'urne U, on note leur couleur, puis on les remet dans l'urne U ».

(a) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. On répète n fois l'expérience $(\mathcal{E})$ et on note N la variable aléatoire égale au nombre de fois où on a obtenu deux boules de même couleur lors de ces n tirages dans l'urne U.

(b) Donner la loi de N en explicitant $P(N = k)$ pour k appartenant aux valeurs prises par N.

(c) Préciser la valeur de l'espérance $E(N)$ de N ainsi que sa variance $V(N)$.

(d) Quelle est la probabilité que sur ces n tirages, on ait obtenu au moins une fois deux boules de même couleur ?

2. On considère une autre expérience $(\mathcal{F})$: « On tire au hasard et simultanément deux boules dans l'urne U. Si les deux boules sont de même couleur, on enlève ces deux boules de l'urne U. Si elles sont de couleurs différentes, on repose les deux boules dans l'urne U puis on recommence l'expérience jusqu'à ce que l'urne U soit vide ».

On note X le nombre de tirages nécessaires pour que l'urne U soit vide. On désigne par A l'évènement : « au premier tirage dans l'urne U, les deux boules sont de même couleur » et on note a sa probabilité c'est-à-dire $a = P(A)$.

(a) Calculer $P(X = 1)$. $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.

(b) Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$: $P(X = n) = a(1 - a)^{n-2}$.

(c) Etablir que la variable $Z = X - 1$ suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre.

(d) Donner l'espérance et la variance de Z puis l'espérance et la variance de X.

3. On considère deux réels r, s distincts et non nuls ainsi qu'un réel λ. On considère la suite $(u_n)_{n\geqslant 2}$ définie par :

$$u_2 = 0, \quad \forall n \geqslant 2, \quad u_{n+1} = \lambda r^{n-2} + s\, u_n.$$

Montrer par récurrence que :

$$\forall n \geqslant 2, \quad u_n = \frac{\lambda}{r - s}\left(r^{n-2} - s^{n-2}\right).$$

4. On considère une nouvelle expérience $(\mathcal{G})$: « On tire au hasard et simultanément deux boules dans l'urne V. Si les deux boules sont de même couleur, on enlève ces deux boules de l'urne V. Si elles sont de couleurs différentes, on repose les deux boules dans l'urne V puis on recommence l'expérience

Tournez la page s.v.p.

jusqu'à ce que l'urne V soit vide ».

On note Y le nombre de tirages nécessaires pour que l'urne V soit vide. On désigne par B l'évènement : « au premier tirage dans l'urne V, les deux boules sont de même couleur » et on note b sa probabilité c'est-à-dire $b = P(B)$.

(a) Calculer la probabilité b.

(b) Calculer $P(Y = 2)$ et $P(Y = 3)$.

(c) A l'aide du système complet d'évènements $\left(B, \overline{B}\right)$, démontrer que, pour tout $n \geqslant 2$:

$$P(Y = n+1) = bP(X = n) + (1-b)P(Y = n)$$

(d) A l'aide de la question 3, montrer que :

$$\forall n \geqslant 2, \quad P(Y = n) = \frac{ab}{b-a}\left((1-a)^{n-2} - (1-b)^{n-2}\right)$$

(e) Calculer la valeur de $\sum_{n=2}^{+\infty} P(Y = n)$.

(f) Montrer que Y admet une espérance puis calculer $E(Y)$.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECT chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Matrices carrées : inverse et puissances
- Compléments d'intégration
- Variables aléatoires à densité
- Réels, sommes et produits
- Suites réelles
- Dérivation (et convexité en ECT1)
- Fonctions réelles : limites et continuité
- Variables aléatoires discrètes infinies

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ecricome/ect