Concours commun Mines-Ponts, France

# Session 2024, filière MP

## Mathématiques 1

Durée : 3 heures

### Ce que traite le sujet

- Partie I : calcul d'une intégrale
- Partie II : une expression de la fonction sinus
- Partie III : calcul d'une intégrale de Dirichlet généralisée
- Partie IV : calcul de E(|S_n|)

**Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.**

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/mines/mp/2024/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

**A2024 – MATH I MP**

**ÉCOLE DES PONTS PARISTECH,
ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS,
TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS,
MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY,
IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS,
CHIMIE PARISTECH - PSL.**

**Concours Mines-Télécom,
Concours Centrale-Supélec (Cycle International).**

**CONCOURS 2024**

**PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES**

**Durée de l'épreuve : 3 heures**

**L'usage de la calculatrice et de tout dispositif électronique est interdit.**

**L'énoncé de cette épreuve comporte 5 pages de texte.**

**Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.**

Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de la licence
Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.
Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun Mines Ponts.

## Généralisation d'une intégrale de Dirichlet et application

Le but de ce sujet est de calculer l'intégrale de Dirichlet généralisée

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\Big(\cos(t)\Big)^{2p+1}}{t^2}\ \mathrm{d}t$$

et d'utiliser ce calcul pour évaluer une espérance.

# Partie I : Calcul d'une intégrale

Dans tout ce qui suit, $x$ est un élément de $]0;1[$ fixé.

**1** ▷ Montrer que pour tout $\theta \in ]-\pi\,;\pi[$, la fonction $f$ définie par

$$\begin{aligned} f\ :]0\,;+\infty[ &\longrightarrow \mathbf{C} \\ t &\longmapsto \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}} \end{aligned}$$

est définie et intégrable sur $]0;+\infty[$.

Soit $r$ la fonction définie par

$$\begin{aligned} r\ :]-\pi\,;\pi[ &\longrightarrow \mathbf{C} \\ \theta &\longmapsto \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}}\ \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

**2** ▷ Montrer que la fonction $r$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\pi\,;\pi[$ et que :

$$\forall \theta \in ]-\pi;\pi[, \quad r'(\theta) = -\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\theta}\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{(1+te^{\mathrm{i}\theta})^2}\ \mathrm{d}t.$$

*Indication : soit $\beta \in ]0;\pi[$, montrer que pour tout $\theta \in [-\beta;\beta]$ et $t \in [0,+\infty[$, $|1+te^{i\theta}|^2 \geq |1+te^{i\beta}|^2 = (t+\cos(\beta))^2 + (\sin(\beta))^2$.*

Soit $g$ la fonction définie par

$$\begin{aligned} g\ :]-\pi;\pi[ &\longrightarrow \mathbf{C} \\ \theta &\longmapsto e^{\mathrm{i}x\theta}\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}}\ \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

**3** ▷ Montrer que la fonction $g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\pi;\pi[$ et que pour tout $\theta \in ]-\pi;\pi[$,

$$g'(\theta) = \mathrm{i}e^{\mathrm{i}x\theta} \int_0^{+\infty} h'(t)\ \mathrm{d}t,$$

où $h$ est la fonction définie par

$$\begin{aligned} h\ :]0;+\infty[ &\longrightarrow \mathbf{C} \\ t &\longmapsto \frac{t^x}{1+te^{\mathrm{i}\theta}}. \end{aligned}$$

Calculer $h(0)$ et

$$\lim_{t\to+\infty} h(t).$$

En déduire que la fonction $g$ est constante sur $]-\pi;\pi[$.

**4** ▷ Montrer que pour tout $\theta \in ]0;\pi[$,

$$g(\theta)\sin(x\theta) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\Big(g(-\theta)e^{\mathrm{i}x\theta} - g(\theta)e^{-\mathrm{i}x\theta}\Big) = \sin(\theta)\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{t^2+2t\cos(\theta)+1}\ \mathrm{d}t.$$

**5** ▷ En déduire que :

$$\forall \theta \in ]0;\pi[, \quad g(\theta)\sin(\theta x) = \int_{\mathrm{cotan}(\theta)}^{+\infty} \frac{\Big(u\sin(\theta)-\cos(\theta)\Big)^x}{1+u^2}\ \mathrm{d}u,$$

où $\mathrm{cotan}(\theta) = \dfrac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$.

**6** ▷ Montrer, en utilisant le théorème de convergence dominée, que :

$$\lim_{\theta\to\pi^-} g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}.$$

**7** ▷ En déduire que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\ \mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}.$$

# Partie II : Une expression (utile) de la fonction sinus

On rappelle que $x$ est un élément de $]0;1[$ fixé.

**8** ▷ Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\ \mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\frac{t^{x-1}}{1+t} + \frac{t^{-x}}{1+t}\right)\ \mathrm{d}t.$$

**9** ▷ Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+x}\cdot$$

**10** ▷ Établir l'identité

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}\cdot$$

**11** ▷ En déduire que l'on a

$$\frac{\pi}{\sin(\pi x)} = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n x}{n^2-x^2}\cdot$$

**12** ▷ En déduire enfin que :

$$\forall y \in ]0\,;\pi[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n y\sin(y)}{y^2-n^2\pi^2} = 1 - \frac{\sin(y)}{y}\cdot$$

# Partie III : Calcul d'une intégrale de Dirichlet généralisée

**13** ▷ Montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\Big(\cos(t)\Big)^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

converge et que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\Big(\cos(t)\Big)^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t = (2p+1)\int_0^{+\infty} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

**14** ▷ Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ :

$$\int_{\frac{\pi}{2}+(n-1)\pi}^{\frac{\pi}{2}+n\pi} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\,\mathrm{d}t.$$

**15** ▷ En déduire que :

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\frac{\sin(t)}{t}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\Big(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\Big)\,\mathrm{d}t.$$

**16** ▷ En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Big(\cos(t)\Big)^{2p}\,\mathrm{d}t.$$

*Dans le cas $p = 0$, cette intégrale est communément appelée "Intégrale de Dirichlet".*

**17** ▷ Montrer que :

$$(\cos(t))^{2p} = \frac{1}{2^{2p}} \left( \binom{2p}{p} + 2 \sum_{k=0}^{p-1} \binom{2p}{k} \cos(2(p-k)t) \right).$$

*Indication : On pourra développer* $\left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^{2p}$.

**18** ▷ En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \Big(\cos(t)\Big)^{2p+1}}{t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2} \frac{(2p+1)!}{2^{2p}.(p!)^2}.$$

# Partie IV : Calcul de $E\Big(|S_n|\Big)$

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Soient $(X_k)_{k\in\mathbf{N}^*}$ des variables aléatoires indépendantes, de même loi donnée par :

$$P(X_1 = -1) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}.$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

**19** ▷ Déterminer, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $E(S_n)$ et $V(S_n)$.

Soient $S$ et $T$ deux variables aléatoires indépendantes prenant toutes deux un nombre fini de valeurs réelles. On suppose que $T$ et $-T$ suivent la même loi.

**20** ▷ Montrer que :

$$E\Big(\cos(S+T)\Big) = E\Big(\cos(S)\Big)\, E\Big(\cos(T)\Big).$$

**21** ▷ En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, et pour tout $t \in \mathbf{R}$ :

$$E\Big(\cos(tS_n)\Big) = \Big(\cos(t)\Big)^n.$$

**22** ▷ Soient $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a \neq 0$ et $|b| \leq |a|$. Montrer que

$$|a+b| = |a| + \text{signe}(a)\ b$$

où $\text{signe}(x) = x/|x|$ pour $x$ réel non nul. En déduire que :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad E\Big(|S_{2n}|\Big) = E\Big(|S_{2n-1}|\Big).$$

**23** ▷ Montrer que pour tout $s \in \mathbf{R}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(st)}{t^2}\ \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}|s|.$$

**24** ▷ En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ :

$$E\Big(|S_n|\Big) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1-\Big(\cos(t)\Big)^n}{t^2}\ \mathrm{d}t.$$

**25** ▷ Conclure que :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad E\Big(|S_{2n}|\Big) = E\Big(|S_{2n-1}|\Big) = \frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}\Big((n-1)!\Big)^2}.$$

## Fin du problème

# Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

## Chapitres liés à ce sujet

- Intégration sur un intervalle quelconque
- Nombres complexes et trigonométrie
- Séries numériques et vectorielles
- Calcul algébrique : sommes, produits, binôme et systèmes linéaires

## Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

**prepahelp.com/#essai**

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/mines/mp