Concours commun Mines-Ponts, France

Session 2012, filière PC

Mathématiques 2

Durée : 3 heures

Ce que traite le sujet

- 1 Un problème aux valeurs propres
- 2 La série de Fourier de la condition initiale
- 3 Construction d'une solution
- 4 Unicité de la solution

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/mines/pc/2012/maths2

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

A 2012 MATH II PC

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH.
SUPAERO (ISAE), ENSTA PARISTECH,
TELECOM PARISTECH, MINES PARISTECH
MINES DE SAINT ÉTIENNE, MINES DE NANCY,
TÉLÉCOM BRETAGNE, ENSAE PARISTECH (Filière PC).
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Filière TSI).

CONCOURS 2012

SECONDE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Filière PC

(Durée de l'épreuve : trois heures)
L'usage d'ordinateur ou de calculatrice est interdit.

Sujet mis à la disposition des concours :
Cycle international, ENSTIM, TELECOM INT, TPE-EIVP.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

MATHÉMATIQUES II - PC

L'énoncé de cette épreuve comporte 4 pages de texte.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Equation de la chaleur

Dans ce texte on note $\mathbf{R}$ l'ensemble des nombres réels, $\mathbf{N}$ l'ensemble des nombres entiers positifs ou nuls, $\mathbf{N}^* = \mathbf{N}\setminus\{0\}$ l'ensemble des nombres entiers strictement positifs et $\mathbf{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs.

Le problème est consacré à l'équation de la chaleur monodimensionnelle ; la fonction inconnue u définie dans le domaine $[0,\pi]\times[0,+\infty[\ \subset \mathbf{R}^2$ à valeurs réelles est supposée continue, et de plus indéfiniment dérivable par rapport à x sur $]0,\pi[$ et par rapport à t sur $]0,+\infty[$. L'inconnue u est solution du système d'équations suivant :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) \ \text{ sur } \ ]0,\pi[\times]0,+\infty[\tag{1}$$

$$u(0,t) = u(\pi,t) = 0 \ \forall t \in [0,+\infty[\ : \ \text{conditions aux limites} \tag{2}$$

$$u(x,0) = f(x) \ \ \forall x \in [0,\pi] \ : \ \text{condition initiale,} \tag{3}$$

où f désigne une fonction définie sur l'intervalle $[0,\pi]$. Dans la suite on prendra comme condition initiale la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ \pi - x & \pi/2 \leq x \leq \pi. \end{cases} \tag{4}$$

La variable x est la variable d'espace, t est la variable temporelle.

1 Un problème aux valeurs propres

On cherche ici à déterminer les valeurs de λ (valeurs propres) pour lesquelles il existe une solution non nulle de l'équation différentielle ordinaire

$$v'' + \lambda v = 0 \text{ sur } [0,\pi] \tag{5}$$
$$v(0) = v(\pi) = 0. \tag{6}$$

Question 1 *Montrer que si v est solution de* (5)-(6) *alors elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,\pi[$ et que*

$$\int_0^\pi v''(x)\, v(x)\ \mathrm{d}x = -\int_0^\pi \left(v'(x)\right)^2\ \mathrm{d}x\ ;$$

en déduire que si v n'est pas identiquement nulle, alors $\lambda \geq 0$.

Question 2 *Pour $\lambda \leq 0$, déterminer l'ensemble des solutions de* (5)*. En déduire que le système d'équations* (5)-(6) *n'a pas d'autre solution que la solution nulle.*

Question 3 *Montrer que* (5)-(6) *possède une solution non nulle si et seulement si $\exists n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\lambda = n^2$. Pour n fixé, déterminer la dimension de l'espace des solutions et en expliciter une base.*

2 La série de Fourier de la condition initiale

On note φ la fonction égale à f sur $[0,\pi]$, impaire et prolongée par 2π-périodicité à $\mathbf{R}$ tout entier.

Question 4 *Tracer la courbe représentative de φ sur $[-5\pi/2, 5\pi/2]$ et en préciser le tableau de variation.*

On note Φ' (dérivée généralisée), la fonction égale à la fonction dérivée φ' sur chaque intervalle de la forme $](2k-1)\pi/2, (2k+1)\pi/2[$, $k \in \mathbf{Z}$ et prolongée par continuité sur chaque intervalle $](2k-1)\pi/2, (2k+1)\pi/2]$, $k \in \mathbf{Z}$.

Question 5 *Dessiner le graphe de la fonction Φ'.*

Soit p une fonction $\mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, continue par morceaux et périodique de période 2π ; on pose

$$c_n(p) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} p(x)\, e^{-inx}\mathrm{d}x,\ n \in \mathbf{Z} \tag{7}$$
$$b_n(p) = i\left(c_n(p) - c_{-n}(p)\right),\ n \in \mathbf{N}^* \text{ et } b_0(p) = c_0(p).$$

Question 6 *Démontrer que $c_n(\Phi') = inc_n(\varphi)$.*

Question 7 *Calculer* $c_n(\Phi')$, *en déduire que*

$$b_n(\varphi) = \frac{4}{\pi n^2} \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right), \ n \in \mathbf{N}^* \tag{8}$$

et donner l'expression de la série de Fourier de φ *en fonction des* $b_n(\varphi)$.

Question 8 *En déduire que la série de Fourier de* φ *converge normalement.*

3 Construction d'une solution de (1)-(2)-(3)

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on définit la fonction u_n sur le domaine $[0,\pi] \times [0,+\infty[$ par

$$u_n(x,t) = b_n(\varphi) \sin(nx)\, e^{-n^2 t}, \ n \in \mathbf{N}^*, \tag{9}$$

et on note u la somme de la série de fonctions $\sum u_n$, c'est-à-dire sous réserve de la convergence,

$$u(x,t) = \sum_{n\geq 1} u_n(x,t). \tag{10}$$

Question 9 *Montrer que pour tout* $n \in \mathbf{N}^*$, u_n *est continue sur* $[0,\pi]\times[0,+\infty[$, *indéfiniment dérivable par rapport à* x *sur* $]0,\pi[$ *et par rapport à* t *sur* $]0,+\infty[$, *et vérifie* (1).

Question 10 *Montrer que la série de fonctions* $\sum u_n$ *est convergente sur* $[0,\pi] \times [0,+\infty[$ *et que la somme* u *définit une fonction continue sur* $[0,\pi] \times [0,+\infty[$.

Question 11 *La série*

$$\sum \frac{\partial u_n}{\partial t}\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

converge-t-elle ?.

Question 12 *Soit* $\delta > 0$, *montrer que la série de fonctions* $\sum \frac{\partial u_n}{\partial t}$ *converge normalement sur* $[0,\pi]\times[\delta,+\infty[$. *En déduire que la somme* u *définie selon* (10) *admet une dérivée partielle par rapport à* t *sur* $[0,\pi] \times [\delta,+\infty[$ *et que*

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \sum_{n\in\mathbf{N}^*} \frac{\partial u_n}{\partial t}(x,t) \ \text{ sur } \ [0,\pi] \times]0,+\infty[.$$

Question 13 *La série de fonctions* $\sum \frac{\partial u_n}{\partial t}$ *converge-t-elle normalement sur* $[0,\pi]\times[0,+\infty[$? *Justifiez votre réponse.*

On admettra dans la suite (raisonnement analogue) que u admet des dérivées partielles de tous ordres sur $[0,\pi]\times]0,+\infty[$ et qu'elles s'obtiennent par dérivation sous le signe somme.

Question 14 *Montrer que* u *est solution de* (1)-(2)-(3).

4 Unicité de la solution

Soit h une fonction continue sur $[a,b] \subset \mathbf{R}$ et indéfiniment dérivable sur $]a,b[$.

Question 15 *Quel est le signe de* $h'(\alpha)$ *et* $h''(\alpha)$ *si* h *atteint son maximum en* $\alpha \in]a,b[$? *Justifiez votre réponse.*

On définit la dérivée à gauche $h'_g(b)$ de h en b selon la formule

$$h'_g(b) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{h(b) - h(b-\varepsilon)}{\varepsilon},$$

si la limite existe.

Question 16 *Quel est le signe de $h'_g(b)$ si h admet en b une dérivée à gauche et y atteint son maximum ?*

On choisit $T > 0$ et on note

$$\mathcal{D}_i =]0,\pi[\times]0,T[\,,\ \mathcal{C} = (]0,\pi[\times \{T\})\,,\ \mathcal{D} = [0,\pi] \times [0,T]$$
$$\mathcal{F} = ([0,\pi] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0,T]) \cup (\{\pi\} \times [0,T])\,,$$




FIGURE 1 – Partition du domaine

Soit $\varepsilon > 0$, on définit la fonction v_ε par $v_\varepsilon(x,t) = u(x,t) + \varepsilon x^2$ où u est une solution de (1)-(2)-(3).

Question 17 *Montrer que v_ε ne peut atteindre son maximum sur $\mathcal{D}$ en aucun point de $\mathcal{D}_i \cup \mathcal{C}$.*

Notons $M = \max_{(x,t)\in\mathcal{F}} u(x,t)$.

Question 18 *Déduire de ce qui précède que u atteint son maximum sur $\mathcal{F}$.*

Question 19 *Conclure que la solution de (1)-(2)-(3) est unique.*

Si u est une solution de (1)-(2)-(3) on pose

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^\pi (u(x,t))^2\,\mathrm{d}x,\ \forall t \geq 0. \tag{11}$$

Question 20 *Démontrer que $E'(t) \leq 0$, $\forall t > 0$. En déduire par un autre raisonnement l'unicité de la solution de (1)-(2)-(3).*

Fin de l'épreuve

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PC chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Équations différentielles linéaires
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Suites et séries de fonctions
- Séries numériques et vectorielles
- Dérivabilité et convexité
- Intégrales dépendant d'un paramètre

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/mines/pc